

## پیمانه مهارتی

# شناسایی خصوصیات مرغان گوشتی و نژادهای آن

### هدف کلی

شناسایی تیپ مرغان گوشتی و نژادهای معروف آن

هدفهای رفتاری: فراگیر، پس از گذراندن این پیمانه، باید بتواند :

- ۱- اندامهای ظاهری مرغ را تشخیص و نشان دهد.
- ۲- تفاوت قسمتهای مختلف بدن جوجه و مرغان گوشتی (پرها، سینه، پا، تاج و ...) را از سایر مرغان (تخمگذار، دو منظوره و ...) بیان کند.
- ۳- مرغان گوشتی را با توجه به وضعیت اندامهای ظاهری آنها، شناسایی کند.
- ۴- خصوصیات مهم معروفترین نژادهای خارجی را بیان کند.
- ۵- خصوصیات مهم توده‌های مرغ ایرانی را بیان کند.
- ۶- خصوصیات آمیخته‌های تجاری معروف را بیان کند.

### فهرست

۵	دسته مرغان آسیایی	۲	خصوصیات ظاهری مرغان گوشتی
۶	آزمون نهایی	۵	نژادهای مرغ گوشتی
۶	منابع	۵	نژادهای انگلیسی




## کلیات

در این بحث دانشآموزان عزیز ابتدا با قسمتهای ظاهری بدن مرغ و سپس با تیپ مرغان گوشتی و برخی از تزادهای معروف آنها آشنا می‌شوند. دانشآموزان برای شناسایی مرغان گوشتی باید تصاویر را با دقیق بررسی کنند و تیپ مرغان گوشتی و تخمگذار را با یکدیگر مقایسه نمایند.

## خصوصیات ظاهری مرغان گوشتی

قبل از شروع بحث، با دقیق در تصویر زیر و با بررسی قسمتهای ظاهری بدن مرغ، ذهن خود را برای شناسایی خصوصیات ظاهری مرغ و خروس گوشتی آماده نمایید.



را ندارند بلکه برخی از آنها غذاي مصرف شده را بيشتر تبدیل به گوشت می‌نمایند و به همین جهت، بدنی عضلانی و فربه دارند که این دسته از مرغان را «تیپ گوشتی» می‌گویند.

حال به این سؤال پاسخ دهید که آیا تمام مرغان استعداد تولید گوشت را دارند؟ پاسخ این سؤال را بشرط تحقیقاتی که در سالیان متعددی انجام داده روشن کرده است. در واقع باید گفت تمام مرغان به یک اندازه استعداد تولید گوشت و تخم مرغ



تیپ مرغ گوشتی

تخم مرغ در آنها مناسب می‌باشد به همین دلیل آنها را «مرغان دو بهره» یا «دومناظوره» می‌گویند، در این دسته از مرغان تولید گوشت کمتر از مرغان گوشتی و تولید تخم مرغ نیز کمتر از مرغان تخمگذار می‌باشد. بدنه این دسته از مرغان از نظر جثه حدواسط مرغان گوشتی و تخمگذار می‌باشد.

برخی دیگر از مرغان به ازای غذای مصرف شده، تخم مرغ بیشتری تولید می‌کنند و نسبت به مرغان گوشتی دارای بدنه کوچکتر و سبکتر می‌باشند. این دسته از مرغان را «تیپ تخمگذار» می‌نامند.

دسته دیگری از مرغان وجود دارند که تولید گوشت و



تیپ مرغان دو بهره



تیپ مرغان تخمگذار

مهرات: پرورش جوجه گوشتی  
شماره شناسایی: ۲۱۱۱۰۱۱۰۴-۵

پیمانه مهارتی: شناسایی خصوصیات مرغان گوشتی و نژادهای آن  
شماره شناسایی: ۲۱۱۱۰۱۱۰۴-۵۱



تیپ مرغان زینتی

مرغان دیگری نیز وجود دارند که فقط به دلیل زیبایی نگهداری می‌شوند و تولید گوشت و تخم مرغ در آنها بسیار پایین می‌باشد.

این دسته از مرغان دارای پر و بال زیبا هستند و به همین دلیل، به آنها «مرغان زینتی» می‌گویند.



با توجه به مطالب ذکر شده و دقت در تصاویر مقابل می‌توان برخی از ویژگیهای مرغان گوشتی را شناسایی نمود.  
مرغان گوشتی غذای مصرف شده را تبدیل به گوشت می‌نمایند. به عبارت دیگر، رشد عضلات قسمتهای مختلف بدن آنها، سریعتر از مرغان دیگر می‌باشد. بنابراین دارای بدنهای درشت‌تر از گونه‌های دیگر هستند. وزن مرغان گوشتی در مدتی کوتاه افزایش مناسبی نشان می‌دهد. در عوض سن بلوغ در آنها بالا و قدرت تولید تخم مرغ در آنها پایین است. مرغان گوشتی معمولاً دارای بدنهای جمع و جور، رانهای کوتاه و فربه و گردنه کلفت هستند و کیفیت گوشت آنها نیز بهتر از مرغان تخم‌گذار می‌باشد.



تیپ مرغان گوشتی

## نژادهای مرغ گوشتی

نژاد چیست: نژاد، به مجموعه حیوانات یک گونه گفته می‌شود که دارای صفات مشابهی هستند و قدرت حیات و تولید مثل دارند و نتاج آنها نیز دارای همین خصوصیات می‌باشند. مانند یک نژاد مرغ گوشتی که دارای رنگ پر، پوست تاج، وضعیت اندامها و تولید مشابهی هستند.

نژادهای مرغ گوشتی شامل دو نژاد مرغان انگلیسی و آسیایی هستند.

نژادهای انگلیسی: نژادهای انگلیسی، معروفترین مرغان گوشتی دنیا را تشکیل می‌دهند. این دسته از مرغان از نظر تولید تخم مرغ ضعیف‌اند. نژادهای ساسکس و کورنیش از جمله معروفترین گونه‌های این نژاد می‌باشند.

نژاد ساسکس: نژاد ساسکس از نظر تولید گوشت در دنیا معروف است و به رنگ‌های مختلف دیده می‌شود ولی رنگ سفید آن از اهمیت بیشتری برخوردار است. نژاد ساسکس سفید دارای طوق سیاه در گردن و لکه‌های سیاه در دم می‌باشد. وزن خروس در این نژاد چهار کیلوگرم و مرغ آن سه کیلوگرم می‌باشد.

نژاد کورنیش: یکی از بهترین نژادهای گوشتی دنیاست. اصل این نژاد از هندوستان بوده که بعداً به انگلستان برده شده است. نژاد کورنیش دارای رنگ‌های سفید، سیاه و قرمز می‌باشد ولی سفید آن اهمیت بیشتری دارد. وزن خروس در این نژاد ۴/۵۳ کیلوگرم و مرغ آن ۳/۴ کیلوگرم است. از این نژاد کمتر به صورت خالص استفاده می‌شود، زیرا بهترین آمیخته‌های دنیا در نتیجه ترکیب این مرغان با نژادهای دیگر بدست آمده است.

دسته مرغان آسیایی: این دسته از مرغان که مبدأ اصلی آنها آسیاست از نظر اقتصادی اهمیتی ندارند. این مرغها دارای بدن جمع و جور و کوچک هستند و تولید گوشت مناسبی دارند ولی سرعت رشد آنها کم است و دیر به سن بلوغ می‌رسند از معروفترین نژادهای این دسته برهما و کوشین را می‌توان نام برد.



ساسکس (مرغ)



کوشین سفید



برهمای تیره

و هیبرو را نام برد.

### توده مرغهای گوشتی ایران

در میان توده مرغهای ایرانی، مرغهای لاری از نظر تولید گوشت مناسبترند. مرغهای لاری از جهت شکل و ساختار بدن، شبیه نژاد کورنیش است. اولین بار دریانوردان انگلیسی آن را وارد بنادر جنوب کردند و در حال حاضر، خالص‌ترین آنها در اردبیل پرورش داده می‌شوند.

### آمیخته‌های معروف گوشتی دنیا

تعریف آمیخته‌گری: آمیخته‌گری عبارت است از جفتگیری دو نژاد خالص که رابطه خویشاوندی با هم ندارند.

امروز برای تولید جوجه گوشتی کمتر از نژادهای خالص استفاده می‌شود و عملاً برای تولید گوشت با کیفیت و کمیت مناسب، سعی می‌شود از آمیخته‌ها استفاده شود. در آمیخته‌گری، نژادها را طوری انتخاب می‌کنند که دارای صفات موردنظر باشند. از معروف‌ترین آمیخته‌های گوشتی دنیا می‌توان دو نام تجارتی لوهمان

### آزمون نهایی

۱- مرغ از نظر نوع تولید به چند دسته تقسیم می‌شود؟

۲- دو نژاد مرغ انگلیسی را نام بیرید؟

۳- کدام نژاد جزو مرغان آسیایی است؟

الف: برهمانی      ب: کورنیش      ج: ساسکس

۴- نژاد را تعریف کنید.

۵- شکل و ساختار بدن مرغ لاری، شبیه کدام نژاد خارجی است؟

۶- نژاد کورنیش جزو کدام دسته است؟

الف: انگلیسی      ب: ایرانی      ج: آسیایی

د: مدیترانه‌ای

### منابع

- ۱- اهری - مرادعلی، پرورش طیور گوشتی، دانشگاه تهران
- ۲- ایرانپور - جهانشاه، پرورش دام و طیور، آموزش و پرورش
- ۳- نیکزاد - نادر، پرورش دام و طیور، آموزش و پرورش
- ۴- عباسپور - سعید، مرغداری نوین

## پیمانه مهارتی

# آماده‌سازی مرغداری برای پرورش جوجه گوشتی

### هدف کلی

توانایی آماده کردن مرغداری برای پرورش جوجه گوشتی

هدفهای رفتاری: فرآگیر، پس از گذراندن این پیمانه، باید بتواند :

- ۱- جایگاه را تخلیه نماید.
- ۲- جایگاه را شستشو و با محلول ضد عفونی کند.
- ۳- جایگاه را با شعله افکن ضد عفونی کند.
- ۴- تجهیزات و وسائل مرغداری (دانخوری، آبخوری و ...) را شستشو و ضد عفونی کند.
- ۵- بستر را تهیه و در جایگاه پهن نماید.
- ۶- تجهیزات و وسائل داخل جایگاه را نصب کند.
- ۷- تجهیزات را پس از نصب، آزمایش نماید.
- ۸- جایگاه را به وسیله گاز ضد عفونی کند.
- ۹- محوطه اطراف جایگاه را پاکسازی و ضد عفونی کند.

### فهرست

۱۶	نصب تجهیزات و آزمایش آنها	۸	جمع آوری وسائل و تجهیزات داخل جایگاه
۱۸	گاز دادن جایگاه	۱۱	شستشوی جایگاه
۲۰	تقسیم‌بندی جایگاه (سن‌بندی)	۱۱	ضد عفونی جایگاه مرغداری
۲۰	آماده کردن جایگاه برای ورود جوجه	۱۱	حرارت دادن جایگاه
۲۰	انتقال جوجه به جایگاه	۱۲	محلول‌پاشی با مواد ضد عفونی کننده
۲۲	رسیدگی به جوجه در روزهای اول پرورش	۱۳	گردپاشی جایگاه و محوطه
۲۳	آزمون نهایی	۱۳	شستشو و ضد عفونی تجهیزات
۲۳	منابع	۱۴	تهیه و پهن کردن بستر

## کلیات

این عمل را باید با دقّت کامل انجام دهید، تا از بروز خسارات احتمالی جلوگیری به عمل آید. وسایل و تجهیزاتی که باید از جایگاه خارج نمود عبارت اند از: آبخوریها، دانخوریها، بخاری، هواکشها خراب و لامپها.

— آبخوریها و دانخوریها: کلیه آبخوریها و دانخوریها را باید برای شستشو و ضد عفونی، از مرغداری خارج کنید و به محل پیش‌بینی شده منتقل نمایید. گفتنی است در صورتی که جایگاه دارای آبخوری و دانخوری اتوماتیک است ابتدا باید آنها را باز کنید و سپس قسمتهای لازم را از جایگاه خارج نمایید.

— بخاری: در صورتی که در جایگاه از بخاری به عنوان وسیله گرمایش استفاده می‌کنید باید در پایان دوره، آن را از جایگاه خارج کرده، سرویس نمایید.

— هواکشها: هواکشها را باید کنترل نموده، آنها را که نیاز به تعمیر دارند از جایگاه خارج کنید.

— لامپها: در صورتی که از جایگاه پنجره‌دار و روشن استفاده می‌کنید، باید کلیه لامپها را باز کنید تا در هنگام شستشو و ضد عفونی آسیب نینند.

برای پرورش جوجه گوشتی، ابتدا باید جایگاه مرغداری را برای ورود جوجه‌های یکروزه آماده نمود. چرا که آماده نمودن صحیح جایگاه در روند پرورش جوجه گوشتی تأثیر مستقیم دارد. از این‌رو موارد زیر باید به ترتیب و با دقّت کامل انجام پذیرد:

- ۱- جمع‌آوری وسایل و تجهیزات داخل جایگاه
- ۲- جمع‌آوری و خارج کردن بستر از جایگاه
- ۳- شستشو و تجهیزات داخل جایگاه
- ۴- ضد عفونی جایگاه
- ۵- شستشو و ضد عفونی تجهیزات و وسایل
- ۶- پهن کردن بستر
- ۷- نصب تجهیزات و آزمایش آنها
- ۸- گاز دادن جایگاه
- ۹- تقسیم‌بندی جایگاه

## جمع‌آوری وسایل و تجهیزات داخل جایگاه

در پایان هر دوره پرورش جوجه گوشتی و تخلیه جایگاه از مرغها، ابتدا باید وسایل و تجهیزات داخل جایگاه را خارج نمایید.



تصویر جایگاه با تجهیزات و وسایل

پیمانه مهارتی: آماده سازی مرغداری برای پرورش جوجه گوشتی  
شماره شناسایی: ۱۱۱۱۰۱۱۰۴-۵۲

مهارت: پرورش جوجه گوشتی  
شماره شناسایی: ۱۱۱۱۰۱۱۰۴-۵



نمونه یک هوکش مناسب



نمای هوکشها از بیرون جایگاه



نصب لامپ در جایگاه



تعویض هوکشها خراب و فرسوده



**جمع آوری و خارج کردن بستر**  
پس از خارج کردن تجهیزات از جایگاه، باید بستر (کود) را از جایگاه خارج کنید. برای این کار ابتدا باید وسایل و تجهیزات مورد نیاز را آماده کرد. در جایگاه‌های کوچک می‌توانند جمع آوری و خارج کردن بستر را با فرغون و بیل انجام دهید. در این روش، زمان جمع آوری مواد بستر طولانی می‌شود و به نیروی انسانی بیشتری نیاز است. حتماً باید به هنگام جمع آوری بستر با بیل و فرغون، از ماسکهای مخصوص استفاده کنید.

مهارت: پرورش جوجه گوشتی

شماره شناسایی: ۲۱۱۱۰۱۱۰۴-۵

پیمانه مهارتی: آماده سازی مرغداری برای پرورش جوجه گوشتی

شماره شناسایی: ۲۱۱۱۰۱۱۰۴-۵۲

در جایگاه‌های بزرگ بهتر است برای جمع آوری و تخلیه کود از وسایل مکانیکی استفاده شود.

پس از جمع آوری و تخلیه بستر باید کودهای چسبیده به کف جایگاه را به وسیله کاردهای مخصوص جدا کنید و از جایگاه خارج نمایید. جارو کردن جایگاه را باید پس از کار دک زدن انجام دهید.

در کلیه مراحل باید لباس مخصوص پوشید و از ماسک استفاده نمایید. ضمناً باید پنجره‌های جایگاه را در حین کار باز کرده، تهویه‌ها را روشن کنید.



برای جمع آوری و تخلیه کود از وسایل مکانیکی استفاده نمایید.



جمع آوری بستر به وسیله تراکتور



نمایش ضدغونی جایگاه با محلول باش

### شست و شوی جایگاه

پس از جارو کردن جایگاه، باید آن را با آب گرم یا سرد شست و شو کنید. برای این منظور، باید نوع مصالح استفاده شده در دیوار و سقف جایگاه را در نظر بگیرید که آیا قابل شست و شو هستند یا خیر؟

در هنگام شست و شو با آب، باید دقیق تر به تجهیزات برقی و کلیه وسایلی که در اثر مرطوب شدن آسیب می‌بینند خسارتی وارد نیاید.

### ضدغونی جایگاه مرغداری

جایگاه را پس از هر دوره پرورش حتی اگر هیچ گونه بیماری در دوره‌های قبل در آن مشاهده نشده باشد حتماً باید ضدغونی کنید.

ضدغونی کردن جایگاه، گرچه احتمال بروز بیماری در گله را کاملاً از بین نمی‌برد، به طور محسوسی آن را کاهش می‌دهد. برای ضدغونی جایگاه می‌توانید از روش‌های گوناگون زیر استفاده نمایید.

توجه: از آنجا که این روشها هر یک به تنها بی نمی‌توانند اطمینان بخش باشند، بهتر است از تمام این روشها استفاده کنید.

۱- حرارت دادن جایگاه با شعله افکن

۲- گردباشی جایگاه و محوطه اطراف آن

۳- محلول پاشی جایگاه با مواد ضدغونی کننده

۴- گاز دادن جایگاه

**حرارت دادن جایگاه:** از حرارت، به دلیل خاصیت میکروب کشی شدید، معمولاً برای ضدغونی جایگاه استفاده می‌شود، برای حرارت دادن جایگاه از شعله افکن استفاده می‌شود. در اجرای این عملیات، باید لباس مخصوص کار پوشید و در شعله دادن جایگاه باید دقیق تر کلیه زوایا، گوشها و شکافهای جایگاه حرارت بینند. در هنگام کار باید از حرارت دادن وسایل و قسمتهای آتش‌زا کاملاً پرهیز نمایید.



شعله افکن جهت حرارت دادن



ضد عفونی کف جایگاه



نمایش ضد عفونی جایگاه

محلول پاشی با مواد ضد عفونی کننده: پس از شعله دادن، جایگاه را باید با دقت تمام، با مواد ضد عفونی کننده محلول پاشی نمود. برای این منظور، مواد و وسایل زیر باید فراهم شود:

- ۱- ماده ضد عفونی کننده
- ۲- دستگاه محلول پاشی
- ۳- دستکش مخصوص
- ۴- ماسک مخصوص و لباس کار و کلاه
- ۵- آب (به میزان لازم)

پس از آماده کردن مواد و وسایل مزبور، برای تهیه محلول ضد عفونی کننده، مراحل زیر، باید بترتیبی که آمده است صورت پذیرد.

۱- مطالعه دقیق دستور العمل و توصیه های کارخانه سازنده ماده ضد عفونی کننده.

۲- محاسبه مقدار لازم از ماده ضد عفونی کننده مورد استفاده (با در نظر گرفتن مساحت کف، دیوارها و سقف سالن و همچنین رعایت دستور العمل کارخانه سازنده ماده مزبور) محاسبه مقدار آب مورد نیاز: در مرحله بعد، باید محلول پاش را از محلول ضد عفونی کننده پر نموده، جایگاه را ضد عفونی کنید. برای ضد عفونی کردن جایگاه باید موارد زیر را با دقت انجام دهید.

۱- پوشیدن لباس کار و استفاده از ماسک و دستکش


۲- ضد عفونی یکواخت قسمتهای مختلف جایگاه

۳- دقت در ضد عفونی گوشه ها، زاویه ها، درز ها و شکاف های موجود

۴- دقت در جلوگیری از ریزش محلول، بر روی تأسیسات برقی و وسایلی که نسبت به رطوبت حساس هستند.

پیمانه مهارتی: آماده سازی مرغداری برای بروش جوجه گوشتی  
شماره شناسایی: ۲۱۱۱۰۱۱۰۴-۵۲

مهارت: بروش جوجه گوشتی  
شماره شناسایی: ۲۱۱۱۰۱۱۰۴-۵



نمایش جایگاه پس از شست و شو  
و ضد عفونی



گردپاشی خارج از جایگاه

گردپاشی جایگاه و محوطه: برخی از مواد مانند آهک، خاصیت میکروب کشی دارند؛ از این روشی توان برای ضد عفونی بستر و محوطه اطراف جایگاه مرغداری از آن استفاده کرد. برای این منظور می‌توانید آهک زنده را در کف جایگاه روی بستر پیاسید و یا آن را در محوطه اطراف جایگاه مرغداری پخش کنید. این عمل در ضد عفونی اطراف جایگاه بسیار مؤثر است.

**شست و شو و ضد عفونی تجهیزات**  
پس از شست و شوی تجهیزات (دانخوری، آبخوری و ...) باید آنها را بترتیبی که در زیر می‌آید با دقّت ضد عفونی نمایید.

۱- مطالعه دقیق دستورالعمل ماده ضد عفونی کننده مورد نظر برای ضد عفونی تجهیزات.

۲- محاسبه مقدار آب مورد نیاز، با توجه به حجم حوضچه مخصوص ضد عفونی تجهیزات یا مخزن دستگاه محلول پاش (این مقدار، باید حدود  $\frac{1}{2}$  حجم حوضچه منظور شود).

۳- محاسبه مقدار ماده ضد عفونی کننده مورد نیاز با توجه



به حجم آب مصرفی.

۴- پر کردن حدود  $\frac{1}{3}$  حوضچه مخصوص از آب

۵- ریختن ماده ضد عفونی کننده مورد نظر در حوضچه و  
به هم زدن آن

۶- قرار دادن تجهیزات (آبخوری، دانخوری و ...) در  
داخل محلول، با توجه به دستورالعمل کارخانه سازنده

۷- خارج کردن تجهیزات پس از مدت لازم، شست و شو  
و خشک کردن آنها

### تهیه و پهنه کردن بستر

در پرورش مرغان گوشتی حتماً باید کف جایگاه را با بستر مناسب بپوشانید. بستر، موادی است که در طول مدت پرورش، باعث کاهش عوارضی مانند تورم و درد مفاصل در جوجه، همچنین بروز بیماریهای انگلی می‌گردد. بستر به تثبیت حرارت و رطوبت هوای جایگاه نیز کمک می‌کند.

برای تهیه بستر مرغداری می‌توانید از کاه، کلش، خاک ارده، تراشه نجاری و مواد دیگر استفاده کنید. بستر مناسب باید دارای وزن سبک باشد و از ذرات متوسط تشکیل شود، همچنین، میزان جذب رطوبت آن بالا باشد.

بستر باید قادر اجسام نوک تیز، عاری از گرد و غبار و کاملاً خشک باشد. بستر خوب کپک نمی‌زند و مانع از اتلاف حرارت جایگاه می‌شود.

بستر را باید پس از شست و شو و ضد عفونی جایگاه، در زمانی که کف جایگاه کاملاً خشک است پهنه کنید. برای پهنه کردن بستر باید توجه کنید که ارتفاع آن حداقل ۵ سانتیمتر باشد و در تمام سالن به صورت یکنواخت گسترشده شود. در هنگام پهنه کردن بستر باید اجسام نوک تیز را جمع آوری و از سالن خارج نمایید. برای استفاده از بستر در روزهای نخست، می‌توانید آنها را با کاغذ مقاوم بپوشانید تا جوجه‌ها از مواد موجود در آن

استفاده نکنند، و زمانی که جوجه‌ها به دان خوردن از داخل دانخوری عادت کردند کاغذها را جمع نمایید.

در طول دوره پرورش، باید مراقب باشید تا رطوبت بستر از ۳۰ درصد بیشتر نشود، در صورتی که قسمتی از بستر خیس شود باید آن را با بستر تازه عوض کنید.

مهرات: پرورش جوجه گوشتی  
شماره شناسایی: ۲۱۱۱۰۱۱۰۴-۵

پیمانه مهارتی: آماده سازی مرغداری برای پرورش جوجه گوشتی  
شماره شناسایی: ۲۱۱۱۰۱۱۰۴-۵۲



پهن کردن بستر با کلش




نمایش بستر با مواد کلش

## نصب تجهیزات و آزمایش آنها

پس از پنهان کردن بستر باید تجهیزات (آبخوری، دانخوری و ...) داخل جایگاه را نصب کنید. نصب آبخورها و دانخورها در جایگاه باید به نحوی صورت گیرد که تمام گله به آسانی بتوانند از آنها استفاده کنند و نیاز به حرکت اضافی نداشته باشند. برای این منظور باید با توجه به وضعیت ساختمان و امکانات خود، آنها را در مکانهای مناسب قرار دهید.



تصویر دانخوری ناوданی




نمایش قرار دادن یک سیستم دانخوری  
אוטומاتیک در جایگاه



استفاده توأم از آبخوریها و دانخوریهای دستی و اتوماتیک در جایگاه باعث می‌شود که جوجه‌ها سریعتر به استفاده از وسایل اتوماتیک عادت کنند. (البته در چند روز اول پرورش، از دانخوری سینی استفاده می‌شود).

برای تجهیز جایگاه، باید کلیه وسایل مانند گرم‌کننده‌ها، خنک‌کننده‌ها، تهویه‌ها و وسایل روشنایی را با دقت کامل در جایگاه نصب کنید.

شما می‌توانید در روزهای اول پرورش، مواد بسترهای را با روزنامه یا گونی پوشانید تا از نوک زدن جوجه‌ها به بستر و درنتیجه بروز برخی عوارض، جلوگیری شود.



استفاده توأم از آبخوریها و دانخوریهای دستی و اتوماتیک باعث می‌شود تا جوجه‌ها سریعتر به استفاده از وسایل اتوماتیک عادت کنند.



تصویر از سالن قبل از پهن کردن پستر

۱- پوشیدن لباس کار با استفاده از ماسک مخصوص و دستکش.

۲- محاسبه دقیق فضای مورد نظر

۳- محاسبه دقیق فرمالین مورد نیاز با توجه به فضای جایگاه

۴- محاسبه دقیق مقدار پرمنگنات مورد نیاز با توجه به فضای جایگاه

۵- آماده نمودن ظروف مخصوص (بهتر است از ظروف سفالی و لعابی استفاده شود. ضمناً حجم ظروف باید سه برابر مواد مصرفی باشد).

۶- مسدود کردن کلیه درها، پنجره‌ها، روزنه‌ها و هوکشهای جایگاه

۷- قرار دادن ظروف در مکانهای تعیین شده و جمع‌آوری بستر اطراف ظروف

۸- روشن کردن گرم کننده‌ها (بهتر است حرارت جایگاه هنگام عمل بالاتر از ۳۷ درجه باشد).

حال باید پرمنگنات را به نسبت مساوی در داخل ظروف قرار دهید و فرمالین را به نسبت مساوی روی آنها بریزید و بسرعت

پس از نصب تجهیزات داخل جایگاه، باید آنها را با دقت آزمایش کرده، از کارکرد صحیح آنها اطمینان حاصل نمایید.

## گاز دادن جایگاه

گاز دادن جایگاه را پس از نصب تجهیزات انجام دهید تا برای آخرین بار قبل از ورود جوجه‌ها، سالن و تجهیزات بهوسیله مواد دودزا ضد عفونی شود. برای این منظور می‌توانند از مواد زیر استفاده کنید.

۱- استفاده از فرمالین مایع و پودر پرمنگنات

۲- استفاده از پارافرمالدئید

۳- استفاده از فرمالین آماده (آجر ضد عفونی کننده)

## گاز دادن جایگاه با فرمالین و پرمنگنات

در اثر ریختن فرمالین روی پرمنگنات گاز قوی به نام فرمل تولید می‌شود که خاصیت میکروب کشی بالایی دارد.

نسبت کاربرد این دو ماده در ایران به صورت ۴۰CC فرمالین ۴۰ درصد و ۱۰ گرم پرمنگنات برای هر متر مکعب می‌باشد.

روش کاربرد فرمالین و پرمنگنات به صورت زیر است :

پیمانه مهارتی: آماده سازی مرغداری برای پرورش جوجه گوشتی  
شماره شناسایی: ۲۱۱۱۰۱۱۰۴-۵۲

مهارت: پرورش جوجه گوشتی  
شماره شناسایی: ۲۱۱۱۰۱۱۰۴-۵



نحوه گاز دادن جایگاه

استفاده از فرمالین جامد اقتصادی‌تر است و نحوه کاربرد آن نیز بسیار ساده‌تر می‌باشد ضمناً درصد ایمنی آن نیز بالاتر است.



از سالن خارج شوید زیرا گاز متصاعد شده برای دستگاه تنفس بسیار زیان‌آور و دارای بوی بسیار تندی است. در هنگام عمل باید توجه کنید که هرگز پرمنگات را روی فرمالین نریزید.

پس از ۲۴ ساعت می‌توانید کلیه درها و پنجره‌ها را باز نموده، تهویه‌ها را روشن کنید تا گاز متصاعد شده به‌طور کامل خارج شود و تا خارج شدن کامل گاز از جایگاه درها و پنجره‌ها را بنبندید.

گفتنی است که از گاز فرمل برای ضد عفونی ماشین جوجه کشی، سالن جوجه کشی و حتی تخم مرغ جوجه کشی نیز استفاده می‌شود، بدیهی است در این صورت باید غلظت آن کاهش یابد و بهتر است در هر مورد از دستورالعمل خاص آن مورد، استفاده شود.

در پایان بحث، باید خاطر نشان شود که امروزه بیشتر از فرمالین جامد استفاده می‌شود. این مواد به صورت مکعب مستطیل بسته‌بندی و نحوه استفاده از آن نیز روی بسته‌بندی نوشته شده است.

## آماده کردن جایگاه برای ورود جوجه

معمولًاً ۲۴ ساعت قبل از ورود جوجه، جایگاه باید آماده و دارای کلیه شرایط مناسب باشد در این هنگام باید حرارتِ جایگاه بین ۳۲-۳۵ درجه سانتیگراد و رطوبت آن بین ۶۰-۷۰ درصد باشد.

گفتنی است که در بد و ورود جوجه باید دانخوری و آبخوری، خالی از دان و آب باشد.

## انتقال جوجه به جایگاه

انتقال جوجه از مؤسسات جوجه کشی به مرغداری را باید به نحوی برنامه ریزی کنید که جوجه در زمان مناسب به مرغداری برسد. در این مورد باید به فصل جوجه ریزی و درجه حرارت محیط توجه کنید به عنوان مثال در فصول گرم بهتر است جوجه،

## تقسیم‌بندی جایگاه (سن‌بندی)

از آنجا که مساحت مورد نیاز جوجه گوشتی در طول دوره بروز متفاوت است بسیاری از کشورها در طول دوره از دو جایگاه استفاده می‌کنند به این صورت که جوجه را تا سن ۶ تا ۴ هفتگی در یک جایگاه و پس از آن در جایگاه وسیع‌تر دیگر، نگهداری می‌نمایند.

در ایران برای کاهش هزینه‌ها، معمولًاً از یک جایگاه برای کل دوره استفاده می‌شود.

برای این منظور می‌توانید قبل از ورود جوجه، قسمتی از جایگاه را (به ازای هر ۲۰ قطعه جوجه یک مترمربع) با بروزنت یا پلاستیک از کل جایگاه جدا نمایید و شرایط را برای ورود جوجه در این قسمت آماده کنید و در طول دوره با افزایش سن جوجه فضای را گسترش دهید.



پیمانه مهارتی: آماده سازی مرغداری برای پرورش جوجه گوشتی  
شماره شناسایی: ۲۱۱۱۰۱۱۰۴-۵۲

مهارت: پرورش جوجه گوشتی  
شماره شناسایی: ۲۱۱۱۰۱۱۰۴-۵



چیدن جوجه در جعبه در مؤسسات جوجه کشی



نمونه‌ای از جعبه حمل جوجه یکروزه و درپوش آن



کامیونهای مخصوص حمل  
جوجه یکروزه



تراکم بیش از حد جوجه در یک گوشه

رسیدگی به جوجه در روزهای اول پرورش  
پس از تخلیه جوجه در جایگاه، موارد زیر را باید بصورت  
روزانه انجام دهید.

۱- مراقب باشید جوجه ها در یک گوشه جمع نشوند زیرا  
ممکن است در اثر تراکم زیاد تعدادی از آنها خفه شوند.

۲- در روزهای اول سعی کنید به منظور کنترل، در جایگاه  
حضوری مستمر داشته باشید.

۳- حرارت جایگاه را کنترل نمایید.

۴- در روز اول می توانید به آب آنها به میزان ۸٪ شکر  
اضافه کنید. این اقدام، به جوجه انژری می دهد و از اضطرابهای  
حمل و نقل می کاهد.

۵- به مدت ۴۸ ساعت، از ذرت کاملاً آرد شده به عنوان  
غذا استفاده کنید و سپس می توانید از پیش دان استفاده نمایید.

۶- جوجه های واژده (کور، فلچ، ضعیف، مقعد چسبیده،  
جهجه های مبتلا به عفونت ناف و...) را از گله جدا کرده، معده  
کنید.

۷- در سه روز اول باید در تمام مدت شباهنگ روز از روشنایی  
مناسب استفاده نمایید. پس از سه روز می توانید ۱/۵-۱٪ ساعت  
در شباهنگ روز، جایگاه را تاریک کنید. (لامپها را خاموش کنید).  
۸- هر روز صبح تلفات را جمع آوری کرده، در فرم مربوط  
ثبت نمایید.

۹- به محض مشاهده حالت غیرعادی در جایگاه (مشاهده  
بیماری و...) موارد را به کارشناس مربوط اطلاع دهید.

۱۰- هر روز صبح اطلاعات آماری را در فرمهای مربوط  
وارد نمایید.

۱۱- آبخوریها و دانخوریها را مرتبأ کنترل نمایید و در  
صورت خالی بودن آنها را از آب و دان پر کنید.



نمونه جوجه فلچ

## آزمون نهایی

- ۱- مشخصات بستر مناسب را توضیح دهید.
- ۲- روش‌های مختلف ضد عفونی را نام ببرید.
- ۳- سه نمونه از مواردی را که به عنوان بستر استفاده می‌شود نام ببرید.
- ۴- فواید بستر را بنویسید.
- ۵- حداقل ارتفاع بستر ..... سانتیمتر است.

الف : ۳                      ب : ۵                      ج : ۷                      د : ۹

۶- برای گاز دادن ۱۰۰۰ مترمکعب فضای مرغداری، چند گرم پرمنگنات لازم است؟

الف : ۱۰۰۰                      ب : ۱۰۰۰۰                      ج : ۵۰۰۰                      د : ۱۵۰۰۰

۷- برای پرورش ده هزار جوجه در سن ۱-۱۴ روزگی چند مترمربع فضا کافی است؟

الف : ۵۰۰                      ب : ۷۰۰                      ج : ۱۰۰۰                      د : ۱۵۰۰

۸- حرارت جایگاه در روز ورود جوجه به جایگاه (جوچه یکروزه) چند سانتیگراد است؟

الف : ۲۸                      ب : ۳۲                      ج : ۲۸                      د : ۴۰

۹- کدام ماده برای تغذیه ۴۸ ساعت اول زندگی جوجه مناسبتر است؟

الف : جو                      ب : ذرت                      ج : سبوس                      د : پودر ماهی

۱۰- مواردی را که یک کارگر مرغداری باید در چند روز اول ورود جوجه به جایگاه رعایت کند بنویسید.

۱۱- چرا در روز اول به آب آشامیدنی جوجه‌ها، شکر اضافه می‌کنیم؟

۱۲- در ۴۸ ساعت اول پرورش جوجه، از چه ماده‌ای به عنوان غذا استفاده می‌کنید؟

## منابع

۱- فرخوی، محسن، راهنمای کامل پرورش طیور، معاونت تحقیق و پژوهش وزارت کشاورزی، سال انتشار

۱۳۷۵

۲- سنگی، محمدحسن و سایرین، اصول پرورش طیور

۳- ایرانپور، جهانشاه و سایرین، جوجه کشی، کارگاه خوداتکایی، وزارت آموزش و پرورش، ۱۳۷۳

۴- یزدی، کامران رضا، پرورش و نگهداری جوجه گوشتی، اداره تدوین متون مرکز نشر و وزارت

جهادسازندگی

## پیمانه مهارتی

# تغذیه جوجه گوشتی

### هدف کلی

توانایی انجام امور مربوط به تغذیه جوجه گوشتی

هدفهای رفتاری: فرآگیر، پس از گذراندن این پیمانه، باید بتواند:

- ۱- آب مورد نیاز جوجه گوشتی را فراهم نماید.
- ۲- میزان آب لازم برای پرورش جوجه گوشتی را محاسبه نماید.
- ۳- آبخوری مناسب (دستی یا اتوماتیک) را برای پرورش جوجه گوشتی انتخاب کند.
- ۴- مواد مغذی مورد نیاز جوجه گوشتی را تأمین کند.
- ۵- مواد لازم را برای تهیه دان مرغ تهیه کند.
- ۶- دان مناسب را با توجه به سن جوجه در دوره پرورش تأمین کند.
- ۷- میزان مصرف دان را برای یک دوره، مشخص نماید.
- ۸- دانخوری مناسب را برای پرورش جوجه گوشتی انتخاب نماید.
- ۹- دانخوریها را بدرستی در جایگاه قرار دهد.
- ۱۰- آبخوریها را بدرستی در جایگاه نصب کند.


### فهرست

۳۲	انواع دانخوری	۲۵	تأمین آب مورد نیاز، کیفیت و نقش آن
۳۶	اشکال مختلف دان	۲۷	انواع آبخوری
۳۶	میزان مصرف دان در جوجه‌های گوشتی	۲۹	مواد مغذی مورد استفاده در تغذیه طیور
۳۸	آزمون نهایی	۳۰	انرژی
۳۹	منابع	۳۰	منابع تأمین کننده غذای طیور



نمونه آبخوری دستی

بسیاری از مرغداران در روز اول زندگی جوجه، مقداری شکر به آب آنها اضافه می‌کنند تا از اضطراب ناشی از حمل و نقل جوجه کاسته شود، در صورتی که شما نیز می‌خواهید این عمل را انجام دهید باید مقدار ۵ تا ۸ کیلوگرم شکر را به صد لیتر آب اضافه کنید، همچنین می‌توانید در سه تا چهار روز اول زندگی جوجه، از ویتامینهای محلول در آب و الکترولیتهای موجود، به آب جوجه اضافه نمایید. این عمل مقاومت جوجه‌ها را بالا می‌برد و از اضطراب روزهای اول زندگی می‌کاهد.



**تأمین آب مورد نیاز، کیفیت و نقش آن**  
جوجه‌های گوشتی نیز مانند موجودات دیگر، بیش از سایر مواد غذایی، به آب نیاز دارند.

آب، علاوه بر هضم و جذب مواد غذایی، به انتقال مواد، دفع مواد زاید بدن، ترمیم بافتها و انجام بسیاری از واکنشهای شیمیایی بدن کمک می‌کند. جوجه‌های گوشتی تا ۲۴ ساعت پس از تولد به آب و غذا نیاز ندارند، از این‌رو پس از ورود جوجه به جایگاه باید با توجه به سپری شدن زمان فوق، ابتدا آب و پس از چند ساعت غذا در اختیار آنها قرار گیرد.

آبی که به جوجه می‌دهید باید سالم، تمیز و عاری از هرگونه میکروب مضر باشد. از نظر املاح نیز باید مانند آبی باشد که انسان استفاده می‌کند.

باید دقت کنید که در طول شبانه‌روز آب در اختیار جوجه قرار داشته باشد برای این منظور لازم است هر چند ساعت آبخوری‌ها را کنترل کنید تا در صورت کمبود آب، آنها را به حدی که لازم است از آب بر نمایید. در کنترل آبخوری‌ها باید به تمیز بودن آب داخل آنها نیز توجه کنید و در صورت مشاهده آلودگی، نسبت به رفع آن اقدام نمایید.

در صورتی که در جایگاه از آبخوری‌های اتوماتیک استفاده می‌کنید باید آنها را مرتبًا کنترل کنید تا در صورت خرابی احتمالی برای تعییر آنها اقدامات لازم را به عمل آورید.

آب شیرین

شکر



به طور کلی نسبت مصرف آب به غذا در جوجه های گوشتی حدود ۲ به ۱ می باشد که در مناطق گرسیز یا فصل تابستان، این نسبت به میزان  $^3$  به ۱ افزایش می یابد البته باید بدانید که میزان مصرف آب در جوجه های گوشتی به عواملی مانند، حرارت و رطوبت محیط، سن جوجه، میزان و کیفیت تولید، میزان و کیفیت دان مصرفی بستگی دارد.

نکته مهمی را که باید در مورد مصرف آب آشامیدنی در نظر داشته باشید مقدار آبی است که جوجه گوشتی در شبانه روز مصرف می کند. زیرا کاهش ناگهانی مصرف آب یکی از نشانه های بروز بیماری و ناراحتی در گله می باشد.  
جدول زیر، مقدار تقریبی مصرف آب تعداد ۱۰۰ جوجه را در طول روز، در ۸ هفته نخست پرورش نشان می دهد.

هشتم	هفتم	ششم	پنجم	چهارم	سوم	دوم	اول	سن جوجه به هفته
۱۵/۲۵	۱۳/۵	۱۱/۵	۹/۵	۷/۶	۵/۷	۳/۸	۱/۸۸	صرف آب قطعه جوجه در روز (به لیتر)

$6 \times 2 \cdot 12 \text{ lit}$

مثال ۲: میزان آب مصرفی ده هزار جوجه را در سن چهار هفتگی محاسبه کنید.

$4 \times 2 \cdot 8 \text{ lit}$  مصرف صد جوجه در هفته چهارم  
صرف ده هزار جوجه در هفته چهارم  $8 \times 100 \cdot 80 \text{ lit}$


شما می توانید میزان تقریبی مصرف آب جوجه گوشتی را

به روش زیر محاسبه کنید:

سن گله به هفته  $\times 2$ . مقدار آب مورد نیاز ۱۰۰ جوجه به لیتر

مثال ۱: میزان آب مصرفی ۱۰۰ قطعه جوجه را در سن ۶ هفتگی محاسبه کنید.

— رطوبت هوا — خشکی هوا



— آیا می دانید مقدار آب مصرفی مرغ، تحت تأثیر چه عواملی است؟

### آبخوری کله‌قندی برای جوجه

## انواع آبخوری

آبخوریها ظرفی هستند که برای استفاده یکنواخت و مداوم از آب در گله مرغ به کار می‌روند. ویژگی‌های آبخوریها، عبارت‌اند از:

- ۱- قابل شستشو و ضدغونی کردن باشند.
- ۲- آب را براحتی در اختیار جوجه بگذارند.
- ۳- ضد زنگ باشند.
- ۴- اقتصادی باشند.

آبخوریها از نظر طرز کار به دو دسته زیر تقسیم می‌شوند:

– آبخوری‌های دستی

– آبخوری‌های اتوماتیک

آبخوری‌های دستی: این آبخوریها در شکل‌های مخروطی، استوانه‌ای، شتکی و ناودانی و موادی چون الومینیوم، ورق گالوانیزه و مواد پلاستیکی ساخته می‌شوند.

هزینه این آبخوریها کمتر از آبخوری‌های اتوماتیک می‌باشد و چنانچه جایگاه شما کوچک و ظرفیت پرورش آن اندک است می‌توانید از این آبخوریها استفاده کنید.

طرز استفاده از این آبخوریها ساده می‌باشد ولی باید توجه داشته باشید تا در هنگام آب ریختن در آنها، حتی الامکان از ریخت آب بر روی بستر جلوگیری کنید.



دانخوری دستی ناودانی

از آنجا که مواد بستر به علت تحرک جوجه، بسادگی وارد آبخوریها می‌شود باید دائمًا آنها را کنترل نمایید تا در صورت مشاهده آلودگی، آب آنها را تعویض کنید. نحوه چیدن آبخوریها در جایگاه نیز اهمیت دارد. شما باید با در نظر گرفتن وضعیت جایگاه آبخوریها را طوری قرار دهید که جوجه‌ها با کمترین تحرک به آب دسترسی داشته باشند.



آبخوری بشکه‌ای



آبخوری سیفونی کوچک برای ۴۰ تا ۷۵ جوجه نیمچه



آبخوری استوانه‌ای برای ۵۰ جوجه

مهارت: پرورش جوجه گوشتی

شماره شناسایی: ۲۱۱۱۰۱۱۰۴-۵

پیمانه مهارتی: تغذیه جوجه گوشتی

شماره شناسایی: ۲۱۱۱۰۱۱۰۴-۵۳

آبخوریهای اتوماتیک در اندازه‌ها و رنگ‌های مختلف مانند فنجانی، قطره‌ای (پستانکی)، سیفونی و ناودانی وجود دارد. مواد اولیه این آبخوریها اغلب از جنس پلاستیک و گاهی نیز در ساخت آبخوریهای ناودانی، از ورقه گالوانیزه، انتخاب می‌شود.

آبخوریهای اتوماتیک: استفاده از آبخوریهای اتوماتیک کار شمارا در پرورش جوجه گوشتی بسیار سهل و ساده می‌کند. تنها باید مراقب باشید تا در صورت خراب شدن، در اسرع وقت، نسبت به سرویس و تعمیر آنها اقدام نمایید.



آبخوری فنجانی



آبخوری پستانکی (نیپلی)



آبخوری مدل چشمہ



انواع آبخوری سیفونی اتوماتیک

کمبود پروتئین در غذای روزانه جوجه گوشتی، موجب کندی رشد و در صورت تداوم، باعث به خطر افتادن سلامتی جوجه می شود.

پروتئین مورد نیاز جوجه گوشتی از طریق پروتئینهای گیاهی و حیوانی تأمین می شود. میزان پروتئین حیوانی در جیره غذایی

جوجه گوشتی باید حدود  $\frac{1}{4}$  کل پروتئین جیره باشد.

پروتئینهای گیاهی مورد نیاز جوجه گوشتی از موادی مانند سویا و انواع کچاله، پروتئینهای حیوانی آن، از موادی مانند پودر ماهی، پودر گوشت، پودر خون و... تأمین می گردد.

هیدراتهای کربن: باید توجه داشته باشید که مواد موجود در غذای روزانه جوجه گوشتی، بیشتر از ترکیبات هیدراتهای کربن می باشد. در واقع همین مواد هستند که بیشتر انرژی مورد نیاز جوجه گوشتی را تأمین می کنند. در اینجا توجه شمارا به این نکته جلب می کنیم که در میان ترکیبات هیدراتهای کربن، سلولز در دستگاه گوارش جوجه گوشتی قابلیت هضم بسیار کمی دارد، از این رو باید دقت کنید که در غذای روزانه جوجه گوشتی از موادی مانند جو کمتر استفاده نمایید.

مهمترین مواد غذایی این دسته عبارت است از: ذرت، گندم، جو، ارزن، برنج، سبوس گندم و سبوس برنج.

لیپیدها: از مهمترین لیپیدهای موجود در غذای جوجه های گوشتی چربیها هستند که به همراه هیدراتهای کربن، انرژی مورد نیاز جوجه های گوشتی را تأمین می کنند و در جذب ویتامینهای محلول در چربی مؤثرند.

حداکثر مصرف چربیها در جیره غذایی جوجه های گوشتی بین  $۱-۵$  درصد کل جیره می باشد.

از چربیهای حیوانی می توان از دنبه، پیه و چربیهای داخل شکم (امحا و احشا) و از روغن های گیاهی روغن ذرت، روغن سویا و روغن آفتابگردان نام برد.

نوع جدیدی از آبخوری سیفونی: این نوع آبخوری، تنها آبخوری سیفونی است که آب آن از بالای بدنه نمی ریزد، بلکه در پایین آبخوری و از طریق چشمها ای به داخل ناوданی زیر آن وارد می شود و در نتیجه گرد و خاک جایگاه وارد آب آبخوری نمی شود.

**مواد مغذی مورد استفاده در تغذیه طیور**  
برای اینکه سلامتی و رشد جوجه تأمین شود باید روزانه مواد مغذی زیر از راه تغذیه به بدنه جوجه برسد:

- پروتئین
  - هیدراتهای کربن
  - لیپیدها
  - مواد معدنی
  - مواد ویتامینه
  - آتزیمهای سایر مواد لازم
- علاوه بر این، مواد جیره باید دارای انرژی لازم نیز باشد تا جوجه به رشد مناسب در زمان پرورش برسد.

**پروتئین:** پروتئینها موادی هستند که در سلامتی و رشد جوجه گوشتی نقش اساسی دارند، از این رو باید دقت کنید که غذای روزانه جوجه باید دارای مقدار مناسب پروتئین باشد. میزان نیاز جوجه گوشتی به پروتئین در سنین مختلف، متفاوت است. جدول زیر، مقادیر این نیاز را نشان می دهد.

سن جوجه	۱-۳ هفتگی	۴-۵ هفتگی	۶ و ۷ هفتگی
میزان پروتئین مورد نیاز (به درصد)	۲۳-۲۴	۲۱	۱۸/۵

مشکل مواجه نشود. میزان انرژی مورد نیاز بدن جوجه گوشتی به طور کلی بین ۳۳۵-۳۸۰ کیلو کالری در کیلو گرم است.

### منابع تأمین کننده غذای طیور

حال که با مواد مغذی مورد نیاز جوجه های گوشتی آشنا شدید، لازم است خوراک هایی را که این مواد را برای جوجه تأمین می کنند نیز شناسایی کنید.

**مواد تأمین کننده انرژی:** این گروه از مواد غذایی دارای انرژی زیاد هستند و منبع تأمین کننده انرژی در جریه جوجه گوشتی به شمار می روند. این مواد شامل سه گروه عمده زیر می باشند.

**الف - غلات:** این مواد پایه اصلی جوجه های گوشتی را از نظر کمی تشکیل می دهد. موادی که در این گروه هستند شامل ذرت، گندم، جو، برنج، یولاف و ... می باشد.

**ب - چربیها:** در رده چربیها، از دو منبع گیاهی و حیوانی مانند دنبه، پیه و دانه های روغنی می توان نام برد.

**ج - ضایعات:** شامل ضایعات نانواییها، کارخانجات ماکارونی سازی، نشاسته گیری و ... می باشد.

حال با توجه به مطالب گفته شده، جدول زیر را با دقت مطالعه کنید.

عنوان مواد	ارزش غذایی مواد	انرژی قابل هضم کیلو گرم / کیلو کالری	الیاف خام (درصد)
ذرت	۳۳۲۹	۲/۵	
گندم	۳۱۵۳	۲/۹	
جو	۲۷۹۵	۸	
سبوس گندم	۱۵۷۶	۱۰/۴	
برنج	۲۶۷۹	۱۰	
یولاف	۲۷۵۶	۱۲	

توجه کنید که استفاده از چربیها باید توأم با استفاده از آنتی اکسیدانها باشد تا از فاسد شدن مواد غذایی جلوگیری کند.  
**مواد معدنی:** مواد معدنی نیز یکی دیگر از مواد مغذی مورد نیاز جوجه های گوشتی است. میزان این مواد در جیره غذایی جوجه های گوشتی نسبت به پروتئین بسیار کمتر می باشد ولی از اهمیت خاصی برخوردار است. این مواد در ساختمان استخوان بندی بدن، تنظیم فشار اسمزی، تعادل اسیدی بازی بدن و بسیاری موارد دیگر مؤثر می باشد. کمبود مواد معدنی در بدن، موجب بروز بیماری های استخوانی، کندی رشد و بسیاری از بیماری های دیگر می گردد. مواد معدنی به دو دسته زیر تقسیم می شوند :

عناصر پرنیاز، شامل : کلسیم، فسفر، منیزیم، سدیم، پتاسیم و کلر می باشد. عناصر کم نیاز عبارت اند از : ید، روی، منگنز، آهن، سلینیوم، فلور، کبالت و مولیبدن. عناصر معدنی اغلب همراه با خوراک و یا مکمل های مصنوعی، وارد دستگاه گوارش طیور می شوند.

**مواد ویتامینه (ویتامینها):** ویتامین های مورد نیاز بدن جوجه به دو دسته ویتامین های محلول در چربی (A، D، E و K) و ویتامین های محلول در آب (گروه B و C) تقسیم می شوند. ویتامین های نیز باید به مقدار نیاز در شباهنگ روز به بدن جوجه برسد. به همین منظور می توانید از مکمل های ویتامینه (با توجه به توصیه های کارخانه سازنده) استفاده نمایید. کمبود ویتامین ها در غذای جوجه، موجب کندی رشد و در صورت تداوم کمبود، باعث ظهور بیماری و عارضه مربوط به آن می شود.

### انرژی

وجود انرژی در غذای جوجه گوشتی برای انجام واکنش های شیمیایی بدن، ساخت و ترمیم نسوج، گرم کردن بدن و تحرک، ضروری می باشد.

غذای جوجه باید دارای انرژی لازم باشد تا رشد جوجه با

۴- چرا از یولاف در جیره غذایی جوجه‌های گوشتی در ایران استفاده نمی‌شود؟

برای روشن شدن مطالب مزبور، چند نمونه از جیره غذایی جوجه‌های گوشتی یک مرغداری اطراف تهران ارائه می‌شود: مواد تأمین‌کننده پروتئین: این دسته از مواد غذایی، در مقایسه با گروه قبل، دارای پروتئین بیشتر ولی انرژی کمتری هستند.

جدول زیر را با دقت مطالعه کنید.

حال با توجه به جدول مزبور می‌توانید مواد تأمین‌کننده پروتئینهای گیاهی و حیوانی مورد نیاز جوجه گوشتی را تعیین کنید. برای روشن شدن مطلب، به دو نمونه جیره غذایی جوجه گوشتی توجه نمایید و مواد تأمین‌کننده پروتئینهای گیاهی و حیوانی آن را مشخص کنید.

انتخاب و تعیین مقدار این مواد در جیره غذایی جوجه گوشتی، براساس مقدار انرژی و قابلیت هضم آنها صورت می‌گیرد. از آنجاکه دستگاه گوارش جوجه‌های گوشتی قادر به هضم الیاف خام نیست (یا در حد بسیار کم می‌باشد)، هرچه میزان این الیاف در یک ماده غذایی کمتر باشد قابلیت هضم آن بیشتر و هضم آن ساده‌تر می‌باشد. حال با توجه به این مطالب یکبار دیگر جدول مزبور را بررسی کنید و سوالات زیر را پاسخ دهید.

۱- کدام مواد در جیره غذایی جوجه گوشتی بیشتر استفاده می‌شود؟

۲- چرا جو در جیره غذایی جوجه‌های گوشتی کمتر استفاده می‌شود؟

۳- کدام ماده برای روزهای اول زندگی جوجه گوشتی مناسب‌تر است؟ به چه دلیل؟

عنوانین ماده غذایی	مشخصات ماده		
	غذایی	درصد پروتئین خام	حداکثر مجاز مورد استفاده در جیره (به درصد)
کنجاله سویا	۱	۴۴	۳۰
کنجاله تخم پنبه	۲	۴۱	۱۰
کنجاله بادام زمینی	۳	۴۷	۳
کنجاله آفتابگردان	۴	۴۶/۸	۱۵
پودر ماهی	۵	۶۰	۵
پودر خون	۶	۸۰	۳
پودر کشک	۷	۶۰	۳-۵

بعضی از مرغداران از درب جعبه‌های حمل جوجه یکروزه برای تغذیه جوجه‌ها در این سنین استفاده می‌کنند که این عمل از نظر بهداشتی مناسب نمی‌باشد.

برای تغذیه جوجه‌ها در سنین بالاتر می‌توانید از دانخوریهای ناودانی دستی (ترافی) استفاده کنید. در به کارگیری

این دانخوریها باید توجه کنید که بیشتر از  $\frac{1}{3}$  عمق آن را از دان

پر نکنید تا از ریخت و پاش دان جلوگیری شود.



استفاده از درب جعبه حمل جوجه برای دانخوری در روزهای اول پرورش

جدول زیر استاندارد استفاده از دانخوریهای ناودانی را در سنین مختلف نشان می‌دهد.

طول لازم دانخوری برای هر جوجه به سانتیمتر	سن جوجه به روز
۲/۵	۱-۷
۳/۵	۷-۱۴
۴/۵	۱۵-۳۵
۷/۵	۳۵-۵۶

دانخوری ناودانی دستی

مواد تأمین‌کننده املاح و ویتامینها: برای تأمین مواد معدنی و ویتامینها مورد نیاز جوجه گوشتی، علاوه بر غذای ذکر شده که حاوی مقداری از این مواد می‌باشد می‌توانید از مکملهای معدنی و ویتامینه موجود در بازار استفاده کنید. برای استفاده از این مکملها باید به توصیه‌های کارخانه سازنده آنها توجه داشته باشید.

### أنواع دانخوري

برای اینکه بتوانید دان را در اختیار جوجه قرار دهید باید از ظرفی به نام دانخوری استفاده کنید. دانخوریها نیز مانند آبخوریها، به دو گروه: دستی و اتوماتیک تقسیم می‌شوند. هر دانخوری مناسب باید دارای خصوصیات زیر باشد:

— اقتصادی باشد.

— استفاده از آن برای جوجه راحت باشد.

— ضد زنگ باشد.

— دارای لبه‌های تیز نباشد.

— قابل شستشو و ضد عفونی کردن باشد.

در انتخاب دانخوری، علاوه بر رعایت موارد گفته شده باید به سن جوجه نیز توجه شود. در هفتة اول زندگی جوجه می‌توانید از دانخوریهای سینی شکل استفاده کنید. برای استفاده از این دانخوریها باید به ازای هر صد جوجه یک دانخوری در نظر بگیرید.

دانخوریهای ناودانی شکل نیز برای جوجه‌ها در سن یک هفتگی مناسب‌اند. در استفاده از این دانخوریها به ازای هر جوجه باید ۲/۵ سانتیمتر، طول دانخوری را افزایش دهید.



مهرات: پرورش جوجه گوشتی  
شماره شناسایی: ۲۱۱۱۰۱۱۰۴-۵

پیمانه مهارتی: تغذیه جوجه گوشتی  
شماره شناسایی: ۲۱۱۱۰۱۱۰۴-۵۳



دانخوری بشکه‌ای دستی

نوع دیگر دانخوری که می‌توانید استفاده کنید، دانخوریهای دستی بشکه‌ای (استوانه‌ای) است. این دانخوری غالباً از جنس پلاستیک و فلز ساخته می‌شود.

جدول زیر استاندارد استفاده از دانخوریهای بشکه‌ای (استوانه‌ای) را در سنین مختلف نشان می‌دهد.

سن جوجه به هفته	طول لازم دانخوری برای هر جوجه به سانتیمتر
۱-۳	۲/۵
۳-۵	۵
۵-۸	۷/۵

سیستم دانخوریهای اتوماتیک دارای یک مخزن دان (هایپر)، یک ناودان بزرگ (که از به هم پیوستن ناودانهای کوچک تشکیل شده است)، یک رشته زنجیر فولادی، موتور الکتریکی (برای چرخاندن زنجیر) صافی، زاویه و پایه تنظیم می‌باشد.

به طور کلی می‌توانید به ازای هر ۱۰۰۰ جوجه، تعداد ۲۵-۳۰ دانخوری بشکه‌ای با ظرفیت ۱۴ کیلوگرم در نظر بگیرید.  
دانخوریهای اتوماتیک نیز به دو شکل ناودانی و بشقابی ساخته می‌شوند :



سیستم دانخوری اتوماتیک

بیرون از آن (اتاق فرمان) قرار دهد. البته قرار دادن مخزن دان (هاپر) در خارج از جایگاه اصلی از تولید صدای اضافی جلوگیری می کند.

نوع دیگر دانخوری اتوماتیک، دانخوریهای بشقابی است. این سیستم دانخوری دارای یک مخزن دان (هاپر)، یک موتور

سیستم دانخوریهای اتوماتیک ناودانی را باید با توجه به عرض جایگاه در فواصل مساوی نصب کنید، به طوری که تمام جوجه ها برآحتی از دان استفاده نمایند. استاندارد لازم برای هر جوجه در جدول صفحه ۳۳ آمده است.

مخزن دان (هاپر) را می توانید داخل جایگاه اصلی و یا



سیستم دانخوری اتوماتیک و آبخوری دستی

تصویر هاپر در داخل و خارج از جایگاه



مهارت: بروش جوجه گوشتی  
شماره شناسایی: ۲۱۱۱۰۱۱۰۴-۵


پیمانه مهارتی: تغذیه جوجه گوشتی  
شماره شناسایی: ۲۱۱۱۰۱۱۰۴-۵۳

چرخانده می شود و دان را در داخل لوله به جلو می راند و از سوراخهایی به داخل بشتابها می ریزد.


الکتریکی، یک لوله توخالی، یک میله مارپیچ حلزونی و تعدادی بشتاب می باشد. میله مارپیچ توسط موتور در داخل لوله خالی بشتاب می باشد.



دانخوری اتوماتیک



دانخوری بشتابی اتوماتیک



سیستم توزیع دان

بخش‌های خاصی از دستگاه گوارش بروز می‌کند. حیوانات دیگر از جمله دامهای اهلی، مقداری غذا خورده، استراحت می‌کنند تا غذا هضم شود، ولی مرغ برخلاف آنها به طور مرتب در حال غذاخوردن است. با توجه به همین ویژگی است که باید تعداد آبخوریها و دانخوریها را طوری محاسبه و تأمین کنید که کوچکترین محدودیتی برای دسترسی به غذا پیش نیاید، همچنین شرایط محیطی را در جایگاه، به گونه‌ای فراهم سازید که موجب کاهش اشتهاز جوجه شود.

مهتمرين عوامل مؤثر در مصرف غذای جوجه‌های گوشتی

به شرح زیر است:

- ۱- سن
- ۲- جنس
- ۳- تراز
- ۴- میزان تحرک و فعالیت
- ۵- میزان رشد جوجه
- ۶- کیفیت غذا
- ۷- طعم و مزه غذا
- ۸- درجه حرارت و رطوبت جایگاه
- ۹- سلامت گله

علاوه بر موارد گفته شده، محققان صنعت مرغداری معتقدند که سطح انرژی جیره، کنترل کننده اصلی مصرف روزانه غذای جوجه می‌باشد. از این‌رو مقدار هر یک از مواد مغذی (پروتئین، کلسیم و ...) در جیره باید بر اساس میزان انرژی آن تنظیم شود، به عبارت دیگر جوجه گوشتی تا وقتی غذا می‌خورد که انرژی موردنیاز بدنش تأمین گردد، از این‌رو اگر انرژی جیره کم باشد مصرف غذای او بیشتر می‌شود پس جیره مقرن به صرفه نیست و اگر انرژی جیره بیش از حد باشد مصرف غذای جوجه کم می‌شود که در این وضعیت احتمال کمبود سایر مواد مغذی (پروتئین و ...) پیش می‌آید.

جدول صفحه بعد میزان انرژی و پروتئین موردنیاز گله‌های مختلط (جوجه خروسها و مرغها) را در سنین مختلف نشان می‌دهد.

**مزایای دانخوریهای اتوماتیک:** استفاده از دانخوریهای اتوماتیک در مقایسه با دانخوریهای دستی دارای مزایای زیر است:

- ۱- ریخت و پاش دان کمتر است.
- ۲- بهداشتی تر است.
- ۳- به نیروی انسانی کمتری نیاز دارد.

## آشکال مختلف دان

دان از نظر ظاهری به شکل‌های زیر استفاده می‌شود: آردی (مش): این شکل دان از آسیاب کردن اقلام تشکیل‌دهنده جیره غذایی بدست می‌آید.

اگر مواد غذایی را خودتان آسیاب می‌کنید باید درجه خردشدن دان را مناسب با سن جوجه در نظر بگیرید. بدین صورت که در سنین پایین، مواد را باید به صورت کاملاً آردی و نرم درآورید و سپس در مخلوط کن، مخلوط کنید. هرچه سن جوجه بالا می‌رود باید ذرات آسیاب شده درشت‌تر شود.

پلت: غذای مخلوط آردی شکل به وسیله بخار آب حرارت داده می‌شود تا به صورت خمیری درآید. سپس از دستگاه پلت زنی عبور داده می‌شود و به شکل استوانه‌های کوچکی به نام «پلت» درمی‌آید.

کرامبل: گاهی اوقات دانه‌های پلت به علت بزرگی و سفتی، برای جوجه‌ها قابل استفاده نیستند. از این‌رو با استفاده از غلتکهای مخصوص، آنها را خرد کرده، به صورت حبه درمی‌آورند.

## میزان مصرف دان در جوجه‌های گوشتی

آیا باحال فکر کرده‌اید که مصرف غذای جوجه‌های گوشتی در شب‌انه‌روز چه میزان است و یا آنها چند وعده غذا در شب‌انه‌روز می‌خورند و یا اینکه جوجه‌های گوشتی چه وقت احساس گرسنگی می‌کنند؟ عموماً نشانه‌های نیاز به غذا در جوجه به دنبال خالی شدن

پیمانه مهارتی: تغذیه جوجه گوشتی شماره شناسایی: ۱۱۱۱۰۱۱۰۴-۵۳	مهارت: پرورش جوجه گوشتی شماره شناسایی: ۱۱۱۱۰۱۱۰۴-۵
--	---

نسبت انرژی به پروتئین	درصد پروتئین	میزان انرژی کیلوکالری به کیلوگرم	سن (به روز)	نوع دان
۱۲۸-۱۳۳	۲۳-۲۴	۳۰۸۰	۱-۱۴	پیش‌دان
۱۵۲	۲۱	۳۱۹۰	۱۵-۳۷	میان‌دان
۱۷۸-۱۷۷	۱۸/۵	۳۳۰۰	۳۸-۵۶	پس‌دان

مثال: اگر انرژی قابل متابولیسم هر کیلوگرم جیره‌ای  $۳۲۰۰$  کیلوکالری انرژی و پروتئین آن  $۲۱$  درصد باشد جیره برای چه سنی از جوجه مناسب است؟

جیره برای جوجه‌های  $۱۵ / ۳$   $\frac{۳۲۰۰}{۲۱}$ . نسبت انرژی به پروتئین تا  $۳۷$  روز مناسب است.

ستون آخر جدول، نسبت میزان انرژی به پروتئین را نشان می‌دهد که می‌توانید از طریق فرمول زیر بدست آورید:

$$\frac{\text{میزان انرژی قابل متابولیسم (کیلوکالری در کیلوگرم)}}{\text{درصد پروتئین}} = \text{نسبت انرژی به پروتئین}$$

#### فاصله و عده‌های غذاخوردن جوجه بر حسب سن

فاصله و عده‌های غذاخوردن در روز به دقیقه	سن جوجه به هفته
۲۱	۲
۳۰	۴
۳۷	۶
۴۰	۸

#### جدول میزان مصرف غذا در جوجه‌های گوشتی برای ۱۰۰۰ جوجه گوشتی در سنین مختلف

سن به هفته	کیلوگرم در هفتة	غذا (کیلوگرم در روز)	سن به هفته
۱	۱۰۴	۱۴/۹۸	۱
۲	۱۹۰	۲۷/۲۴	۲
۳	۲۶۸	۴۰/۸۶	۳
۴	۳۷۱	۵۳/۸۱	۴
۵	۴۶۰	۶۵/۸۳	۵
۶	۶۳۵	۹۰/۸۰	۶
۷	۸۳۲	۱۱۸/۹۴	۷
۸	۹۲۴	۱۳۲/۱۱	۸

آزمون نهایی

- ۱- میزان مصرف آب جوجه‌ها به چه عواملی بستگی دارد؟  
۲- فواید اضافه کردن ویتامینها و الکترولیتها به آب آشامیدنی جوجه‌ها، در روزهای اول زندگی را توضیح دهد.

۳- در انتخاب آبخوری چه عواملی را باید در نظر گرفت؟ توضیح دهید.

۴- میزان پرتوئین موردنیاز جوجه در دو هفته اول زندگی، ..... درصد است.

الف: ١٧ ب: ٢٠ ج: ٢٣ د: ٢٦

۵- سه نمونه از مواد تأمین کننده پوستیز، حیوانی، رانام بود.

۶- کدام ماده برای تأمین انرژی، حوامه، استفاده می شود؟

الف : بودر، ماهی، ب : ذرت، ح : صدف د : کنحاله، تخم، نه

۷- کدام گزینه حاوی عناصر بـ نباشد؟

الف : بـ

۹ کتاب ایمان شفیعی

۱۰- مام مدد داری پرستیں بیسراست.

د: سجائمه بحث پی به  
ج: جو  
ب: سدم  
اٹ: دری

۱- به چه دلیل نتیجه نحم پیبه در جیره عدایی جوجه کوسی

ج دهید.

١١-

۱۲- مزایای دانخوریهای اتوماتیک را بنویسید.

۱۳- اشکال مختلف دان را نام ببرید.

۱۴- حادث تغذیه مبالغ نسبت ارزشی

۱۸ عماماً مُؤْشِّدَ مُصْفِي غذاءِ حمْحِمَانَاهِ بَلَدِ

١٤ دعا و دعاء و دعاء

۱۱۰

بـ: ۱۰۰ تـ: ۱۰۰ جـ: ۱۰۰

مهرات: پژوهش جوجه گوشتی  
شماره شناسایی: ۲۱۱۱۰۱۱۰۴-۵

پیمانه مهارتی: تغذیه جوجه گوشتی  
شماره شناسایی: ۲۱۱۱۰۱۱۰۴-۵۳

## منابع

- ۱- فرخوی محسن و سایرین، راهنمای کامل پژوهش طیور، (سازمان اقتصادی کوثر). معاونت تحقیق و پژوهش وزارت کشاورزی
- ۲- سنگی محمدحسن و سایرین، اصول پژوهش طیور، وزارت آموزش و پژوهش
- ۳- یزدی کامران رضا، پژوهش و نگهداری جوجه گوشتی، اداره تدوین فنون مرکز نشر و تصویر وزارت جهاد سازندگی
- ۴- نیکخواه علی، راهنمای تغذیه طیور، دانشگاه تهران
- ۵- زهری مرادعلی، پژوهش طیور گوشتی، انتشارات دانشگاه تهران
- ۶- گلیان ابوالقاسم و سایرین، تغذیه طیور، (چاپ دوم)، سازمان اقتصادی کوثر، ۱۳۷۸
- ۷- محمودزاده نیکنام حمید، راهنمای عملی پژوهش جوجه گوشتی، انتشارات خردمند، ۱۳۶۹
- ۸- زهری مرادعلی، اصول پژوهش طیور، انتشارات دانشگاه تهران
- ۹- شرکت سهامی پشتیبانی امور دام کشور، راهنمای مدیریت پژوهش جوجه گوشتی آرین، مرکز پشتیبانی طیور، ۱۳۷۶