


## بخش چهارم

### حبوبات



## حبوبات

در فصول گذشته، با چند محصول از خانواده‌ی غلات به عنوان مهم‌ترین خانواده‌ی گیاهی در زراعت و تأمین کننده‌ی مواد غذایی، آشنا شدید. هم‌چنین به اهمیت آن‌ها از جنبه‌های مختلف و روش‌های تولید آن‌ها پی بردید. غلات همان‌گونه که ذکر شد، منبع اصلی تولید کربوهیدرات‌ها هستند. این مواد ضمن شرکت در ترکیبات ساختمانی بدن، در تأمین انرژی مورد نیاز ما نقش بسیار مهمی دارند. در کشورهای مرتفعه حدود ۴۰–۳۰ درصد و در کشورهای فقیر، حدود ۹۰–۸۰ درصد انرژی روزانه از کربوهیدرات‌ها تأمین می‌شود.

می‌دانید که بدن ما علاوه بر کربوهیدرات‌ها به چربی‌ها، ویتامین‌ها، مواد معدنی، آب و به خصوص پروتئین‌ها<sup>۱</sup> احتیاج دارد. پروتئین‌ها که از اسیدهای آمینه ساخته شده‌اند، قسمت اصلی سلول‌های سازنده‌ی بدن ما را تشکیل می‌دهند. علاوه بر این، هورمون‌ها، آنزیم‌ها و ژن‌ها عموماً از پروتئین ساخته شده‌اند. لذا ضمن این که ۲۰ درصد وزن بدن از پروتئین می‌باشد، بسیاری از اعمال حیاتی آن نیز به وسیله‌ی همین ترکیبات پروتئینی صورت می‌گیرد. با توجه به نقش پروتئین‌ها در ساختمان و اعمال حیاتی بدن، تأمین آن به اندازه‌ی کافی برای رشد و نمو هر فرد، بسیار مهم و ضروری می‌باشد و عدم تأمین آن به خصوص در کودکان عوارض و خیم و جبران ناپذیری را به دنبال خواهد داشت. به عنوان مثال، چون ۸۰ درصد رشد نهایی مغز در ۳ سال اول زندگی فرد صورت می‌گیرد، لذا کمبود مواد پروتئینی در این سنین، مانع از رشد مناسب مغز خواهد شد.

شما با سنی حدود ۱۵–۱۸ سال، روزانه حداقل به ۵۴ گرم پروتئین نیاز دارید، ولی تأمین همین حدّاًقل نیز از مشکلات عمدی بشر امروز است. تحقیقات نشان داده است که بیش از  $\frac{2}{3}$  جمعیت جهان که عمدتاً در کشورهای در حال توسعه بسر می‌برند، نیم گرسنه بوده، از سوء تغذیه رنج می‌برند. سوء تغذیه غالباً ناشی از کمبود پروتئین و بعضاً چربی در جیره‌ی غذایی می‌باشد. با این توضیحات، فکر می‌کنیم به اهمیت پروتئین‌ها پی بردیم باشید. حال این سؤال مطرح می‌شود که منابع اصلی پروتئین‌ها کدامند؟ به طور کلی حیوانات و گیاهان دو منبع اصلی پروتئین موردنیاز بشر می‌باشند که بر حسب میزان درآمد افراد یا درآمد ملی یک کشور و هم‌چنین سلیقه و سنت‌ها، نسبت استفاده از این دو منبع تغییر می‌کند. در کشورهای توسعه یافته، بیشتر پروتئین حیوانی و در کشورهای در حال توسعه بیشتر از پروتئین گیاهی استفاده می‌شود. چرا؟ ضمن این که پروتئین گیاهی اساس

۱- پروتئین Protein از کلمه‌ی یونانی پروتئوس (Proteus) به معنی برترین اقتباس شده، که به مفهوم برتری ماده‌ی خاصی بر سایر مواد است.

تولید پروتئین حیوانی است، لذا در بین گیاهان، گیاهان پروتئین دار اهمیّت ویژه‌ای دارند. در بین گیاهان درصد پروتئین از یک تا بیش از ۴۰ درصد متغیر است (جدول ۱-۴). و از این نظر در بین گیاهانی که دانه‌ی آن‌ها به طور مستقیم به مصرف انسان می‌رسد، حبوبات مقام اول را دارند، تا آنجا که به حق آن‌ها را گوشت فقرانه نهاده‌اند. حبوبات<sup>۱</sup> به آن دسته از گیاهان خانواده‌ی نخود<sup>۲</sup> گفته می‌شود که عمدتاً دانه‌ی آن‌ها به منظور تأمین پروتئین، در تغذیه‌ی انسان به کار می‌رود.

**جدول ۱-۴— مقایسه‌ی درصد پروتئین چند محصول زراعی (به‌طور متوسط)**

| محصول        | گندم<br>(دانه) | جو<br>(دانه) | برنج<br>(دانه) | سبزی<br>(دانه) | سبز زمینی<br>(دانه) | نخود<br>(دانه) | لوبیا<br>(دانه) | سویا<br>(دانه) |
|--------------|----------------|--------------|----------------|----------------|---------------------|----------------|-----------------|----------------|
| درصد پروتئین | ۹-۱۳           | ۱۰-۱۲        | ۶-۸            | ۱-۴            | ۲-۳                 | ۱۷-۲۰          | ۱۹-۲۴           | ۳۹-۴۲          |

### تحقیق کنید

چه تفاوت کمی و کیفی بین پروتئین گیاهی و حیوانی وجود دارد.

### اهمیّت غذایی و زراعی حبوبات

در زراعت، حبوبات بعد از غلات بزرگ‌ترین، متنوع‌ترین و با اهمیّت‌ترین گروه گیاهی می‌باشد. ارزش غذایی حبوبات، عمدتاً به لحاظ بالا بودن درصد پروتئین، ویتامین‌ها، مواد معدنی و یا درصد رونگ آن‌ها (سویا) می‌باشد که از این نظر بر حسب مورد، توضیح بیشتری خواهیم داد. حبوبات از نظر زراعی، دارای ویژگی‌های بسیار مهمی هستند که آن‌ها را در بین سایر گیاهان فوق العاده با ارزش نموده است. این ویژگی، توانایی آن‌ها در تثبیت ازت اتمسفری می‌باشد. می‌دانید که حدود ۷۸ درصد حجم هوایی که ما را احاطه کرده، از گاز نیتروژن تشکیل شده است. به عبارت دیگر، در بالای هر هکتار زمین زراعی، هزاران تن ازت وجود دارد. با این حال، ازت یکی از مهم‌ترین عوامل محدود‌کننده‌ی رشد گیاهان در بیشتر نقاط می‌باشد. چرا؟ چون ازت موجود در هوا به صورت مولکولی (N<sub>۲</sub>) است که در این حالت یک گاز بی اثر و غیر قابل جذب برای گیاه می‌باشد. گیاهان، زمانی می‌توانند از ازت اتمسفر استفاده نمایند که این ازت «ثبتیت»<sup>۳</sup> گردد. منظور از

۱— Pulse crops

۲— fabaceae

۳— AZOT Stabilization

ثبتت ازت یعنی ترکیب ازت مولکولی با عناصر دیگر. ثبت ممکن است به ۳ صورت طبیعی، مصنوعی یا بیولوژیکی انجام پذیرد.

غیر از ثبت مصنوعی که طی آن گاز نیتروژن ( $N_2$ ) را در حرارت بالا و فشار زیاد با هیدروژن ( $H_2$ ) ترکیب می‌نمایند، سالانه حدود ۱۰۰ میلیون تن ازت اتمسفری، ثبت می‌شود که ۱۰ درصد آن به طور طبیعی (تخلیه‌ی الکتریکی) و بقیه به صورت بیولوژیکی به وسیله‌ی جلبک‌ها، باکتری‌ها و میکروارگانیسم‌های خاص، صورت می‌گیرد.

باکتری‌های ثبت کننده ازت یا به صورت آزاد<sup>۱</sup> یا به صورت همزیست با رشد گیاهان مخصوصی زندگی می‌کنند. تمام خانواده‌ی حبوبات با جنسی از باکتری‌های ثبت کننده ازت به نام ریزوپیوم<sup>۲</sup> می‌توانند همزیستی نمایند. از این طریق، سالانه حدود ۱۴–۳۵ میلیون تن ازت ثبت می‌شود. یعنی این خانواده به تنها بیش از  $\frac{1}{3}$  کل ثبت بیولوژیکی ازت را به عهده دارند که نمایانگر نقش این گیاهان در تعادل ازت کره‌ی زمین و نیز اهمیت زراعی آن‌ها می‌باشد.

## فعالیت

مقدار ثبت ازت در گیاهان مختلف را به دست آورده آن‌ها را به ترتیب از کم ترین به بیش ترین مقدار مرتب کنید.

از نظر لغوی حبوبات جمع «حبوب» است و حبوب نیز خود جمع حبّ به معنی دانه‌ی خوراکی، یا کُروی می‌باشد. این گیاهان عبارتند از: لوپیا، نخود، عدس، ماش، لوپیای چشم بلبلی و باقلاء. البته هر یک از آن‌ها خود شامل انواع متعددی می‌باشند. سویا و بادام زمینی گرچه در تعریف حبوبات می‌گنجند ولی آن‌ها را جزء دانه‌های روغنی به حساب می‌آوریم.

حبوبات از نظر غذایی بسیار با ارزش هستند (جدول ۲–۴)، همان‌طور که جدول نشان می‌دهد، تمام این محصولات درصد پروتئین بالایی<sup>۳</sup> داشته، از نظر مواد معدنی و ویتامین‌ها نیز نسبتاً غنی می‌باشند. می‌دانید که این مواد چه ارزش و اهمیتی برای بدن ما دارند. البته باید یادآور شویم که

۱- ازتوباکترها (Azotobacters)، کلوستریدیوم‌ها (Clostridiums)، و رودوسپیریلوم‌ها (Rodospirillums)

۲- Rhizobium

۳- پروتئین حبوبات قابلیت هضم متفاوتی دارند و به طور متوسط حدود ۷۵ درصد است.

پروتئین حبوبات، تنها ۱۸/۵ درصد پروتئین گیاهی را شامل می‌شود و غلّات با وجود درصد پروتئین کم، حدود ۶۶ درصد این نوع پروتئین را فراهم می‌سازند. چرا؟

جدول ۲-۴- ارزش غذایی حبوبات مورد کاشت در ایران (۱۰۰ گرم)

| نوع گیاه       | کالری و ترکیبات |              |                           |                           |                           |                             |                                 |                  |                 |                   |                   |                       |                    |
|----------------|-----------------|--------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|-----------------------------|---------------------------------|------------------|-----------------|-------------------|-------------------|-----------------------|--------------------|
|                | کلکسیون         | بروتین (گرم) | پروتین بینیمین (میلی گرم) | پروتین بینیمین (میلی گرم) | پروتین بینیمین (میلی گرم) | پروتین بینیمین A (میلی گرم) | پروتین بینیمین الالی (میلی گرم) | کلسیم (میلی گرم) | فیبر (میلی گرم) | پتاسیم (میلی گرم) | پروتین (میلی گرم) | کربوهیدرات (میلی گرم) | دیتامین (میلی گرم) |
| نخود معمولی    | ۳۵۸             | ۱۱           | ۲۰/۱                      | ۲۰/۱                      | ۷/۲                       | ۱۴۹                         | ۲/۹                             | ۴/۹              | ۴               | ۲۰/۱              | ۲۰/۱              | ۱۱                    | ۳/۱                |
| عدس            | ۳۴۶             | ۱۱           | ۲۴/۲                      | ۲۴/۲                      | ۶/۱                       | ۵۶                          | ۲/۲                             | ۳/۱              | ۱/۸             | ۲۴/۲              | ۲۴/۲              | ۱/۸                   | ۱/۸                |
| ماش            | ۳۴۰             | ۱۱           | ۲۳/۹                      | ۲۳/۹                      | ۷/۸                       | ۱۴۵                         | ۳/۴                             | ۴/۲              | ۱/۳             | ۲۳/۹              | ۲۳/۹              | ۱/۳                   | ۲/۱                |
| لوبيا معمولی   | ۳۴۱             | ۱۱           | ۲۲/۱                      | ۲۲/۱                      | ۶/۷                       | ۱۳۷                         | ۳/۸                             | ۴/۲              | ۱/۷             | ۲۲/۱              | ۲۲/۱              | ۱/۷                   | ۰/۵۴               |
| نخود فرنگی     | ۳۴۶             | ۱۱           | ۲۲/۵                      | ۲۲/۵                      | ۴/۸                       | ۶۴                          | ۲/۶                             | ۵/۵              | ۱/۸             | ۲۲/۵              | ۲۲/۵              | ۱/۸                   | ۰/۷۲               |
| باقلاء         | ۳۴۲             | ۱۱           | ۲۲/۴                      | ۲۲/۴                      | ۳/۶                       | ۵۰                          | ۳/۴                             | ۷/۸              | ۲               | ۲۲/۴              | ۲۲/۴              | ۲                     | ۰/۵۴               |
| لوبیا چشمبلبلی | ۳۴۲             | ۱۱           | ۲۲/۴                      | ۲۲/۴                      | ۵/۷                       | ۷۶                          | ۳/۵                             | ۴/۳              | ۱/۸             | ۲۲/۴              | ۲۲/۴              | ۱/۸                   | ۰/۹۲               |

### فعالیت

تمام گیاهانی را که در منطقه‌ی شما تحت عنوان حبوبات (بقولات یا بنشن) کاشته می‌شود جمع‌آوری کرده و ضمن مطالعه‌ی شکل ظاهری اندام‌های آن‌ها، در کلکسیون خود نگهداری کنید.

با توجه به ارزش غذایی موجود در حبوبات (جدول ۲-۴) و نیز نقش آن‌ها در بهبود وضعیت خاک، (سیستم ریشه و تثبیت ازت) تولید آن‌ها در جهان و ایران رو به افزایش است. اطلاعات نشان می‌دهد که حبوبات هم از نظر سطح زیر کشت و هم از نظر عملکرد در واحد سطح، در حال رشد می‌باشند. در ایران، باز هم با استناد به آمارنامه‌های FAO<sup>۱</sup> میزان سطح زیر کشت، تولید و عملکرد

۱-Food and Agriculture Organization of the united netions

حبوبات به شرح جدول ۴-۳ می‌باشد :

جدول ۴-۳ نشان می‌دهد که در ایران از سال ۱۳۵۸ تا ۱۳۶۹، تولید حبوبات افزایش یافته است ولیکن این افزایش در اثر فزونی سطح زیر کشت بوده است نه افزایش راندمان تولید گیاه، لذا بایست به حبوبات از این نظر توجه نموده و عملکرد آن‌ها را بالا برد. در این بخش از حبوبات فصل سرد به نخود و از حبوبات فصل گرم به لوبيا پرداخته‌ایم و شما را طوری با خصوصیات و نیازهای آن‌ها آشنا خواهیم نمود که بتوانید محصول بیشتری در واحد سطح به دست آورید.

جدول ۴-۳- میزان سطح زیر کشت، عملکرد و تولید حبوبات ایران طی چند سال FAO

| سطح زیر کشت (هزار هکتار) |      |      |      | عملکرد (کیلوگرم در هکتار) |      |      |      |         | تولید (هزار تن) |      |      |  |
|--------------------------|------|------|------|---------------------------|------|------|------|---------|-----------------|------|------|--|
| ۱۹۷۹-۸۱                  | ۱۹۸۸ | ۱۹۸۹ | ۱۹۹۰ | ۱۹۷۹-۸۱                   | ۱۹۸۸ | ۱۹۸۹ | ۱۹۹۰ | ۱۹۷۹-۸۱ | ۱۹۸۸            | ۱۹۸۹ | ۱۹۹۰ |  |
| ۲۴۱                      | ۵۳۸  | ۵۵۱  | ۵۶۲  | ۱۰۳۸                      | ۷۰۵  | ۷۰۱  | ۷۰۶  | ۲۴۸     | ۳۷۹             | ۲۸۶  | ۳۹۷  |  |

تحقیق کنید

جدول ۴-۳ را برای سال ۲۰۰۵ کامل نمائید.

# فصل اول

## نخود<sup>۱</sup>. *Cicer arietinum*.



هدف‌های رفتاری: انتظار می‌رود در پایان این فصل فراگیران بتوانند:

- ۱- تاریخچه و منشأ پیدایش نخود را در دو سطر توضیح دهند؛
- ۲- اهمیت اقتصادی، ارزش غذایی و موارد استفاده‌ی آن را بنویسند؛
- ۳- خصوصیات گیاه‌شناختی نخود را توضیح دهند؛
- ۴- شرایط مناسب رشد و نمو آن را شرح دهند؛
- ۵- ارقام مختلف نخود را نام ببرند و چگونگی آماده نمودن رقم مطلوب را برای کاشت توضیح و انجام دهند؛
- ۶- عملیات آماده سازی را توضیح و انجام دهند؛
- ۷- عملیات کاشت، داشت و برداشت نخود را توضیح و انجام دهند.
- ۸- موقعیت این محصول را از نظر سطح زیرکشت و عملکرد بیان کنند.

---

۱- نخود با نام علمی *Cicer arietinum* که به انگلیسی آن را Chick pea می‌نامند، در زبان فارسی به نام‌های نخود معمولی و نخود ایران معروف است و تلفظ صحیح آن نَخُود است که به غلط نُخُود نیز تلفظ می‌نمایند.

## کلیات

نخود یکی از حبوبات مهم و با ارزش و در عین حال بسیار قدیمی است. ارزش غذایی نخود (جدول ۲-۴) از یک طرف و ارزش زراعی و خصوصیات اکولوژیکی آن از طرف دیگر، سبب شده است که در بین حبوبات در سطح جهان در مقام دوم و در ایران و چندین کشور خشک و نیمه خشک، در مقام اول قرار گیرد. از نظر اقتصادی و تجارت جهانی، میزان صادرات و واردات این محصول در سطح جهان به طور مداوم افزایش یافته است که نشان دهنده ای افزایش میزان مصرف این فرآورده می باشد.

## تاریخچه و منشأ نخود

نخود، یکی از قدیمی‌ترین گیاهان خانواده‌ی حبوبات است. مدارک باستان‌شناسی نشان می‌دهد که در ۵۴۵ سال قبل از میلاد، در منطقه‌ی حاجیلر ترکیه این گیاه وجود داشته است. کشت نخود در ۱۵۸ سال قبل از میلاد مسیح، در مصر نیز ثابت شده است.

از نظر منشأ، به احتمال زیاد منشأ نخود، جنوب شرقی ترکیه و نواحی مرزی ترکیه با سوریه، می‌باشد. واویلوف<sup>۱</sup> منشأ نخودهای دانه‌درشت را حوزه‌ی مدیترانه و نخودهای دانه‌ریز را آتیویی می‌داند.

ارزش غذایی و موارد مصرف نخود: برخی مواد تشکیل دهنده‌ی نخود را در جدول ۴-۴ نشان داده‌ایم. علاوه بر این، در هر ۱۰۰ گرم دانه‌ی نخود ۴۰-۵۰ گرم مواد فندی و حدود ۱۱۶ میلی‌گرم فسفر وجود دارد، لذا نخود در جیره‌ی غذایی، به خصوص برای مردمان کشورهای در حال توسعه‌ی مناطق خشک و نیمه خشک، هم از نظر مواد پروتئینی و معدنی و هم از نظر تأمین کالری، بسیار مهم می‌باشد.

## خصوصیات گیاه‌شناختی و ارقام نخود

نخود زراعی (شکل ۲-۴) گیاهی است یک‌ساله از خانواده‌ی حبوبات و زیر خانواده‌ی پروانه آساها<sup>۲</sup> به صورت‌های مختلف خواهد بود، بوته‌ای و ارقام جدید برآفرشته و پابلند، ارتفاع بوته به طور متوسط ۳۰-۵۰ سانتی‌متر و به ندرت تا ۱۰۰ سانتی‌متر، با اشعابات متعدد و

پوشیده از کرک های ظرف. ریشه هی راست، قوی و سریع الرشد و منشعب که اشعابات فرعی، بیشتر در لایه های سطحی (۳۰-۴۰ سانتی متری خاک) در حالی که ریشه هی اصلی در وضعیت مناسب خاک تا بیش از دو متر نفوذ می کند. بر روی ریشه، غده ها<sup>۱</sup> یا گره های کلیوی شکل در اثر همزیستی با باکتری های همزیست ایجاد می شود (شکل ۱-۴). برگ های مرکب فرد شاهدای با گوشوارک و متناوب، گل ها نامنظم و کامل که به صورت یک یا دو و به ندرت ۵ تایی در گل آذین خوشه ای قرار گرفته اند. رنگ گل ها سفید، ارغوانی، آبی روشن و آسمانی و صورتی می باشد. ۵ کاسبرگ گلبرگ پروانه ای شکل، ۱۰ پرچم و یک مادگی یک برجه ای، تخدمان زیرین و تمکن جانبی است. نوع میوه هی نیام یا غلاف به طول ۳-۵ سانتی متر است که معمولاً یک و بعضاً دو و به ندرت ۳ عدد دانه درون آن وجود دارد.



شکل ۱-۴ – گره های باکتریایی بر روی ریشه هی نخود

<sup>۱</sup>— Nodozitea



شکل ۴-۲—نخود و اندام‌های مختلف آن

### ارقام نخود

به طور کلی نخودهای زراعی را از نظر شکل دانه به دو تیپ تقسیم بندی می‌نمایند:

۱—تیپ دسی<sup>۱</sup>: این تیپ شامل نخودهای دانه ریز با سطح پوست ناصاف و رنگی است که در صد سطح زیر کشت نخود دنیا (عمدتاً در شبه قاره‌ی هند) به این تیپ اختصاص دارد. در ایران از این تیپ نخود سیاه کاکا و نخود قهوه‌ای پیروز را می‌توان نام برد.

۲—تیپ کابلی<sup>۲</sup>: این تیپ دانه درشت، پوست صاف و کرمی رنگ می‌باشد. ۱۵ درصد نخود دنیا از این تیپ است که عمدتاً به نواحی حوزه‌ی مدیترانه مربوط می‌شود. در ایران از این تیپ ارقام کورش، البرز و جم، مددی است که کاشته می‌شود. اخیراً رقم ۶۰۳۱—۱۲ از بین توده‌های

۱—Desi (Micro Carpa)

۲—Kabuli (Macro Carpa)

بومی با عملکردی بالای ۲/۵ تن و رقم فلیپ<sup>۱</sup>-۸۶-۲۰ از بین ارقام سوریه که پابلند و مناسب برداشت مکانیزه می‌باشند، انتخاب و معرفی شده‌اند. دانه‌های این تیپ را بر حسب وزن هزار دانه، به ۳ دسته تقسیم می‌کنند. نخودهای درجه ۱ بیش از ۲۵° گرم، نخود درجه ۲ بین ۲۵°-۱۵° و نخودهای درجه ۳ بین ۱۵°-۸° گرم وزن دارند. شکل ۴-۳ تیپ‌های مختلف نخود را نشان می‌دهد.

### فعالیت

ارقام مختلف نخود را در منطقه‌ی خود جمع آوری کرده آن‌ها را از نظر شکل ظاهری، ویژگی‌های اقلیمی و زراعی مورد مکالمه قرار دهید.



شکل ۴-۳- تیپ‌های مختلف دانه‌ی نخود

### عوامل مؤثر در رشد و نمو نخود

امروزه نخود در ۵ قاره‌ی جهان کاشته می‌شود که این خود نمایانگر سازگاری وسیع این گیاه است. با این حال حدّاً کثر عملکرد را در مناسب‌ترین شرایط اقلیمی دارا می‌باشد. لذا شناخت این

۱- Fillip 20-86

عوامل و حد مناسب آن بسیار ضروری است. در این مورد، چهار عامل حرارت، نور، رطوبت و خاک را بررسی می‌نماییم.

**الف — حرارت:** نخود از حبوبات نسبتاً مقاوم به سرما می‌باشد، به طوری که اگر نزول درجهٔ حرارت، تدریجی باشد، این گیاه در مرحلهٔ رویشی می‌تواند تا یارده درجهٔ سانتی‌گراد زیر صفر را به خوبی تحمل نماید. هرچند تا ۳۵ درجه سانتی‌گراد در مرحلهٔ رشد رویشی گیاه به خوبی رشد می‌کند اما دمای بیش از ۲۵ درجه در مرحلهٔ گلدهی و بیش از ۲۷ درجه در مرحلهٔ تشکیل و رسیدن میوه برای این گیاه نامطلوب است.

حدائق و مناسب ترین درجهٔ حرارت در مراحل مهم رشد و نمو، در جدول ۴-۴ آمده است. طول دورهٔ رشد و رسیدن نخود بسیار متغیر است (کمتر از ۹۰ تا بیش از ۲۲۰ روز) و با توجه به شدت سرمای زمستانه، آن را هم در پاییز (بخش‌هایی از خوزستان، فارس و سایر نقاط نیمه گرمسیر ایران و جهان) و هم در بهار (آذربایجان، کردستان و سایر نقاط سرد) می‌كارند.

#### جدول ۴-۴ — دمای حدائق و مناسب برای چند مرحلهٔ مهم رشدی در نخود زراعی

|       |       | تشکیل و رشد اندام‌های زایشی |       | رشد اندام‌های رویشی |       | جوانه زدن |       |
|-------|-------|-----------------------------|-------|---------------------|-------|-----------|-------|
| حدائق | مناسب | حدائق                       | مناسب | حدائق               | مناسب | حدائق     | مناسب |
| ۲۰-۲۴ | ۱۲-۱۵ | ۱۷-۲۱                       | ۱۲-۱۵ | ۱۷-۱۸               | ۵-۶   | ۹-۱۲      | ۵-۶   |

#### تحقیق کنید

دمای حداقل نخود در مراحل مختلف را پیدا کرده و جدول ۴-۴ را اصلاح کنید.

**ب — نور:** نخود گیاهی است آفتاب پسند و معمولاً روز بلند. با این حال واریته‌های مختلف آن، نسبت به طول روز واکنش‌های متفاوتی نشان می‌دهند و زود رس‌ها معمولاً بی‌تفاوت هستند. گل‌دهی این گیاه، علاوه بر طول روز، تحت تأثیر اثر متقابل نور و حرارت شروع شده، بعضًا بیش از یک ماه به طول می‌انجامد. نخود گیاهی است با رشد نامحدود.

**ج — رطوبت:** نخود گیاهی است مقاوم به خشکی ولی برای جوانه زدن باید تا ۱۲۰ درصد

وزن بذر، آب جذب نماید تا عمل تندش<sup>۱</sup> و جوانه زنی صورت گیرد. لذا شرایط مناسب آب در خاک یا خیساندن بذر قبل از کاشت برای سرعت و یکنواختی جوانه زنی بسیار مهم است. نخود را در مناطقی با بارندگی حتی ۳۰۰ میلی متر به شرط تناسب پراکندگی نزولات با رشد گیاه، می‌توان به خوبی دیم کاری نمود. ریشه‌ی عمیق و برگ‌های نسبتاً کوچک و فرم بوته‌ای از خصوصیاتی است که این توانایی را به گیاه می‌دهد.

خشکی بیش از حد، همچنین رطوبت زیاد، مانع رشد مناسب گیاه می‌گردد. به همین علت، در مناطقی چون بوشهر، هرمزگان، خوزستان و یزد به علت بارندگی کم زراعت دیم، و نیز در حاشیه‌ی خزر به دلیل رطوبت زیاد، زراعت این گیاه به هیچ صورت معمول نمی‌باشد. تنفس رطوبتی در مرحله‌ی رسیدن دانه، ضمن این که باعث چروکیدگی دانه و کاهش عملکرد می‌شود، روی کیفیت پخت نیز تأثیر سوء دارد. زیرا دانه‌های ریز و چروکیده بسته‌ی ضخیمی دارند و بسیار دیر آب جذب می‌کنند و به همین دلیل دیرباز می‌باشند. علاوه بر این درصد پروتئین آن‌ها نیز کم است. تنفس رطوبتی، روی تشکیل و فعالیت گره‌های همزیست، تأثیر سوئی دارند لذا تثبیت ازت به وسیله‌ی نخود، در این گونه مناطق قابل توجه نمی‌باشد.

**د - خاک:** هر چند نخود در خاک‌های متفاوتی می‌روید، ولی طالب خاک‌های رسی - شنی سبک یا لیمونی که دارای عمق و نفوذپذیری مناسب و آهک کافی است، می‌باشد. رشد نخود در خاک‌های سرد و سنگین و نیز زه دار به هیچ وجه اقتصادی نیست. با این که نخود در بین حبوبات، مقاوم‌ترین گیاه به شوری خاک می‌باشد ولیکن شوری زیاد روی درصد جوانه زنی، رشد و به خصوص عملکرد آن تأثیر بدی دارد. مناسب‌ترین pH خاک برای نخود ۷ می‌باشد ولی در دامنه‌ی ۸/۶ - ۸/۴ نیز کاشت آن امکان‌پذیر است.

## تناوب زراعی نخود

حبوبات را در تناوب، قبل از غلات و یا این که بین دو گیاه وجینی قرار می‌دهند. تناوب ۳ ساله‌ی نخود، گندم، آیش چه در اراضی فاریاب و چه در دیم بسیار معمول است. هم‌چنین می‌توان تناوب دو ساله‌ی گندم، نخود و تناوب چهار ساله‌ی گندم، نخود، جو و ماش یا گندم (جو)، شبدر، پنبه و نخود را ذکر کرد.

۱- به عمل شکافت‌شدن بسته‌ی بذر جهت خروج ریشه گفته می‌شود.

## فعالیت

در منطقه‌ی شما تناوب یا چرخه‌ی زراعی معمول نخود چگونه است؟

## بررسی کنید

چرخه‌ی زراعی منطقه‌ی خود را مورد نقد و بررسی قرار دهید.

## آماده‌سازی خاک

زمان شروع و نیز نوع عملیات آماده‌سازی زمین، چه از نظر فیزیکی و چه از نظر شیمیایی، برای کاشت نخود، همانند هر محصول دیگر به نوع محصول یا زراعت قبلی، نوع خاک، اقلیم منطقه، بهاره یا پاییزه بودن کاشت، اصول تناوب و موارد دیگرستگی دارد. به طور کلی لازم است که ابتدا بقایای محصول قبلی، کاملاً خرد و در سطح مزرعه پخش گردد. این امر چند مزیت دارد: ۱- مانع از هدر رفتن رطوبت شده، زمین را تقریباً از این نظر در حد مناسب نگه می‌دارد. ۲- اجرای عملیات آماده‌سازی مانند پخش کود، پخش علف‌کش و شخم، آسان‌تر و یکنواخت می‌گردد. ۳- تجزیه‌ی بقایای گیاهی، سریع‌تر انجام می‌شود.

بعد از خرد کردن و پخش بقایای محصول قبلی تا شروع فصل کاشت، ممکن است چندین ماه فاصله باشند. در این صورت برای جلوگیری از فرسایش بادی، نبایست شخم زده شود. حتماً باید زمین را قبل از شخم آبیاری کرده، تا هم بخشی از علف‌های هرز سبز شود و هم زمین گاورو و قابل شخم گردد. این روش زراعی مبارزه با علف‌های هرز، روشی بسیار اقتصادی و سالم در کنترل جمعیت علف‌های هرز می‌باشد. چنان‌چه بین برداشت محصول قبلی و کاشت نخود فاصله‌ی زمانی کم باشد، بلافاصله پس از خرد کردن کاه و کلش و رفع عوارض احتمالی در سطح زمین با فراهم شدن شرایط گاورو اقدام به شخم و آماده‌سازی زمین می‌نماییم.

تقویت شیمیایی زمین نخود: در ضمن آماده‌سازی زمین یا هنگام کاشت اقدام به افزودن کودهای شیمیایی پایه از قبیل ازت فسفر و پتاس با توجه به آزمایش خاک و توصیه‌ی کارشناسان می‌نماییم. گوگرد و آهک نیز از مواد غذایی بسیار لازم برای نخود می‌باشند. ضمن این‌که این مواد در اصلاح خاک نیز نقش دارند. در صورت ضرورت (طبق تجزیه‌ی شیمیایی خاک) بایست این مواد را نیز به خاک افروزد.

## فعالیت

حداصل ۱۰۰۰ متر زمین را برای کاشت نخود آماده‌سازی کنید.

آماده کردن بذر: بعد از انتخاب رقم پرمحصول، بازار پسند و سازگار با منطقه، بایست از درجهٔ خلوص و قوهٔ نامیه‌ی قابل قبول آن که به ترتیب ۹۸ و ۹۵ درصد می‌باشد، اطمینان حاصل کرد. از آنجا که ممکن است بذور، حامل بیماری‌های بذر زاد و یا این که خاک دارای بیماری‌های خاکزی باشد، لازم است که بذور را با سموم قارچ کشی مناسب به نسبت توصیه شده ضد عفونی نمود.  
آغشته کردن بذر نخود با باکتری‌های مخصوص<sup>۱</sup> برای کاشت در مناطقی که قبلًاً نخود، نخودفرنگی، باقلاء، عدس یا خلر کاشته نشده است، یکی از عملیات آماده‌سازی بذر نخود می‌باشد.

## فعالیت

مقدار بذر، نوع رقم و ویژگی‌های بذری را که می‌خواهید بکارید، به دست آورید.

## عملیات کاشت

پس از آماده کردن خاک و بذر، عملیات کاشت صورت می‌گیرد. کاشت نخود در عمق ۷-۲ سانتی‌متری خاک به روش‌های درهم و ردیفی صورت می‌گیرد (شکل ۴-۴). در کاشت در هم – که ممکن است دستی یا ماشینی انجام پذیرد – حدود ۱۲۰-۱۰۰ کیلوگرم بذر مصرف می‌شود. در کاشت ردیفی، فاصله‌ی ردیف‌ها را ۵-۳ سانتی‌متر و فاصله‌ی بوته‌ها را بروی ردیف‌ها ۱-۵ سانتی‌متر انتخاب می‌نمایند. به طور کلی، در کاشت نخود، تراکم بوته از ۲۵۰ تا ۵۰۰ هزار در هکتار متغیر می‌باشد.

با توجه به تراکم مطلوب، وزن هزاردانه و ارزش مصرفی رقم مورد کاشت می‌توان میزان بذر در هکتار را محاسبه نمود.

زمان کاشت: همان‌طوری که گفته شده ممکن است بر حسب شرایط منطقه‌ای در بهار یا پاییز به کاشت نخود اقدام نمود. به هر حال، بایست دقّت کرد که این گیاه برای جوانه زدن دمای حداصل ۴-۵ درجه‌ی سانتی‌گراد نیاز دارد. از آنجا که در شرایط مساعد، کاشت هر چه زودتر انجام گیرد، عملکرد

<sup>۱</sup> Rhizobium leguminosarum

بیش تر می شود و حتی این افزایش عملکرد، گاهی تا بیش از  $12^{\circ}$  درصد می رسد، به محض فراهم شدن شرایط مناسب باشد که کاشت آن اقدام نمود. کاشت به دو روش خشکه و هیرم کاری صورت می گیرد. معمولاً<sup>۱</sup> کاشت های پاییزه به صورت خشکه کاری و بهاره به صورت هیرم یا نم کاری می باشد.

### فعالیت

زمین آماده شده خود را با بذور که نوع رقم و ویژگی های آن ها را کاملاً به دست آورده اید در زمان و با روشی که هنرآموز شما تائید می کند، بکارید.



شکل ۴—۴—مزروعه‌ی تحقیقاتی نخود

### عملیات داشت

آبیاری: اوّلین عملیات بعد از کاشت، آبیاری است. آبیاری یا تأمین آب در حد ظرفیت زراعی پیرامون بذر در مرحله‌ی جوانه زنی بسیار مهم است. آزمایش‌های طولانی مدت ( $10$  ساله) در مرکز تحقیقات ایکریسات<sup>۱</sup> نشان داده است (جدول ۴—۵) که وجود رطوبت مناسب در بستر بذر در مرحله‌ی جوانه زنی، نه تنها باعث یکنواختی و سرعت جوانه زدن می شود، بلکه عملکرد ماده‌ی خشک کل بوته و دانه را نیز به طور قابل توجهی افزایش می دهد.

۱— ICRISAT: International Crops Research Institute For The Semi - Arid Tropics

جدول ۴-۵ - رابطه‌ی مقدار آب خاک در مرحله‌ی جوانه‌زنی با عملکرد کل بوته،  
عملکرد دانه در نوعی نخود (متوسط ۱۰ سال)

| مقدار موجودی آب<br>(cm) | مقدار کل ماده‌ی<br>خشک Zn/ha | مقدار عملکرد<br>دانه Zn/ha |
|-------------------------|------------------------------|----------------------------|
| ۲۰                      | ۲/۹                          | ۱/۴                        |
| ۱۵                      | ۱/۶                          | ۰/۹                        |
| ۱۰                      | ۰/۶                          | ۰/۳                        |

با توجه به جدول ۴-۵ مشاهده می‌شود که با دو برابر شدن مقدار رطوبت خاک در مرحله‌ی جوانه‌زنی، عملکرد تقریباً ۵ برابر می‌شود.

نخود بعد از استقرار در خاک و گسترش ریشه، مقاومت خوبی در برابر کم آبی نشان می‌دهد. آزمایش‌های بسیار معتبر و طولانی مدت ثابت کرده است که تأمین آب در مراحل گلدهی و غلاف‌بندی، پیشترین تأثیر را بر عملکرد دانه داشته، آن را بیش از صدرصد افزایش می‌دهد. لذا به شما توصیه می‌کنیم که این دو مرحله را در زراعت نخود، همیشه به خاطر داشته باشید.

واکاری و تُنُک: با وجود ماشین‌های کاشت دقیق که ما آن‌ها را می‌توانیم مطابق خواست خود تنظیم نماییم، عملیات واکاری و تُنُک کردن در زراعت‌های بزرگ تقریباً حذف شده است. با این حال، در زراعت‌های کوچک که در کشور ما هم رایج است و هم‌چنین زمانی که کشت به صورت درهم می‌باشد، برای ایجاد تراکم مطلوب و رسیدن به حدآکثر عملکرد، لازم است که این دو عمل به موقع صورت گیرد.

کنترل علف‌های هرز: بعد از آبیاری، بهخصوص در مراحل اولیه‌ی رشد، وجین از مهم‌ترین عملیات داشت می‌باشد. چنان‌چه در مراحل اولیه‌ی رشد، عمل وجین صورت نگیرد، علف‌های هرز کاملاً بر نخود مسلط می‌شوند. در حالی که  $40^{\circ}$ -۶۰ روز بعد، رشد گیاه به حدی می‌رسد که می‌تواند با برگ‌های شانه‌ای و گسترده‌ی خود سطح زمین را پوشاند، مانع از رشد و غلبه‌ی علف‌های هرز گردد. علف‌های هرزی چون تاج خروس، سلمه‌تره، پیچک، هفت‌بند، یولاف و قیاق در مزارع نخود می‌رویند.

در مزارع کوچک، وجین با دست بهترین روش است، ولی در مزارع نسبتاً بزرگ، ترکیب

ماشین با کارگر با صرفه‌تر و بهتر می‌باشد. در مناطقی که گسترش علف‌های هرز زیاد باشد، ممکن است مبارزه‌ی شیمیایی مطرح شود. علف‌کش‌های انتخابی متعددی برای مزارع نخود تولید شده که برحسب توصیه‌ی کارشناسان می‌توان از آن‌ها در مراحل مختلف اعم از قبل و بعد از کاشت استفاده کرد.

در کاربرد علف‌کش‌ها با توجه به طول دوره‌ی رشد نسبتاً کوتاه این محصول بایست به دوام علف‌کش در خاک بسیار دقیق بود. زمان، مقدار، دفعات و طرز مصرف علف‌کش، بسته به نوع و تراکم علف‌های هرز، شرایط منطقه، زمان کاشت و نوع سم، بسیار متفاوت است. لذا علاوه بر دقت در بروشور سم، به آزمایش‌های صورت گرفته در منطقه نیز بایست کاملاً توجه کرد. با این حال توصیه می‌کنیم «تا می‌توانید سم مصرف نکنید». و با طبیعت، طبیعی بخورد نمایید. در صورت نیاز حتماً توصیه کارشناسان را ملاک عمل خود قرار دهید.

## کنترل آفات و بیماری‌ها

آفاتی چون سوسک چهار نقطه‌ای، سوسک حبوبات، کرم غلاف‌خوار (هلیوپیس) برگ خوار (کارادرینا) و انواعی از شته‌ها، ترپیس‌ها و کنه‌ها به نخود حمله می‌کنند و بیماری‌هایی چون برق‌زدگی، بوته‌زردی، پوسیدگی ریشه، پوسیدگی بذر، نمائُد، ویروس پیچیدگی و تعدادی دیگر به نخود صدمه می‌زنند. کاشت ارقام مقاوم، رعایت تناوب زراعی، تغییر تاریخ کاشت، از روش‌های زراعی برای پیش‌گیری تعدادی از آفات و بیماری‌های فوق است. برای مبارزه‌ی شیمیایی و شناسایی آفات و امراض، به درس حفظ نباتات مراجعه نمایید.

### فعالیت

کلیه‌ی عملیات داشت را در زمین خود انجام دهید، میزان مصرف نهاده و هم‌چنین روش‌ها و زمان مصرف آن‌ها را که با تائید هنرآموزان خود انجام می‌دهید دقیقاً یادداشت کنید.

### برداشت

می‌دانید که ظهور و تلقیح گل‌ها و نیز رسیدن دانه‌ها در نخود، همانند دیگر حبوبات، به دلیل

داشتن رشد نامحدود، یکباره نمی‌باشد. با این حال در بین حبوبات، نخود از جمله گیاهانی است که در صد بالایی از غلاف‌های آن در یک زمان محدود می‌رسد. بنابراین در برداشت نخود باید رسیده بودن تمام غلاف‌ها را در نظر داشت. زمانی که  $90 - 85$  درصد غلاف‌ها به رنگ زرد در آمدند و برگ‌های پایینی شروع به خشکیدن نمودند، بایست آب مزرعه را قطع کرد تا رسیدن محصول یکنواخت‌تر گردد. هر چند نخود نسبت به ریزش دانه مقاوم است ولی تأخیر در برداشت، باعث می‌شود که بذور رسیده، رطوبت خود را از دست داده، چروکیده و دیر پر گردد.

برداشت، هم به وسیله‌ی کمباین و هم با دست (داس) صورت می‌گیرد. امروزه ارقامی از نخود معروفی شده‌اند که برآفراشته‌اند و محل اوئین انشعاب و فرم انشعابات شاخه‌ها از ساقه‌ی اصلی در آن‌ها طوری است که برای برداشت با ماشین کاملاً مناسب‌اند. در برداشت با داس، بوته‌ها را از نزدیک سطح خاک قطع می‌کنند و سپس دسته‌بندی می‌نمایند. سپس دسته‌ها را در محلی خرمن می‌کنند تا کاملاً خشک شوند. با خشک شدن شاخه و برگ‌ها که رطوبت دانه به حدود  $14 - 12$  درصد می‌رسد، خرمن را با خرمن کوب گندم (بعد از تغییرات جزئی در آن) می‌کوبند و دانه‌ها را از کاه و گلش جدا می‌نمایند و یا با وسایلی چون چوب دستی بر روی توده‌ی خرمن شده می‌کوبند تا دانه‌ها از غلاف خود خارج شوند. در این روش، در زمان مناسبی، از نظر شدت و جهت باد، خرمن را باد می‌دهند و با استفاده از غربال‌هایی که قطر روزنه‌ی آن‌ها کوچک‌تر از قطر دانه‌ی نخود است، نخودها را از ناخالصی‌ها جدا می‌کنند.

## فعالیت

عملیات برداشت مزرعه‌ی خود را پس از تأیید روش و زمان برداشت توسط

هنرآموزان خود، انجام دهید.

**عملکرد نخود:** عملکرد نخود در کشور ما در سال زراعی  $1368 - 69$  به صورت ديم، در حدود  $400$  و در زراعت فاریاب  $1412$  کیلوگرم در هکتار بوده است. البته می‌دانید که عملکرد نخود مانند هر محصول دیگر، بر حسب نوع رقم و شرایط اقلیمی و زراعی بسیار متفاوت است. در سطح جهان، عملکرد نخود از  $20$  کیلوگرم در هکتار (ایستگاهی در سودان) تا  $596$  کیلوگرم در هکتار (ایستگاهی در سوریه) گزارش شده است.

## جدول ۶-۴- سطح زیر کاشت، تولید و عملکرد نخود کشور بر حسب آبی دائم (صرفًا برای تحقیق)

| عملکرد<br>(کیلوگرم در هکتار) | تولید (تن) |           |           |          |          | سطح زیر کاشت (هکتار) |         |       | نمره<br>در<br>٪ |
|------------------------------|------------|-----------|-----------|----------|----------|----------------------|---------|-------|-----------------|
|                              | دیم        | آبی       | جمع       | دیم      | آبی      | جمع                  | دیم     | آبی   |                 |
| ۳۵۵/۹۸                       | ۹۶۴/۷۹     | ۲۴۲۳۷۸/۳۲ | ۲۲۲۴۴۸/۰۷ | ۱۹۹۲۹/۷۵ | ۶۴۵۵۵۲   | ۶۲۴۸۹۵               | ۲۰۶۵۷   | ۷۸-۷۹ |                 |
| ۳۴۰/۷۹                       | ۸۴۲/۲۷     | ۲۶۸۷۷۳/۴۲ | ۲۴۷۶۱۵/۶۵ | ۲۱۱۵۷/۷۷ | ۷۵۱۷۰۶   | ۷۲۶۵۸۶               | ۲۵۱۲۰   | ۷۹-۸۰ |                 |
| ۴۰۶/۰۴                       | ۸۸۲/۵۸     | ۳۰۱۸۷۶/۲۸ | ۲۷۸۲۹۲/۸۹ | ۲۳۵۸۳/۳۹ | ۷۱۲۰۹۸   | ۶۸۵۳۷۷               | ۲۶۷۲۱   | ۸۰-۸۱ |                 |
| ۴۲۲/۹۱                       | ۱۰۷۴/۴۴    | ۲۹۰۱۳۶/۱۹ | ۲۷۰۲۹۲/۴۱ | ۱۹۸۴۳/۷۸ | ۶۴۱۳۸۵   | ۶۲۲۹۱۶               | ۱۸۴۶۹   | ۸۱-۸۲ |                 |
| ۴۸۲/۴۹                       | ۱۱۷۶/۰۲    | ۲۸۶۹۱۹/۷۳ | ۲۶۹۱۴۶/۶۱ | ۱۷۷۷۳/۱۲ | ۵۷۲۹۴۰   | ۵۵۷۸۲۷               | ۱۵۱۱۳   | ۸۲-۸۳ |                 |
| ۴۷۵/۸۸                       | ۱۰۸۵/۹۸    | ۲۶۵۲۲۹/۰۸ | ۲۴۸۴۴۰/۳  | ۱۶۷۸۸/۷۸ | ۵۳۷۵۲۳/۱ | ۵۲۲۰۶۲/۵             | ۱۵۴۵۹/۶ | ۸۳-۸۴ |                 |

### تحقیق کنید

چرا سطح زیر کاشت نخود در سال زراعی ۸۳-۸۴ نسبت به سال ۸۱-۸۲

بیش از ۱۰ هزار هکتار کاهش یافته است؟

### فعالیت

عملکرد بنه‌ی خود را با عملکرد واحد آموزشی، منطقه، استان، کشور و میانگین

جهانی مقایسه کنید.

### تجزیه و تحلیل کنید

مقدار عملکرد بنه‌ی خود را تجزیه و تحلیل نمایید.

### تحقیق کنید


چه باید می‌کردیم تا عملکرد نخود بیشتر از آن می‌شد که هست؟

## خودآزمایی

- ۱- اهمیت حبوبات را از جنبه‌های مختلف توضیح دهید.
- ۲- حبوبات را هم از نظر لغوی و هم از نظر کشاورزی تعریف کنید و گیاهانی را که جزء حبوبات‌اند نام ببرید.
- ۳- چه ویژگی‌هایی سبب ارزش و اهمیت نخود در بین حبوبات، به خصوص در کشور ما و مناطق نیمه خشک، شده است؟
- ۴- کمبود آب یا خشکی در مرحله‌ی گل رفتن و رسیدن دانه، چه تأثیری بر کمیت و کیفیت محصول نخود دارد؟
- ۵- نخود را از نظر شکل دانه تقسیم بندی نمائید و خصوصیات هر یک را توضیح دهید.
- ۶- چرا نمی‌توانیم نخود را در بوشهر و نوشهر کشت نماییم؟
- ۷- راجع به چگونگی تعیین نیاز کودی نخود توضیح دهید.
- ۸- مناسب‌ترین عمق کاشت، فاصله‌ی ردیف‌ها، تراکم بوته، میزان مصرف بذر در هکتار در شرایط آب و هوایی و خاک زراعی محل تحصیل خود را، تحقیق کنید و آن را با وضعیت زراعت بومی مقایسه نمایید.
- ۹- از عملیات داشت نخود، روش‌های مختلف کنترل علف‌های هرز را بنویسید و درباره‌ی معایب و محسن‌های یک بحث کنید.
- ۱۰- نحوه‌ی تشخیص زمان رسیدن نخود و چگونگی برداشت آن را توضیح دهید.

## فصل دوم

### لوبیای معمولی *Phaseolus vulgaris*



هدف‌های رفتاری: انتظار می‌رود در پایان این فصل فراگیران بتوانند:

- ۱- تاریخچه و منشأ پیدایش لوبیای معمولی را در دو سطر توضیح دهند؛
- ۲- اهمیت اقتصادی، ارزش غذایی و موارد استفاده‌ی آن را بنویسند؛
- ۳- خصوصیات گیاه‌شناسی لوبیا را توضیح دهند؛
- ۴- شرایط مناسب رشد و نمو آن را شرح دهند؛
- ۵- ارقام مختلف لوبیا را نام ببرند و چگونگی آماده کردن رقم مطلوب را برای کاشت توضیح و انجام دهند؛
- ۶- عملیات آماده سازی زمین را توضیح و انجام دهند؛
- ۷- هریک از عملیات کاشت، داشت و برداشت را توضیح و انجام دهند؛
- ۸- موقعیت این محصول را از نظر سطح زیر کاشت و عملکرد بیان کنند.

## مبدأ و تاریخچه‌ی لوپیای معمولی

مبدأ اولیه‌ی لوپیای معمولی احتمالاً در مکزیک و گواتمالاست. واویلوف با توجه به شواهد و قرائن، آمریکای مرکزی و جنوب مکزیک را مبدأ لوپیا می‌داند. لوپیا ۷-۴ هزار سال قبل از میلاد در مکزیک کشت شده است و به تدریج به مناطق دیگر این قاره راه یافته است. در قرن ۱۶، توسط کاشفان آمریکا، این گیاه به اروپا آورده می‌شود. پس از کارهای اصلاحی بر روی آن، به سایر مناطق توسعه می‌یابد. این گیاه به سبب داشتن ارزش و اهمیت غذایی و زراعی طولی نکشید که در اغلب کشورها در چرخه‌ی زراعی جایگاه مطلوبی یافت.

## ارزش و اهمیت غذایی لوپیا

لوپیا یکی از منابع مهم پروتئینی و تولید انرژی برای انسان است. انواع لوپیا ۲۵ درصد پروتئین دارد و می‌تواند جای‌گزین مناسبی برای پروتئین حیوانی باشد. علاوه‌بر این همان‌گونه که جدول ۴-۲ نشان می‌دهد، از نظر انرژی، مواد معدنی و برخی از ویتامین‌ها غنی است.

## مناطق کاشت لوپیا در ایران و جهان

بزرگ‌ترین کشورهای تولیدکننده‌ی لوپیا آمریکا، بربازیل، مکزیک و چین است. در ایران، سطح زیر کشت لوپیا در سال ۱۳۷۹ حدود ۱۰۵۲۶۴ هکتار و تولید آن ۱۸۲۷۴۲ تن بوده است. استان‌های لرستان، مرکزی، چهارمحال و بختیاری، فارس، زنجان، اصفهان و آذربایجان شرقی مهم‌ترین مناطق کشت این محصول‌اند.

## مشخصات گیاه‌شناختی لوپیا (مورفولوژی)

ریشه: ریشه‌ی لوپیا از نوع راست، با عمق رشد تا یک متر است. این ریشه خاصیت همزیستی با باکتری تثبیت‌کننده‌ی ازت از نوع Rhizobium Phaseoli را دارد و مقدار آن بر حسب نوع لوپیا بسیار متفاوت است.

ساقه: لوپیا دارای یک ساقه‌ی اصلی و معمولاً سه تا شش ساقه‌ی فرعی است. تشخیص ساقه‌های فرعی مهم است چرا که ساقه‌ی اصلی از طریق ضخامت بیشتر و ارتباط مستقیم با سیستم ریشه قابل تشخیص است. جوانه‌زنی لوپیا به صورت ابی‌ژیل<sup>۱</sup> است.

۱- روی زمینی

بر روی ساقه‌ی لوبيا اولين گره مربوط به قرارگرفتن لپه‌هاست و گرهی کاذب محسوب می‌شود. اولین گرهی حقیقی محل قرارگرفتن برگ‌های اولیه است. تعداد گره در انواع لوبيا بسته به تیپ بوته و رقم متغیر است. معمولاً بخش پایین ساقه‌ی همه‌ی ارقام لوبيا تا محل گرهی دوم ایستاده است، اما با توجه به تیپ بوته از محل گرهی دوم ساقه‌ی می‌تواند پیچ بخورد. پیچش ساقه مضاعف است، به طوری که می‌تواند به دور خود و به دور رقم بیچد. ساقه‌های فرعی لوبيا از محل زاویه‌ی بین برگ و ساقه‌ی اصلی تشکیل می‌شود.

برگ: در لوبيا سه نوع برگ وجود دارد که عبارت‌اند از برگ‌های لپه‌ای، اولیه و اصلی (سه برگ‌چه‌ای). برگ‌های لپه‌ای، ساده، واژه قلبی تا کلیوی هستند. در حالی که برگ‌های اولیه ساده و قلبی شکل‌اند، با دم برگ و گوشوارک و فقط در هر بوته به تعداد دو عدد از آن‌ها وجود دارد. برگ‌های اصلی لوبيا به صورت مرگب سه برگ‌چه‌ای است و از محل گره‌ها ظاهر می‌شوند. از نظر آرایش برگ (Phyllotaxy)، سه برگ‌چه‌ای برخلاف دو نوع برگ دیگر متناوبند. توالی سه برگ‌چه‌ای‌ها به صورت دور دیفی است و این وضعیت به جذب پیش‌تر نور کمک می‌کند.

گل: گل آذین لوبيا به صورت خوش است و با توجه به تیپ بوته، محل قرارگرفتن گل متفاوت است. در هر خوشی یک یا چند گل تشکیل می‌شود. کاسه‌ی گلی شامل پنج کاسبرگ سبز است که در قاعده به هم چسبیده‌اند و تشکیل یک لوله را می‌دهند. جام گل که بر حسب رقم به رنگ‌های سفید، آبی، بنفش، قرمز، صورتی و ارغوانی دیده می‌شود، از پنج قسمت تشکیل شده است، شامل یک گلبرگ بزرگ خارجی به نام درفش (Standard) دو گلبرگ جانبی به نام بال (Wing) و دو گلبرگ کوچک‌تر به نام ناو (keel) که به هم پیوسته‌اند. نافه شامل ده پرچم است که نه پرچم آن به هم پیوسته و یک پرچم آن آزاد است، مادگی یک برچه‌ای دارای چند تحكم است و گرده‌افشانی در آن مستقیم و درصد دگرگشتنی آن بسیار کم و اغلب کمتر از دو درصد است.

میوه: میوه‌ی لوبيا همانند تمام حبوبات از نوع نیام یا لگوم است؛ یعنی میوه‌ی خشکی که با دو شکاف طولی باز می‌شود.

دانه: دانه‌ی لوبيا از نظر اندازه، شکل و رنگ بسیار متنوع است و این خود یکی از فاکتورهای مهم برای گروه‌بندی ارقام لوبياست. مهم‌ترین صفات دانه که در طبقه‌بندی ارقام لوبيا استفاده می‌شود شامل وزن صددانه، رنگ دانه و شکل دانه است.

براساس وزن صد دانه، ارقام لوبيا به ۳ گروه زير تقسيم می شوند :

۱- دانه ريز : وزن ۱۰۰ دانه کمتر از ۲۵ گرم

۲- دانه متوسط : وزن ۱۰۰ دانه کمتر از ۲۵ تا ۴۰ گرم

۳- دانه درشت : وزن ۱۰۰ دانه بيشتر از ۴۰ گرم

شكل دانه علاوه بر اين كه يك صفت مهم در طبقه بندی است، عامل مهمی در بازار پسندی بذر

لوبيا نيز محسوب می شود.

براساس تقسيم بندی بين المللی، دانه های لوبيا از نظر شکل به پنج گروه تقسيم می شوند :

۱- گرد ۲- بيضي ۳- مکعبی ۴- قلوه ای ۵- سهی

رنگ دانه براساس تقسيم بندی CIAT شامل نه گروه رنگ است که در بين آنها رنگ های

سفید، قرمز، صورتی، چيتی و کرم در ايران رايح است.

## فعالیت

انواع لوبياهایی که در منطقه‌ی شما کاشته می شود را از جنبه‌ی گیاه‌شناختی

بررسی نموده و نمونه‌هایی از آنها در کلکسیون واحد آموزش نگهداری نمائید.

## تیپ بوته در لوبيا

يکی از مهم‌ترین صفات گروه‌بندی لوبيا تیپ بوته است. براساس محل قرارگرفتن گل و استحکام ساقه، چهار تیپ بوته در لوبيا قابل تشخیص است.

تیپ ۱: ساقه‌ی رشد محدود و ايستاده است. در اين تیپ، با تشکيل اولين گل در انتهای ساقه، رشد ساقه متوقف می شود. بوته‌ها، در اين تیپ، حالت ايستاده دارند؛ مانند لاین لوبيا چیتي (COS 16) لاین لوبيا قرمز (DA ۸۳) ارقام لوبيا درخشان و اختر.

تیپ ۲: رشد ساقه نامحدود و ايستاده است. در اين حالت ساقه به طور نامحدود رشد می کند و بر روی هر گره گل تشکيل می شود. ساقه به دليل استحکام لازم حالت ايستا دارد، مانند رقم صيادولain (AND ۷۰۰).

تیپ ۳: رشد ساقه نامحدود و رونده است. در اين حالت ساقه استحکام لازم را ندارد و روی زمين قرار می گيرد. اغلب لوبياهای بومی ايران و ارقام لوبيا چیتي تلاش، لوبيا قرمز، ناز و گلی و لوبيا سفید دهقان و دانشکده از اين نوع لوبياست.

**تیپ ۴:** رشد ساقه نامحدود و بالارونده است. در این حالت رشد ساقه بسیار زیاد و تعداد شاخه‌های فرعی کم است. این ویژگی مختص لوپیاهای وحشی است که در طبیعت جهت جذب نور، با سایر گیاهان رقابت بسیار شدیدی دارند.

### تحقیق کنید

در منطقه‌ی شما چه تیپ‌هایی از لوپیا بیشتر کاشته می‌شود؟ دلایل آن را پیدا کنید.

### خصوصیات اکولوژیکی لوپیا

لوپیا گیاهی گرمادوست است، به‌طوری که در روزهای گرم و شب‌های خنک بیشتر رشد می‌کند. دمای مورد نیاز برای رشد آن در روز  $20^{\circ}$  تا  $28^{\circ}$  درجه و در شب  $15^{\circ}$  تا  $20^{\circ}$  درجه‌ی سانتی‌گراد است. دمای بیش از سی درجه مناسب رشد لوپیا نیست و دمای بیش از  $25^{\circ}$  درجه‌ی سانتی‌گراد منجر به اختلال در گردهافشانی و عدم تشکیل دانه در آن می‌شود. هم‌چنین دمای کم‌تر از  $15^{\circ}$  درجه‌ی سانتی‌گراد برای رشد آن نامناسب است.

ارقام مختلف لوپیا نسبت به طول روز واکنش متفاوت نشان می‌دهند. به‌نظر می‌رسد ارقام ایستاده و زودرس لوپیا نسبت به طول روز خشی هستند ولی ارقام رونده و دیررس روزگوتاه‌اند. در ارقام مختلف لوپیا، معمولاً  $30^{\circ}$  تا  $40^{\circ}$  روز بعد از کاشت، گل‌دهی آغاز می‌شود. شرایط خشکی در مرحله‌ی شروع گل‌دهی بیشترین خسارت را به لوپیا وارد می‌کند. دوره‌ی گل‌دهی لوپیا معمولاً یک ماه است. در ارقام رشد محدود، زمان رسیدن غلاف‌های یک بوته متفاوت است. تأثیر تنفس‌های محیطی بر روی لوپیا بستگی به نوع رقم دارد.

### تحقیق کنید

علت توسعه یا عدم توسعه‌ی کاشت لوپیا در منطقه‌ی شما چیست؟

### تناوب زراعی

بهترین تناوب برای لوپیا، قرارگرفتن بعد از غلات ریزدانه مثل گندم و جو است. زیرا سیستم ریشه و نوع توقعات و اغلب آفات امراض و علف‌های هرز آن‌ها کاملاً متفاوت است.

## بررسی کنید

تناوب‌های رایج در زراعت لوبيا در منطقه‌ی شما چیست؟ علت رواج را بررسی

کنید.

## آماده‌سازی زمین

خاکی که برای کشت لوبيا در نظر گرفته می‌شود باید عمیق و در قسمت سطحی نرم و حاصل خیز باشد. بهترین خاک‌ها برای کشت لوبيا خاک‌های لومی تا لوم رسی است. لوبيا به سله بسیار حساس است و سله مانع از خروج جوانه‌های آن از زمین می‌شود. لذا کشت این گیاه در خاک‌های سنگین مطلوب نیست. pH مناسب برای کشت آن شش تا هفت و تا حدود هشت توانایی رشد مطلوب دارد. لوبيا به شوری خاک حساس است و E.C آستانه برای این گیاه حدود ۱ میلی موس بر سانتی‌متر است و اگر این مقدار به  $1/5$ ،  $2/6$  و  $3/6$  برسد به ترتیب  $1^{\circ}$ ،  $2^{\circ}$  و  $5^{\circ}$  درصد افت عملکرد در لوبيا اتفاق می‌افتد. تهیه‌ی زمین شامل مراحل مختلفی است که با درنظر گرفتن روش زراعت (mekanizه و سنتی)، بافت خاک و نوع تناوب ممکن است تفاوت‌هایی داشته باشد. در زراعت لوبيا شخم پاییزه به شخم بهاره ترجیح داده می‌شود.

پس از این شخم تا بهار سال بعد زمین را به حال خود رها می‌کنند و در بهار و بعد از گاورو شدن زمین خاک را با دیسک خرد می‌نمایند و علف‌های هرز احتمالی را از بین می‌برند و بلا فاصله قبل از بذر کاری، زمانی که خاک دارای رطوبت متوسطی است، زمین را نرم می‌کنند. در شخم پاییزه باید عمق شخم حدود  $3^{\circ}$  سانتی‌متر باشد تا ریشه‌های گیاه بتوانند به راحتی در داخل خاک نفوذ کند و از آب و مواد غذایی عمق خاک نیز استفاده نمایند.

## فعالیت

حداقل  $1000$  متر زمین را برای کاشت لوبيا آماده نمایید.

## کاشت لوبيا

تاریخ کشت لوبيا بسته به نقاط مختلف از نظر آب و هوایی متفاوت است و به طور کلی بستگی به مقدار درجه‌ی حرارت خاک دارد. چون حداقل دمای لازم برای جوانه‌زن گیاه در خاک  $12$  تا  $14$  درجه‌ی سانتی‌گراد است، لذا کشت را موقعی انجام می‌دهند که خطر سرمای اوایل بهار برطرف

شده و حداقل دمای روزانه  $12^{\circ}\text{C}$  باشد.

در نقاط مختلف ممکن است کشت لوبيا از اواخر فروردین ماه تا اواخر اردیبهشت انجام گیرد. ولی کشت دیرتر سبب ریزش گل‌ها خواهد شد. البته چون لوبيا در دوره‌ی رشد خود به مقدار معینی دما نیاز دارد در مناطقی که تابستان کوتاهی دارند باید بلافاصله موقعی که متوسط دما به ده درجه رسید اقدام به کشت محصول شود و به این نکته توجه کنیم که هرچه لوبيا را زودتر بکاریم احتیاج کمتری به آب خواهد داشت؛ ولی اگر تابستان منطقه‌ی گرم و طولانی باشد بهتر است وقتی حداقل دمای روزانه به  $12-14$  درجه‌ی سانتی‌گراد رسید کشت را آغاز کنند.

به طور کلی وقت کاشت لوبيا باید طوری انتخاب شود که مرحله‌ی حساس رشد لوبيا، به ویژه گل‌دهی، با گرما و خشکی تابستان مواجه نشود و هم‌چنین رسیدن محصول به سرماهی پاییزه برخورد نکند. براساس تحقیقات انجام شده در ایستگاه ملی تحقیقات خمین،  $15$  اردیبهشت تا  $5$  خرداد بهترین تاریخ کاشت لوبيا در این منطقه است.

یکی از مشکلاتی که برای تاریخ کاشت در برخی استان‌ها وجود دارد کاشت دیرهنگام لوبيا به دلیل آبیاری گندم است؛ به عبارت دیگر، به دلیل محدودیت آب آبیاری، کاشت لوبيا تا تکمیل آب گندم امکان‌پذیر نیست. لذا کاشت دیرهنگام این محصول موجب کاهش عملکرد آن می‌شود. اغلب توده‌های محلی لوبيا سفید است و لوبيا قرمز نسبت به لوبيا چیتی زودرس‌تر است. در کشت دیرهنگام، استفاده از توده‌های سفید و قرمز ترجیح داده می‌شود.

### تحقیق کنید

لوبيا در منطقه‌ی شما چه زمانی و به چه روشی کاشته می‌شود؟

### روش‌های کاشت لوبيا

در ایران چهار روش برای کاشت لوبيا مرسوم است:

**۱- خشکه‌کاری دست‌پاش:** این روش بدترین روش کشت لوبيا محسوب می‌شود و در مناطقی مانند شهرهای سراب و اهر در آذربایجان شرقی و برخی مزارع استان لرستان دیده می‌شود. بذور با دست یا ماشین بذرپاش پاشیده می‌شود و پس از مخلوط کردن آن‌ها با خاک به وسیله‌ی شن کش، دیسک یا کولتیواتور، اقدام به کرت‌بندی یا ایجاد فارو و آبیاری می‌نمایند. غیریکنواختی، عمق کاشت و فواصل بوته‌ها و نیز درصد پایین جوانه‌زنی از معایب این روش است. البته با مصرف زیاد بذر، بخشی

از این عیب برطرف می‌شود و با انجام عملیات واکاری و تنک سعی به ایجاد تراکم مطلوب می‌شود.

۲- روش کپه‌کاری در جوی و پسته: ابتدا زمین را به صورت جوی و پسته درمی‌آورند.

سپس بالاتر از خط داغ آب اقدام به کاشت لوبيا به مقدار ۲-۳ دانه در هر گرده می‌نمایند. فواصل گرده‌ها از هم ۱۵-۲۰ سانتی‌متر و فواصل جوی یا عرض پسته‌ها ۷-۵ سانتی‌متر است. از آن جا که جوی‌ها را ابتدا آبیاری می‌کنند لوبيا را در نم می‌کارند، این روش هیرم کاری محسوب می‌گردد. و به لحاظ این که چند دانه در هر گوده کاشته می‌شود، هر چند مقدار مصرف بذر نسبت به کاشت ردیفی مکانیزه بیشتر است، اما درصد رویش و استقرار بوته‌ها به خصوص در خاک‌های سنگین، بسیار مطلوب است.

۳- کاشت ردیفی و مکانیزه‌ی لوبيا: در این روش با عنایت به حساسیت لوبيا در فرایند جوانه‌زنی به سله، عملیات آماده‌سازی بهاره، پس از تأمین رطوبت خاک و به محض گاورشدن انجام می‌شود. سپس بذور را با ردیفکار که فاصله‌ی کارنده آن‌ها ۶-۷ سانتی‌متر تنظیم شده به نحوی می‌کارند که فاصله‌ی بوته‌ها روی ردیف‌ها حدود ۲۵-۳۵ سانتی‌متر گردد. تراکم مطلوب در لوبيا بر حسب رقم و نوع لوبيا ۷-۴ هزار بوته در هکتار است. عمق کاشت در لوبيا ۷/۵-۲/۵ سانتی‌متر است و بر حسب عوامل مختلف مؤثر بر عمق کاشت متفاوت است.

مقدار مصرف بذر: با توجه به تراکم بوته در هکتار و نیز وزن هزار دانه‌ی لوبيا که بین ۲۰۰-۶۰۰ گرم است، مقدار مصرف بذر در هکتار چنان‌چه روش بذرکاری با ماشین‌های دقیق صورت گیرد معمولاً کمتر از ۵ کیلوگرم است. اما در روش‌های دیگر مقدار بذر در هکتار به ۸۰ کیلوگرم و حتی بیشتر می‌رسد. در روش دست‌پاش انواع لوبياچیتی محلی ۲۰۰-۱۸۰ کیلوگرم، لوبيا سفید ۱۳۰-۱۲۰ کیلوگرم و لوبيا قرمز ۱۵۰-۱۳۰ کیلوگرم بذر مصرف می‌کنند.

### فعالیت

مزرعه آماده‌سازی شده خود را لوبياکاری کنید.

### ارقام مهم لوبيا

همه‌ی لوبياهای خشک (چیتی، قرمز، سفید، کرم)، به طورکلی به نام لوبيا معمولی نامیده می‌شوند و از جنس Phaselous vulgaris و گونه‌ی vulgari هستند. بیشترین سطح زیر کاشت در ایران از

نوع لوبيا چيتي است. در حال حاضر حدود ۸٪ سطح زير کشت لوبيا به صورت توده‌های محلی است و استفاده از ارقام اصلاح شده در حال گسترش است. يکی از فاكتورهای مهم در سطح کشت لوبيا قيمت آن در بازار است. برخی از ارقام اصلاح شده و اميدبخش لوبيا به شرح جدول ۴-۷ است.

### فعاليت

ارقام مهم لوبيای مورد کاشت منطقه را جمع آوري و بررسی کنيد.

جدول ۴-۷- ارقام و لайн‌های اميدبخش لوبياهای معمولی در ايران

| نوع لوبيا | رقم                            | لайн‌های اميدبخش                         |
|-----------|--------------------------------|--|
| قرمز      | گلی، ناز، درخشان، اختر، صیاد   | D۸۱۰۸۳                                   |
| سفید      | دانشکده، دهقان، مرمر، یاس، صدف | Cifem cave, jules<br>۷۴ -Emerson, E۱۱۸۶۷ |
| چيتي      | محلي خمين، تلاش، شاد           | Cos۱۶, G۱۴۰۸۸, Go۱۴۳۷                    |

### آبیاري

مقدار آب مورد نياز لوبيا بستگی به بافت و ساختمان خاک، نوع رقم، شرایط آب و هوائي و ... دارد. در خاک‌های با بافت متوسط، به دليل نفوذپذيری بيش تر خاک و تبخیر بيش تر آب از سطح خاک، مصرف آب بيش تر است از زمیني که خاک‌های آن سنگين باشد. در روش هيرم کاري فاصله‌ی اولين و دومين آبیاري بعد از کاشت به فاصله‌ی ۲۰-۳۰ روز است. در اين مدت بذور لوبيا جوانه می‌زنند و به مرحله‌ی دوبرگی می‌رسد. آبیاري دوم به فاصله‌ی ۱۲-۸ روز و آبیاري‌های بعدی بسته به نوع بافت و ساختمان خاک به طور متوسط هر ۴-۸ روز يک بار انجام می‌شود. خاک‌هایي با بافت سبک تر ۴-۳ روز و خاک‌هایي با بافت سنگين تر ۵ الى ۸ روز انجام می‌شود. به طور کلي موقع احتياج گيه به آبیاري را از علائم روی گيه نيز می‌توان تشخيص داد. به طوری که در صورت تشنجی، بوته‌ها تغيير رنگ می‌دهند و شاخ و برگ آن‌ها به صورت سبز تيره درمی‌آيند، اما بالفاصله بعد از آبیاري، بوته‌ها شداداب می‌شوند و رنگ سبز روشن خود را باز می‌يانند.

مرحله‌ی بحراني آبیاري در لوبيا، که بسيار مهم و تأثيرگذار در ميزان محصول برداشتی است، مرحله‌ی شروع گل دهی تا مرحله‌ی تشکيل غلاف است. كمبود آب در اين مرحله سبب ريزش گل‌ها،

کوچک‌ماندن غلاف‌ها و کاهش محصول دانه می‌شود. گیاه لوبيا در طول دوره‌ی رشد خود به ۸–۱۲ بار آبیاری نیاز دارد؛ یعنی در حدود ۶۰۰ میلی‌متر آب بایستی به گیاه برسد. در نواحی خنک‌تر مصرف ۲۵۰ تا ۳۰۰ میلی‌متر آب کفايت می‌کند.

آخرین آبیاری باید طوری انتخاب شود که غلاف‌های در حال رسیدن، از رطوبت کافی برای تولید دانه‌ی بزرگ برخوردار شوند و وقتی  $\frac{1}{4} \times 25\%$  غلاف‌ها رسیده باشند می‌توان آبیاری را قطع کرد.

بهترین نوع سیستم آبیاری، آبیاری نشستی است، چرا که در این سیستم خاک کم‌تر سله می‌بندد.

## واکاری و تنک

چنان‌چه روش کاشت درهم و خشکه‌کاری باشد، واکاری و تنک از عملیات ضروری و گاهی به تعداد دو تا سه مرتبه است. وقتی به خصوصیات مطلوب بذر توجه نشده باشد، این ضرورت بیشتر و این عملیات الزامی‌تر می‌گردد.

در روش کاشت مکانیزه با کارنده‌های دقیق و بذور گواهی شده تقریباً این عملیات جایی در داشت لوبيا ندارد. به ویژه اگر به شرایط رطوبتی خاک هنگام کاشت دقت شده باشد.

## سله‌شکنی و خاک‌دهی پای بوته

در تمام روش‌های کاشت، این عملیات ضروری است. اما روش اجرا به حسب روش کاشت متفاوت است. در کاشت ردیفی با اجرای کولتیواتور داشت عملیات انجام می‌شود. درحالی‌که در روش دست‌پاشی (درهم) یا کپه‌کاری باشفره یا بیل انجام می‌گردد. تعداد عملیات سله‌شکنی در لوبيا به‌طور معمول دو مرتبه و عموماً تا قبل از گل‌دهی گیاه است.

## قیم زدن

این عملیات مربوط به تیپ‌های ۳ و ۴ لوبياست، که ساقه حالت ایستاده یا افراشته ندارد و با نداشتن قیم روی سطح زمین می‌افتد و ضمن مشکل کردن عملیات برداشت، کمیت و کیفیت محصول را به شدت کاهش می‌دهد. برای این عملیات، به فاصله‌ی  $1/5 - 2$  متر یک تکه چوب  $70 - 80$  سانتی‌متری را ضمن فروکردن در خاک، بین آن‌ها را نخ‌کشی می‌کنند تا تکیه‌گاهی برای بوته فراهم نمایند.

به لحاظ سنگینی عملیات و افزوده شدن هزینه های تولید، گرایش عمومی به سمت اصلاح و معرفی و کاشت ارقام از نوع تیپ ۱، ۲ است.

## کود سرک

هرچند طول دوره‌ی رشد لوبيا خيلي طولاني نیست و در صورت حاصل خيزبودن خاک و تأمین کود پایه مناسب با آزمایش خاک، کود سرک در اين گاه ممکن است لازم نباشد، اما جهت حصول عملکرد مناسب، باید به محض مشاهده‌ی رفتار نامطلوب یا بروز علایم کمبود، مصرف کود سرک از نوع و مقداری که کارشناس توصیه می‌کند ضروری است.

کنترل علف‌های هرز: کنترل علف‌های هرز در زراعت لوبيا، شاید مهم‌ترین عملیات داشت در این محصول پس از تأمین رطوبت باشد. در ارقام پیچیده و خوابیده، کنترل علف‌های هرز بسیار مهم‌تر است، زیرا با کوچک‌ترین تأخیر، بوته به علف‌های هرز می‌پیچد و عملکرد از بین رفته تلقی می‌شود. لذا مصرف علف کش قبل از کاشت، اجرای اصول به زراعی و در صورت نیاز تلفیق کنترل‌های شیمیایی در طی داشت با سایر عملیات داشت می‌تواند جمعیت علف‌های هرز را به زیر سطح اقتصادی برساند.

## تنک میوه

هرچند ارقامی از لوبيا که به نام لوبيا سبز می‌شناسیم صرفاً به منظور برداشت غلاف‌های سبز یا نارس کاشته می‌شوند، اما در واحدهای زراعی کوچک و نظام بهره‌برداری خانوادگی، می‌توان جهت ایجاد تعادل بین بوته و غلاف‌های آن، رسیدگی یکنواخت غلاف‌ها، تأمین بخشی از مایحتاج خود و اهداف خاص در طی مراحل پرشدن دانه، با مراجعه به مزرعه و سرکشی مرتب، برخی از غلاف‌ها را برداشت کرد.

## کنترل آفات و بیماری‌های لوبيا

از مهم‌ترین آفات لوبيا: کنه‌ی دونقطه‌ای، تریپس، شته، زنجرک، کرم طوقه بُر، کرم پیله‌خوار و مگس لوبياست.

بیماری‌ها: بوسیدگی فوزاریونی ریشه‌ی<sup>۱</sup> لوبيا، بیماری زردی فوزاریونی<sup>۲</sup>، بوسیدگی ریزوکتونیایی ریشه‌ی لوبيا<sup>۳</sup> و برخی بیماری‌های باکتریائی و به خصوص ویروسی دیده می‌شود. اقدامات زراعی، روش‌های کنترل و مبارزه‌ی تلفیقی با آفات و بیماری‌ها را در دروس حفظ نباتات فرا گیرند.

### تحقیق کنید

مهم‌ترین آفات، بیماری‌ها، علف‌های هرز، کمبود عناصر غذایی و عوارض اقلیمی در مزارع لوبياکاری منطقه‌ی شما چیست؟ نمونه‌ها را در کلکسیون نگهداری کنید.

### فعالیت

عملیات داشت مزرعه خود را به درستی و به موقع انجام دهید.

### برداشت

زمان برداشت لوبيا به زمان کاشت و نوع رقم بستگی دارد. در ارقام رونده، مانند لوبيای محلی خمین، غلاف‌ها هم‌زمان نمی‌رسند و برداشت زمانی انجام می‌شود که حدود ۶۵ تا ۷۵ درصد غلاف‌ها رسیده باشند. در این زمان میانگین رطوبت دانه‌ها، حدود ۳۵ تا ۴۰ درصد است. هنگام برداشت، محصول با دست برداشت می‌شود و در مزرعه باقی می‌ماند. زمانی که رطوبت دانه‌ها به حدود ۲۰ درصد رسیده و غلاف‌ها خشک شده باشند، به خرمن‌گاه منتقل و خرمن‌کوبی می‌شوند. در ارقام ایستاده غلاف‌ها زودتر و نسبتاً همزمان می‌رسند. ارقامی که به ریزش حساس‌اند، دارای شرایط مناسب نیستند. زیرا به محض خشک شدن، غلاف‌ها باز می‌شوند و بذور ریزش می‌کنند. در این حالت به ناچار محصول باید زودتر ازموعد برداشت شود و به خرمن‌گاه منتقل گردد، در نتیجه عملکرد آن پایین می‌آید.

### فعالیت

عملیات برداشت مزرعه‌ی خود را انجام دهید.

## بررسی کنید

عملکرد بنه‌ی شما با عملکرد واحد آموزشی، منطقه، استان و کشور چه تفاوتی دارد؟ علت یابی کنید.

ارقام دیررس نیز مناسب نیستند. زیرا اگر مرحله‌ی پرشدن غلاف‌ها با سرمای پاییز مصادف شود، تأخیر زیادی در رسیدن فیزیولوژیکی ایجاد می‌شود و کار برداشت با مشکل مواجه می‌شود و از سوی دیگر باران‌های پاییزی خسارت زیادی به کیفیت دانه و کاه لویبا وارد می‌کنند. موضوع مهم دیگر در برداشت لویبا ارزش کاه آن است. در کشور ما ارزش غذایی کاه برای مصارف دام بالاست، درنتیجه ارزش اقتصادی آن نیز قابل ملاحظه است. ارقامی که خاصیت پایداری برگ‌های آن زیاد باشد و ساقه‌های آن ترد باشند ارزش کاه بیشتری دارند؛ به عنوان مثال، لویباچیتی محلی خمین دارای ساقه‌های ترد است و برگ‌ها نیز بر روی بوته‌های خشک باقی می‌مانند، اما برگ‌های لویبا سفید دانشکده قبل از رسیدن غلاف‌هاریزش می‌کنند و کاه مناسبی به دست نمی‌آید.

میزان عملکرد در لویاهای خشک، بسته به نوع رقم از ۲۵۰۰ تا ۳۵۰۰ کیلو در هکتار متفاوت است، ولی متوسط برداشت در لویبا در ارقام اصلاح شده سه تن در هکتار است. در زراعت‌های بزرگ و مکانیزه برداشت با کماین می‌تواند صورت بگیرد.

**جدول ۴—۸— سطح زیرکاشت، تولید و عملکرد لویبا در کشور بر حسب آبی و دیم  
( فقط برای بحث و بررسی)**

| ردیف                         | سطح زیر کاشت (هکتار) |      |          |            |           |            |            |          |          |
|------------------------------|----------------------|------|----------|------------|-----------|------------|------------|----------|----------|
|                              | تولید (تن)           |      |          | تولید (تن) |           |            | تولید (تن) |          |          |
| عملکرد<br>(کیلوگرم در هکتار) | آبی                  | دیم  | آبی      | دیم        | آبی       | آبی        | آبی        | دیم      | آبی      |
| ۷۸_۷۹                        | ۱۰۶۰_۹/۹             | ۳۰۵۹ | ۱۰۵۶۸/۹  | ۱۰۹۵۶۸/۹   | ۱۷۴۴۴۳/۶۳ | ۶۴۷۹/۲۴    | ۱۸۰_۹۲۲/۸۷ | ۱۶۳۷/۸۲  | ۲۱۱۸_۰_۹ |
| ۷۹_۸۰                        | ۸۷۹۹۳/۴              | ۲۵۲۸ | ۹۱۵۲۱/۴  | ۱۴۰۰_۶۲/۴  | ۳۹۱۷/۵    | ۱۴۳۹۷۹/۹   | ۱۵۹۱/۷۴    | ۱۱۱۰_۰_۴ | ۱۱۱۰_۰_۴ |
| ۸۰_۸۱                        | ۱۰۶۲۱_۰              | ۵۰۷۶ | ۱۱۱۲۸۶   | ۲۰۴۳۹۵/۸۵  | ۵۲۲۴/۷۶   | ۲۰۹۶۲۰/۶۱  | ۱۹۲۴/۴۵    | ۱۰۲۹_۳_۱ | ۱۰۲۹_۳_۱ |
| ۸۱_۸۲                        | ۱۱۲۴۷۱               | ۲۲۶۳ | ۱۱۵۸۲۴   | ۲۱۵۱۴۳/۸۱  | ۳۷۱۲/۷۹   | ۲۱۸۸۵۷/۶   | ۱۹۱۲/۸۸    | ۱۱۰۴_۳_۱ | ۱۱۰۴_۳_۱ |
| ۸۲_۸۳                        | ۱۰۴۵۶۸               | ۵۶۸۱ | ۱۱۰۲۴۹   | ۲۱۷۴۹۹/۹۳  | ۸۲۲۰/۱۲   | ۲۲۵۷۲۰_۰_۵ | ۲۰۷۹/۹۹    | ۱۴۴۶/۹۵  | ۱۴۴۶/۹۵  |
| ۸۳_۸۴                        | ۱۰۶۰_۵۹/۳            | ۵۲۵۱ | ۱۱۱۳۱۰/۳ | ۲۰۹۶۸۲/۹۵  | ۶۴۴۸/۲۱   | ۲۱۶۱۳۱/۱۶  | ۱۹۷۷/۰_۴   | ۱۲۲۸     | ۱۲۲۸     |

## انبارکردن لوبيا

نگهداری لوبيای خشک در محلهای که دارای تهویه‌ی کافی باشند امکان‌پذیر است و در انبار از سایر دانه‌ها بهتر می‌ماند. بذوری که برای کاشت مصرف می‌شوند می‌توانند به مدت سه سال در انبارهای خشک و خنک با درجه‌ی حرارت سه تا چهار درجه‌ی سانتی‌گراد نگهداری شوند، زیرا به علت کلفتی پوسته‌ی بذر، کم‌تر مورد حمله‌ی آفات انباری واقع می‌شوند و مصون می‌مانند.

### تحقيق کنید

چرا عملکرد دیم لوبيا در سال زراعي ۷۸-۷۹ بيش از ۲ برابر سال زراعي ۸۰-۸۱ است؟

### خودآزمایی

- ۱- مبدأ اوليه‌ی لوبيای معمولی بر حسب نظر واویلوف کجا می‌باشد؟  
الف - غرب آسیا و جنوب هند      ب - شمال آفریقا و شرق مصر  
ج - آمریکای شمالی و کانادا      د - آمریکای مرکزی و جنوب مکزیک
- ۲- بر روی ساقه هوايی لوبيا، اولين گره مربوط به چيست?  
الف - برگ‌های اوليه      ب - لپه‌ها      ج - برگ‌های اصلی      د - یقه طوفه
- ۳- نوع میوه در لوبيا کدام است?  
الف - سته      ب - شفت      ج - گندم      د - نیام
- ۴- لوبيا نسبت به طول روز، گیاهی ..... می‌باشد.
- ۵- ايستگاه تحقيقات لوبيا در کدام شهر استان مرکزی می‌باشد?
- ۶- بهترین روش کاشت لوبيای معمولی کدام است?
- ۷- چرا مصرف کود سرك، بخصوص از نوع ازته در زراعت لوبيا معمول نمی‌باشد?