

پیمانهٔ مهارتی: تعیین منطقه کاشت چغندر قند

شمارهٔ شناسایی: ۱۴-۱-۷۴/ک

مهارت: کشت چغندر قند

شمارهٔ شناسایی: ۱۴-۱-۷۴/ک

تعیین منطقه کاشت چغندر قند

هدف کلی

آشنایی با چغندر قند و تعیین منطقه کاشت این محصول

هدفهای رفتاری: فراگیر، پس از گذراندن این پیمانه مهارتی، باید بتواند:

- ۱- ارزش و اهمیت و تاریخچه چغندر قند را بیان نماید.
- ۲- انواع چغندر قند و خصوصیات آن را نام ببرد.
- ۳- خصوصیات اکولوژیکی چغندر قند را بیان نماید.
- ۴- محل چغندر قند را در گردش زراعی تعیین کند.
- ۵- انواع بنور چغندر قند را نام ببرد.
- ۶- نوع مناسب بذر چغندر قند را برای منطقه مورد نظر انتخاب کند.

مهارت‌های مورد نیاز

مهارت‌های کشاورزی عمومی

زمان به ساعت	
عملی	نظری
۲۵	۴

وسایل و تجهیزات مورد نیاز

زمین: یک هزار مترمربع برای هر نفر آموزش گیرنده

ماشین آلات: تراکتور، گاوآهن، دیسک، تریلی، کودپاش، لولر، کولتیواتور، بیل، چاقو و ماشین آلات

برداشت چغندر قند (در صورت امکان)

وسایل و نهادهای کشاورزی: کود آلی، کود معدنی (شیمیایی)، سوموم علف کش، انواع بذر چغندر قند،

مشمع و کلس

ساختمان و امکانات: تلویزیون، ویدئو، فیلم، تجهیزات حفظ نباتات (لوب، ذره‌بین، بینوکولر، میکروسکوپ،

تخنه مخصوص، مقوار، پنس، سنجاق، جعبه مخصوص نگهداری عوامل بیماری و اندامهای خسارت دیده)

بازدید از مزارع کشت مکانیزه، کارخانجات قند

پیش آزمون

۱- عوامل محیطی مؤثر در رشد و نمو گیاه را نام ببرید.

۲- آیش و تناوب را تعریف کنید.

۳- دو اصطلاح قوه نامیه و خلوص بذر را توضیح دهید.

۴- گیاهان، از نظر نیاز به نور به چند دسته تقسیم می‌شوند؟ با ذکر مثال برشمارید.

۵- دو اصطلاح حرارت اپتیم و حداقل درجه حرارت را توضیح دهید.

۶- خصوصیات خاکهای رسی را شرح دهید.

۷- زهکشی در خاک به چه منظوری انجام می‌شود؟

۸- تفاوت گیاهان بهاره و پاییزه در چیست؟

۹- برای هر گروه از گیاهان زیر حداقل ۳ نمونه ذکر کنید :

الف : غلات

ب : حبوبات

ج : گیاهان جالیزی

د : گیاهان علوفه‌ای

۱۰- تقسیم گیاهان زراعی از نظر زمان کاشت و عملیات زراعی مشابه یا تقسیم زراعت در مکان چه نام دارد؟

الف : آیش ب : آیش‌بندی ج : تناوب د : دوره تناوب

۱- تعیین منطقه کاشت چغندر قند



شکل ۱-۱

آیا تاکنون به منابع تأمین یکی از مهمترین موادغذایی و عامل شیرینی زندگی یعنی قند و شکر فکر کرده‌اید؟ در چگونگی تولید و مراحل تهیه آن، مقدار مصرف قند و شکر، نقش آن در تغذیه و صنایع غذایی، اثرات اقتصادی و استغالت‌زای این تولید بررسی و دقت داشته‌اید؟ حتماً می‌دانید که دو گیاه مهم چغندر قند (شکل ۱-۱) و نیشکر منابع تولید شکر هستند که هر کدام با مناطق و شرایط خاصی سازگاری دارند. قطعاً آحاد جامعه بشری در حال حاضر با بسیاری از این موارد آشنایی زیادی دارند اما برای کسب مهارت چغندرکاری (شکل ۱-۲) به جمع آوری و دسته‌بندی اطلاعات بیشتری نیاز است.



شکل ۱-۲- مزرعه چغندر

تاریخچه

چغندرقند از گیاهان بومی و قدیمی سواحل مدیترانه است اما شاید برای شما که قدمت اکثر گیاهان زراعی را بسیار طولانی و چند هزار ساله می‌دانید دانستن این نکته جالب توجه باشد که خواص و ارزش این گیاه در تهیه و تولید اقتصادی قند تا اواسط قرن ۱۸ ناشناخته بوده است و تا قبل از این زمان، در سطحی محدود از این گیاه برای تولید علوفه دام و یا به صورت پخته برای درمان بعضی از امراض مورد استفاده انسان قرار می‌گرفته است اما با پی بردن به اهمیت قند این محصول وجه شباهت آن به قند نیشکر و انجام اصلاحات بعدی، از قرن ۱۹ به بعد به عنوان یک گیاه صنعتی بسرعت در دنیا مورد کشت قرار گرفته است.

اهمیت چغندرقند

اهمیت چغندرقند را می‌توان در ابعاد مختلف اقتصاد، تغذیه، بهداشت و اشتغال مشاهده و بررسی نمود. ساکاروز، ماده‌اصلی قند و شکر به علت ارزش قابل توجه و خاصیت جذب آسان مهمترین ماده غذایی در زندگی انسان به حساب می‌آید که بسادگی می‌تواند در بدن به مواد مختلف مورد نیاز تبدیل گردد این امر خود باعث افزایش مصرف سرانه قند و شکر در دنیا بوده است به طوری که مصرف سرانه آن از حدود ۸ کیلوگرم در اوایل قرن ۲۰ در حال حاضر به بیش از ۳۰ کیلوگرم در سال رسیده است.

به چند مورد مهم از اهمیت چغندرقند توجه نمایید:
۱- هر ۲۵ گرم قند تولید شده از چغندرقند ۱۰۰ کالری انرژی در بدن تولید می‌کند.

۲- با ۳۰ تن محصول چغندرقند (متوسط عملکرد در هر هکتار) حدود ۴ تا ۵ تن قند تولید می‌شود.

۳- با کاشت یک هکتار زمین به طور متوسط ۲۵ تا ۳۰ تن و در یک عملکرد خوب می‌توانید ۵ تن محصول برداشت نمایید.

۴- در هر هکتار، علاوه بر غده تولیدی، ۲۵ تن برگ سبز،

طبقه، ۱۵ تن تفاله، ۱/۵ تن ملاس قابل استحصال می‌باشد.

آیا می‌دانید که این محصولات فرعی دارای ارزش ۵۰۰۰ واحد علوفه‌ای است و با استفاده در دامداری می‌تواند ۶۰۰۰ لیتر شیر یا ۶۰۰۰ تا ۸۰۰ کیلوگرم گوشت تولید نماید؟

۵- از دیگر موارد اهمیت چغندرقند می‌توان به تولید الكل از ملاس، ایجاد اشتغال به صورت مستقیم و غیرمستقیم در زمینه کشت و کار و تولید، صنایع و کارخانجات قند، حمل و نقل، توزیع و صنایع غذایی اشاره کرد.

در جداول ۱-۲ و ۱-۳ به آمار سطح زیر کشت چغندرقند در ایران و جهان و سطح نسبی زیر کشت در مناطق مختلف توجه نمایید تا بیشتر به اهمیت چغندرقند بپرید.

کار عملی

۱- آمار سطح زیر کشت چغندرقند در منطقه، شهرستان و استان خود را تهیه نمایید.

۲- براساس سرانه مصرف قند و شکر نیاز منطقه و استان خود را به چغندرقند و سطح زیر کشت مورد نیاز تعیین نمایید.

۳- گزارشی از اثرات تولیدی، اقتصادی، اجتماعی (مثل اشتغال‌زاوی) حرف و مشاغل مرتبط با تولید چغندرقند را در منطقه تهیه و ارائه نمایید.

۴- سطح زیرکشت و عملکرد استانهای مختلف را بررسی کنید و براساس نمودارهای دو سال متوالی مشخص نمایید که در چه استانهایی سطح زیر کشت توسعه یافته و همچنین در چه استانهایی متسط عملکرد افزایش داشته است. نتایج بررسی را به صورت گزارش تهیه و ارائه کنید.

جدول ۱-۱- سطح زیر کشت و میزان تولید چغندر قند در سالهای ۱۳۱۱-۷۴
واحد هزار هکتار - هزار تن

سال	سطح	تولید
۱۳۴۳	۴۲	۱۰۲۸
۱۳۴۴	۴۵	۱۴۱۱
۱۳۴۵	۵۲	۱۹۷۵
۱۳۴۶	۱۱۵	۲۸۷۵
۱۳۴۷	۱۴۵	۳۴۱۲
۱۳۴۸	۱۵۳	۳۴۸۴
۱۳۴۹	۱۶۹	۳۸۵۵
۱۳۵۰	۱۴۹	۳۷۷۲
۱۳۵۱	۱۴۴	۳۹۱۸
۱۳۵۲	۱۶۶	۴۰۸۶
۱۳۵۳	۱۵۹	۳۷۴۹
۱۳۵۴	۱۷۷	۴۴۹۴
۱۳۵۵	۲۰۱	۵۲۷۲
۱۳۵۶	۱۴۵	۳۹۶۸
۱۳۵۷	۱۳۱	۳۵۵۴
۱۳۵۸	۱۴۱	۳۸۲۴
۱۳۵۹	۱۵۴	۳۶۴۰
۱۳۶۰	۱۵۶	۲۲۵۳
۱۳۶۱	۱۸۳	۴۳۲۱
۱۳۶۲	۱۶۸	۳۶۴۹
۱۳۶۳	۱۳۴	۳۳۹۲
۱۳۶۴	۱۴۵	۳۹۲۴
۱۳۶۵	۱۷۷	۴۹۶۵
۱۳۶۶	۱۷۲	۴۴۵۶
۱۳۶۷	۱۴۷	۳۴۵۴
۱۳۶۸	۱۴۹	۳۵۳۵
۱۳۶۹	۱۴۹	۳۶۴۱
۱۳۷۰	۱۷۳	۵۰۰۰
۱۳۷۱	۲۰۵	۶۰۰۵
۱۳۷۲	۱۸۰	۵۴۰۸
۱۳۷۳	۲۰۴	۵۲۹۵
۱۳۷۴	۲۰۳	۵۵۲۱

سال	سطح	تولید
۱۳۱۱	۲	۱/۹
۱۳۱۲	۱۰	۷
۱۳۱۳	۸	۶۱
۱۳۱۴	۱۲	۸۷
۱۳۱۵	۱۶	۱۴۳
۱۳۱۶	۱۵	۱۲۴
۱۳۱۷	۱۹	۱۵۱
۱۳۱۸	۱۶	۱۷۵
۱۳۱۹	۲۵	۲۴۵
۱۳۲۰	۲۵	۱۶۲
۱۳۲۱	۱۸	۱۰۱
۱۳۲۲	۲۳	۱۰۵
۱۳۲۳	۲۶	۱۷۹
۱۳۲۴	۲۷	۱۷۴
۱۳۲۵	۳۱	۲۴۹
۱۳۲۶	۳۵	۳۶۶
۱۳۲۷	۳۹	۲۵۲
۱۳۲۸	۳۲	۱۹۱
۱۳۲۹	۳۴	۳۹۵
۱۳۳۰	۴۰	۵۰۹
۱۳۳۱	۴۳	۴۹۸
۱۳۳۲	۴۱	۵۰۶
۱۳۳۳	۳۸	۴۵۵
۱۳۳۴	۴۲	۵۳۷
۱۳۳۵	۴۸	۶۰۴
۱۳۳۶	۴۶	۷۲۷
۱۳۳۷	۵۴	۸۰۵
۱۳۳۸	۵۵	۷۰۸
۱۳۳۹	۴۸	۷۰۷
۱۳۴۰	۴۳	۸۱۰
۱۳۴۱	۴۲	۸۵۹
۱۳۴۲	۴۱	۸۶۶

مأخذ: زراعت چغندر قند، محمد کولیوند، مؤسسه تحقیقات چغندر قند، ۱۳۶۶
توضیح: آمار سال ۴۰ تا ۱۳۷۳ از بانک اطلاعات کشاورزی ایران، وزارت کشاورزی و پستیبانی، اداره کل آمار و اطلاعات، سال ۱۳۷۶.

جدول ۲-۱- برآورد سطح زیرکشت، تولید و عملکرد در هکتار چغندر قند کشور به تفکیک استان سال زراعی ۱۳۷۴-۷۵

نام استان	سطح: هکتار	تولید: تن	عملکرد: کیلوگرم
آذربایجان غربی	۱۴۶۸۲	۴۳۱۴۲۲	۲۹۳۸۴
اردبیل	۳۲۴۳	۱۵۲۳۰۵	۴۶۹۶۴
اصفهان	۱۲۲۰۰	۲۵۲۷۸۴	۱۹۰۰۶
تهران	۱۵۰۰	۳۶۰۶۳	۲۴۰۴۲
چهارمحال و بختیاری	۱۸۰۰	۳۱۰۰۶	۱۷۲۲۶
خراسان	۵۲۲۳۵	۱۳۰۷۳۸۳	۲۴۵۵۹
خوزستان	۸۸۰۰	۴۱۰۰۰۰	۴۶۵۹۱
سمنان	۲۵۵۰	۵۰۱۵۳	۱۹۶۶۸
فارس	۲۰۹۷۰	۳۸۳۷۸۳	۱۸۳۰۲
کرمان	۳۸۱۵	۱۰۱۱۲۴	۲۶۵۰۷
کرمانشاه	۹۰۰۸	۲۰۷۸۲۰	۲۳۰۷۱
کهگیلویه و بویراحمد	۱۶۰۰	۱۹۲۷۲	۱۲۰۴۵
لرستان	۳۲۰۰	۵۵۷۲۳	۱۷۴۱۳
مرکزی	۱۸۰۰	۴۲۸۵۶	۲۳۸۰۹
همدان	۴۲۰۰	۷۹۵۵۷	۱۸۹۴۲
قزوین و دشت	۵۵۰۰	۱۲۵۳۱۷	۲۲۷۸۵
کل کشور	۱۴۹۲۰۳	۳۶۸۶۵۶۸	۲۴۷۰۸

مأخذ: آمارنامه کشاورزی سال زراعی ۱۳۷۴-۷۵. وزارت کشاورزی، معاونت برنامه‌ریزی و پستیبانی، اداره کل آمار و اطلاعات، ۱۳۷۶.

پیمانهٔ مهارتی: تعیین منطقه کاشت چغندر قند


شمارهٔ شناسایی: ۱۴۱-۱/ک

مهارت: کشت چغندر قند


شمارهٔ شناسایی: ۱۴۱-۱/ک

جدول ۳-۱- برآورد سطح، تولید و عملکرد در هکتار چغندر قند به تفکیک استان سال زراعی ۷۷-۱۳۷۶



عملکرد (کیلوگرم)			تولید (تن)			سطح (هکتار)			نام استان
دیم	آبی	جمع	دیم	آبی	جمع	دیم	آبی	جمع	
۰	۴۰۸۱۱	۳۱۸۳	۰	۳۱۸۳	۷۸	۰	۷۸	۷۸	آذربایجان شرقی
۰	۳۲۸۴۶	۷۱۲۹۶۰	۰	۷۱۲۹۶۰	۲۱۷۰۶	۰	۲۱۷۰۶	۲۱۷۰۶	آذربایجان غربی
۰	۴۶۳۸۶	۲۱۳۵۶۲	۰	۲۱۳۵۶۲	۴۶۰۴	۰	۴۶۰۴	۴۶۰۴	اردبیل
۰	۲۶۷۰۰	۲۱۰۳۴۰	۰	۲۱۰۳۴۰	۷۸۷۸	۰	۷۸۷۸	۷۸۷۸	اصفهان
۰	۲۰۰۷۱	۲۸۱	۰	۲۸۱	۱۴	۰	۱۴	۱۴	ایلام
۰	۴۲۸۲۳	۴۱۱۲۰	۰	۴۱۱۲۰	۹۶۰	۰	۹۶۰	۹۶۰	تهران
۰	۲۴۶۱۰	۵۲۸۸۶	۰	۵۲۸۸۶	۲۱۴۹	۰	۲۱۴۹	۲۱۴۹	چهارمحال و بختیاری
۰	۲۸۷۶۸	۱۷۹۰۰۰۰	۰	۱۷۹۰۰۰۰	۶۲۲۲۲	۰	۶۲۲۲۲	۶۲۲۲۲	خراسان
۰	۴۲۳۸۰	۲۷۴۷۷۴۷	۰	۲۷۴۷۷۴۷	۶۴۸۳	۰	۶۴۸۳	۶۴۸۳	خوزستان
۰	۲۱۶۱۷	۴۵۱۸	۰	۴۵۱۸	۲۰۹	۰	۲۰۹	۲۰۹	زنجان
۰	۲۵۵۰۶	۷۵۷۵۳	۰	۷۵۷۵۳	۲۹۷۰	۰	۲۹۷۰	۲۹۷۰	سمنان
۰	۱۷۱۶۱	۵۳۱۲۱۱	۰	۵۳۱۲۱۱	۳۰۹۵۴	۰	۳۰۹۵۴	۳۰۹۵۴	فارس
۰	۳۱۴۳۹	۲۲۷۱۴۴	۰	۲۲۷۱۴۴	۷۲۲۵	۰	۷۲۲۵	۷۲۲۵	قزوین
۰	۲۵۶۵۷	۵۵۶۸	۰	۵۵۶۸	۲۱۷	۰	۲۱۷	۲۱۷	کردستان
۰	۲۵۴۴۴	۱۴۱۷۵۱	۰	۱۴۱۷۵۱	۵۵۷۱	۰	۵۵۷۱	۵۵۷۱	کرمان
۰	۱۹۴۴۸	۲۴۸۷۳۴	۰	۲۴۸۷۳۴	۱۲۷۹۰	۰	۱۲۷۹۰	۱۲۷۹۰	کرمانشاه
۰	۲۴۴۷۲	۱۷۶۲۰	۰	۱۷۶۲۰	۷۲۰	۰	۷۲۰	۷۲۰	کهگیلویه و بویراحمد
۰	۲۰۳۷۱	۸۷۸۰۰	۰	۸۷۸۰۰	۴۳۱۰	۰	۴۳۱۰	۴۳۱۰	لرستان
۰	۲۴۰۵۸	۳۸۴۲۰	۰	۳۸۴۲۰	۱۵۹۷	۰	۱۵۹۷	۱۵۹۷	مرکزی
۰	۲۴۹۶۲	۲۹۷۹۰۲	۰	۲۹۷۹۰۲	۱۱۹۳۴	۰	۱۱۹۳۴	۱۱۹۳۴	همدان
۰	۴۸۴۳۹	۱۱۹۱۶	۰	۱۱۹۱۶	۲۴۶	۰	۲۴۶	۲۴۶	بزد
۰	۲۶۹۸۳	۴۹۸۷۴۱۷	۰	۴۹۸۷۴۱۷	۱۸۴۸۳۷	۰	۱۸۴۸۳۷	۱۸۴۸۳۷	جمع



شکل ۱-۳- نمودار توزیع قدر نسبی سطح زیر کشت چغندر قند استانها نسبت به کل کشور سال زراعی ۱۳۷۴-۷۵



شکل ۱-۴- نمودار توزیع قدر نسبی میزان تولید چغندر قند استانها نسبت به کل کشور سال زراعی ۱۳۷۴-۷۵



شکل ۱-۵- نمودار توزیع سطح زیر کشت چغندر قند استانها نسبت به کل کشور سال زراعی ۱۳۷۶-۷۷

شکل ۱-۶- نمودار توزیع میزان تولید چغندر قند استانها نسبت به کل کشور سال زراعی ۱۳۷۶-۷۷

سطح زیر کشت، تولید و میزان عملکرد چغندر قند

سطح زیر کشت، تولید و میزان عملکرد چغندر قند در جهان: سطح زیر کشت چغندر قند در جهان در سال ۱۹۹۵ میلادی ۷۸۳۲ هزار هکتار بوده است.

میزان تولید چغندر قند جهان در این سال ۲۶۵۹۶۳ تن و میزان عملکرد در هکتار آن برابر با ۳۳۹۵۸ کیلوگرم بوده است.

جدول ۱-۴ - سطح زیر کشت، تولید عملکرد در هکتار چغندر قند در جهان، سال ۱۹۹۵

واحد: هزار هکتار، هزار تن، کیلوگرم در هکتار

عملکرد	تولید	سطح زیر کشت	نام کشور
۲۹۱۶۷	۷۰	۲	آلانی
۵۵۸۸۱	۲۸۸۶	۵۲	اتریش
۲۰۶۹۰	۱۲۰۰	۵۸*	بلاروس
۵۶۷۲۳	۵۷۲۹*	۱۰۱*	بلژیک + لوکزامبورگ
۳۵۰۰۰	۴۲	۱	بوسنی هرزه گوین
۱۸۱۸۲	۲۰۰F	۱۱*	بلغارستان
۲۶۲۵۰	۵۸۰F	۱۶F	کرواسی
۳۹۸۶۵	۳۷۱۲	۹۳	جمهوری چک
۴۴۵۸۲	۲۹۴۲F	۶۶	دانمارک
۳۱۸۹۷	۱۱۱۰	۳۵	فنلاند
۶۶۲۸۷	۳۰۳۵۹	۴۵۸	فرانسه
۴۹۸۰۴	۲۶۰۷۷	۵۲۴	آلمان
۶۲۹۹۸	۲۶۹۰*	۴۳*	یونان
۳۲۷۱۲	۴۱۹۲	۱۲۴	مجارستان
۳۸۰۵۶	۱۳۷۰*	۳۶*	ایرلند
۴۵۲۲۱	۱۲۹۳۳	۲۸۶*	ایتالیا
۲۲۴۶۹	۲۲۲	۱۰	لتونی
۲۵۴۷۸	۸۰۰F	۳۱F	لیتوانی
۴۰۳۲۰	۵۵*	۱*	مقدونیه
۲۵۶۱۰	۲۱۰۰	۸۲	جمهوری مولداوی
۶۶۰۸۷	۷۶۰۰F	۱۱۵*	هلند

نام قاره و کشور	سطح زیر کشت	تولید	عملکرد
جهان	۷۸۳۲	۲۶۵۹۶۳	۲۲۹۵۸
آفریقا	۸۵	۳۸۶۳	۴۵۵۱۸
مصر	۲۱	۹۲۰	۴۳۷۳۵
مراکش	۵۸	۲۷۱۷	۴۶۷۷۱
تونس	۶*	۲۲۶*	۳۹۳۷۳
آمریکای شمالی	۵۹۸	۲۶۳۸۶	۴۴۱۳۱
کانادا	۲۵	۱۰۲۷	۴۱۵۷۵
ایالات متحده آمریکا	۵۷۳	۲۵۳۵۹	۴۴۲۴۱
آمریکای جنوبی	۵۴	۳۷۴۶	۶۶۶۷۲
شبیلی	۵۳	۳۷۴۴	۷۰۲۷۰
آسیا	۱۳۲۵	۳۷۱۶۸	۲۸۰۴۳
چین	۶۹۵	۱۳۹۸۴	۲۰۱۲۱
گرجستان	۱F	۲۶F	۳۲۵۰۰
ایران	۲۰۵F	۵۹۰۰F	۲۸۷۸۰
ژاین	۷۰*	۳۶۸۶*	۵۵۲۰۱
قراقیستان	۴۱	۳۹۷	۹۷۲۸
لبنان	۲۰F	۱۱۰F	۵۵۰۰
پاکستان	۷	۱۹۴*	۵۳۷۵۰
سوریه	۳۳	۱۵۰۰F	۴۴۱۱۸
ترکیه	۲۱۰*	۱۱۶۸۰	۳۷۶۷۷
اروپا	۲۹۹۳	۱۴۱۲۲۲	۴۷۱۸۷


مأخذ: سالنامه آماری سازمان خواروبار و کشاورزی جهانی (FAO)، جلد ۴۹، سال ۱۹۹۵.

*: شانگر برآورد همان کشور است.


F : شانگر برآورد سازمان خواروبار و کشاورزی جهانی می باشد.



شکل ۱-۷ - چغندر قند



شکل ۱-۸



شکل ۱-۹ - قسمتهای مختلف ریشه چغندر قند

خصوصیات گیاه‌شناسی چغندر قند

حتماً تا حال، انواعی از چغندر (قند، علوفه‌ای، لبوی) را مشاهده نموده‌اید. انواع چغندر از نظر ظاهری تفاوت‌هایی دارد. چغندر قند گیاهی است از تیره اسفناج، ۲ ساله که در سال اول تولید ریشه (غده) می‌نماید و در سال دوم به ساقه و خوشی می‌رود در شکل ۱-۷، یک بوته چغندر قند خارج شده از خاک را مشاهده می‌نمایید.

خصوصیات ریشه: ریشه مهمترین و اصلی‌ترین قسمت زراعت برای تولید بشمار می‌آید. در ریشه ۴ قسمت متمایز وجود دارد که دارای ترکیبات و ارزش تولید قند متفاوتی است این قسمتها عبارت‌اند از :

۱- سر چغندر قند (طوقه): محل رویش برگها، دارای کمترین مقدار قند است و معمولاً بیرون از خاک قرار دارد.


۲- گردن: این قسمت فاقد برگ و در چغندر لبوی و علوفه‌ای بالای سطح زمین قرار دارد (شکل ۱-۸).

۳- قسمت اصلی: در داخل خاک قرار دارد و دارای ریشه‌های فرعی و شیار جانبی است و مواد غذایی به واسطه ریشه‌های این قسمت جذب می‌شود و دارای بیشترین درصد قند می‌باشد.

۴- دم چغندر قند (قسمت انتهایی): در انتهای قسمت اصلی آن را مشاهده می‌نمایید. این بخش، در جذب آب نقش دارد. موقع برداشت معمولاً قسمتی از آن قطع شده و در خاک باقی می‌ماند.

در شناسایی ریشه چغندر قند و خصوصیات آن به این موارد توجه داشته باشید : (شکل ۱-۹)

الف - وزن متوسط ریشه ۴۰۰ تا ۵۰۰ گرم و بعضاً به ۵ کیلوگرم می‌رسد.




شکل ۱۰- چگونگی تجمع قند در قسمتهای مختلف ریشه چغندر قند

ب- پیشترین مقدار قند، کمی بالاتر از وسط ریشه وجود دارد و به طرف ابتدا و انتهای درصد قند کاهش می‌یابد. در شکل ۱۰ درصد قند را در قسمتهای مختلف ریشه مشاهده می‌نمایید.

ج- در برش عرضی چغندر قند حلقه‌هایی به تعداد ۸ تا ۱۲ عدد مشاهده می‌کنید. هر قدر تعداد و تراکم این حلقه‌ها بیشتر باشد قند موجود در غده بیشتر است، در چغندر علوفه‌ای تعداد حلقه‌ها کمتر و ۳ تا ۶ عدد می‌باشد.

د- طوقه در چغندر علوفه‌ای بزرگتر از چغندر قند است

(شکل ۱۱).



شکل ۱۱- مقایسه انواع چغندر

کار عملی

۱- ریشه انواع (غده) چغندر را تهیه و آنها را از نظر شکل ظاهری مقایسه نمایید.

۲- برشی از سطح مقطع انواع چغندرها تهیه کنید و دو ایر سطح مقطع را شناسایی و از نظر تعداد مقایسه نمایید.

خصوصیات ساقه: معمولاً در مزارع تولید غده (ریشه) در سال اول ساقه را نمی‌بینید اما برای تهیه بذر در سال دوم و پس از طی یک دوره سرما چغندر قند برای تولید گل و بذر به ساقه می‌رود (شکل ۱۲).


در سال دوم، می‌توانید ساقه‌ها را که به تعداد ۲ تا ۳ عدد و به طول تقریبی ۱/۵ متر می‌باشد و از روی طوقه خارج شده‌اند مشاهده نمایید. تعدادی برج مستطیل شکل با دمبرگ کوتاه روی این ساقه‌ها بوجود می‌آید. ساقه‌دهی در سال اول، به هر دلیل خصوصیتی نامطلوب بشمار می‌آید. به این وضعیت در مزرعه توجه و دقت داشته باشید.




شکل ۱۲- ساقه رفتن چغندر قند



شکل ۱-۱۳- شاخه چغندر قند تک جوانه، با گلهای بارور



شکل ۱-۱۴



شکل ۱-۱۵- تشکیل منوزرم بر روی ساقه

خصوصیات برگ: در بررسی برگ مشاهده می‌نمایید که برگها از محل طوفه خارج می‌شوند و شامل پهنه‌ک با سطحی چین‌خورد و دمبرگ طویل هستند.

گل و گل آذین: چغندر قند جزو دو لپاهای بدون گلبرگ است که تعداد قطعات گل در آن را به صورت ۵ و یا مضربی از ۵ با قطعات مشابه مشاهده می‌کنید. این قطعات را کاسبرگ به حساب بیاورید. تعداد ۱ تا ۳ برچه‌ای و در مقابل هر کاسبرگ یک پرچم مشاهده می‌شود. گلهای نزدیک به هم می‌باشند. تشکیل گل را ابتدا روی ساقه اصلی می‌بینید (شکل‌های ۱-۱۳ و ۱-۱۴).

نظام تولید مثل

از نظر گرده افسانی به دلیل دیر رسیدن مادگی نسبت به پرچمهای گیاهی دگرگشن (غیر خودبارور) است گرده افسانی غالباً به وسیله باد و گاهی به واسطه حشرات انجام می‌شود. این عمل ۴ تا ۶ هفته طول می‌کشد.

میوه آن را مرکب یا ساده مشاهده می‌نمایید. به دلیل تردیکی گلهای به هم در موقع رسیدن دانه به صورت بذر چند جوانه‌ای درمی‌آید (شکل ۱-۱۴). دانه‌ها (۱ تا ۵ دانه) در داخل کپسولی قرار دارند.

بذرهایی که دارای یک جوانه هستند بذر تک جوانه‌ای (منوزرم) و بذرهای چند جوانه‌ای (۲ تا ۵ عدد) را چند جوانه‌ای (پلی ژرم) می‌نامند.

کار عملی

۱- اندامهای مختلف (بوته کامل) چغندر قند را تهیه کنید و با انجام تحقیقات زیر، خصوصیات گیاه‌شناسی را روی گیاه بررسی و گزارش کار ارائه کنید. (اندازه‌گیری و توزین ریشه، تفکیک و شناسایی قسمتهای مختلف ریشه، تعداد برگ و محل خارج شدن آنها، اندازه برگها ...)



شکل ۱۶- گونه های مختلف چغندر قند



شکل ۱۸- گونه N



شکل ۱۷- گونه E



شکل ۱۹- گونه Z

۲- در زراعت سال اول چغندر (شکل ۱۶) چه پدیده خاصی مشاهده می کنید؟ مطلوب یا نامطلوب بودن آن را بررسی نمایید.

گونه های مختلف چغندر قند


در زراعت چغندر قند با گونه های مختلف این محصول از نظر درصد قند، حجم ریشه، تعداد برگ، زودرسی و دیررسی مواجه هستید. مهمترین گونه های موجود و خصوصیات شاخص آنها عبارت است از :

۱- گونه E: این گونه را به صورت ریشه های بزرگ و وزین با برگ های نسبتاً زیاد، سر نسبتاً پهن و محصول زیاد مشاهده می نمایید. درصد قند آن ۱۵ تا ۱۵ درصد و کمتر از سایر گونه هاست. دیررس است و دوره رشد آن ۲۱۰ تا ۲۴۰ روز می باشد با مناطق معتدل برای تولید سازگاری بیشتری دارد. (شکل ۱۷- گونه E) به خاطر درصد قند پایین و دیررس بودن، معمولاً از این گونه کمتر برای کشت استفاده می شود.

۲- گونه N یا معمولی: ریشه و طوفه کوچکتر و برگ های کمتری نسبت به گونه E دارد و درصد قند آن بیشتر است. دوره رشد کوتاه تر (۱۸۰ تا ۲۱۰ روزه) دارد با شرایط آب و هوایی ایران سازگاری زیادی دارد. (شکل ۱۸- گونه N) در اغلب مناطق ایران، از این گونه، برای کشت استفاده می کنند.

۳- گونه Z یا پرقند: این گونه را به صورت باریک و کشیده و با تعداد برگ کمتر نسبت به ۲ گونه قبلی مشاهده می نمایید ولی درصد قند آن بیشتر و حدود ۱۷ تا ۱۸ درصد است. ارقام این گونه زودرس و با طول دوره رشد ۱۵۰ تا ۱۸۰ روز می باشد. مناسب برای مناطق گرمسیر است و به دلیل رطوبت کمتر، برای نگهداری حمل به نقاط دور مناسب است. (شکل ۱۹- گونه Z) این گونه نسبت به گونه های دیگر نیاز آبی بیشتری دارد.

۴- گونه ZZ: شبیه گونه Z با درصد قند بیشتر است و مقاومت زیادی در مقابل شرایط نامناسب خصوصاً گرمای تابستان دارد. چون عملکرد وزنی کمتری دارد، کشت آن از نظر اقتصادی



شکل ۱-۲۰—بذر چند جوانه‌ای معمولی

مقرن به صرفه نیست. غالباً برای فعالیتهای آزمایشگاهی و اصلاح تزاد از آن استفاده می‌کنند.

۵—گونه RC: از تلاقی بین دو گونه Z و N چغندر قند به دست آمده مشخصاتی شبیه گونه N دارد ولی در صد قند ریشه آن بیشتر از گونه N است. این گونه چغندر قند در مقابل بیماری لکه گرد نیز مقاوم می‌باشد.

انواع بذر چغندر قند

در تهیه و انتخاب بذر با عنوانین مختلفی مثل بذر چند جوانه (معمولی و درجه‌بندی شده) و بذر تک جوانه (mekanikي، teknikي، زتيكى) مواجه هستيد با استفاده از بذور مناسب می‌توانيد زراعت چغندر قند موفقی را داشته باشيد به خصوصیت انواع این بذر توجه نمایيد.

الف—بذر چند جوانه‌ای: انواع بذر چند جوانه‌ای

عبارة است از :


۱—بذر چند جوانه‌ای معمولی: این بذر به صورت معمولی و بدون انجام موارد اصلاحی تهیه می‌شود تعداد جوانه‌های بذر چغندر قند در حالت طبیعی ۲ تا ۵ عدد است. اگر از این بذور برای کشت استفاده شود، به همین تعداد بوته در یک محل تولید خواهد شد (شکل ۱-۲۰).

۲—بذر چند جوانه‌ای درجه‌بندی شده: در این روش بذور چند جوانه‌ای از طریق ماشینهای بوجاری در اندازه‌های مختلف درجه‌بندی و کالیبره می‌شود تا در استفاده از ماشینهای کاشت مشکلی بوجود نیاید. برای مثال بذور با قطر $\frac{3}{5}$ تا $\frac{4}{5}$ میلیمتر در یک گروه و بذر با قطر $\frac{4}{5}$ تا $\frac{6}{5}$ میلیمتر در گروه دیگر قرار می‌گیرند (شکل ۱-۲۱).

ب—بذر تک جوانه‌ای: برای کاهش هزینه‌های سنگین تنک کردن، می‌توانید از انواع بذر تک جوانه‌ای استفاده نمایید.

انواع بذر تک جوانه‌ای عبارت است از :

۱—بذر تک جوانه‌ای مکانیکی: برای تهیه این بذر، به کمک



شکل ۱-۲۱—بذر چند جوانه‌ای درجه‌بندی شده



شکل ۱-۲۳—بذرهای
تک جوانه‌ای تکنیکی



شکل ۱-۲۲—جوانه بذر
تک جوانه‌ای تکنیکی



شکل ۱-۲۵—بذرهای
تک جوانه‌ای ژنتیکی



شکل ۱-۲۴—جوانه بذر
تک جوانه‌ای ژنتیکی



شکل ۱-۲۶—جوانه‌های انواع بذرهای چغندر قند

دستگاههای مخصوص بذور چند جوانه‌ای بریده و به چند بخش تقسیم می‌شوند و بذر تک جوانه از آن جدا می‌شود. در این روش ضایعات بذر زیاد است و به همین دلیل از این نوع بذر کمتر استفاده می‌کنند.

۲—بذر تک جوانه‌ای تکنیکی: از آنجا که درصدی از بذور یک توده بذر چند جوانه، تک جوانه‌ای می‌باشد با استفاده از خاصیت وزن مخصوص (بوجاری کردن) بذر تک جوانه را از یک توده جدا می‌سازند و پس از پرک‌گیری به عنوان بذر تک جوانه از آن استفاده می‌نمایند. توجه داشته باشید برغم دقت زیاد، باز هم با حدود ۳۰ درصد بذور ۲ جوانه برخورد می‌نمایید (شکلهای ۱-۲۲ و ۱-۲۳).

۳—بذر تک جوانه‌ای ژنتیکی: در این روش با شناسایی و انتخاب بذوری که به صورت ارشی تک جوانه هستند و کشت آنها برای تهیه بذر امکان تولید بذر تک جوانه‌ای ژنتیکی در سطحی وسیع را فراهم می‌آورد که یکی از مطمئن‌ترین روشها برای تولید بذر سالم تک جوانه‌ای به شمار می‌آید (شکلهای ۱-۲۴ و ۱-۲۵).


عوامل اقلیمی مؤثر بر رشد و نمو
چغندر قند مخصوص مناطق معتدل است که روزهای گرم و شبهای سرد دارد. این ویژگی، از مصرف قند ذخیره شده توسط گیاه جلوگیری می‌کند. کشت چغندر قند در مناطقی امکان‌پذیر است که تابش نور خورشید کافی و منطقه محل کشت حداقل ۱۸° تا ۲۰° روز بدون یخ‌بندان باشد.

عکس العمل چغندر قند نسبت به حرارت: حداقل درجه حرارت برای جوانه زدن چغندر قند ۴ تا ۵ درجه سانتیگراد و مناسب‌ترین درجه حرارت جوانه زدن ۸ درجه می‌باشد. در اوایل رشد، به سرما حساس است ولی در پاییز تا ۶ درجه زیر صفر را بخوبی تحمل می‌کند. گرمای بیش از اندازه، رشد و ذخیره‌سازی قند را در چغندر قند متوقف می‌کند به همین دلیل کشت آن در نقاط گرمسیر به صورت زمستانه و در پاییز انجام می‌شود و در

رشد در شرایط

مطلوب


رشد چغندرقند در زمینهای زهدار



شکل ۱-۲۷- رشد چغندرقند در زمینهای زهدار



شکل ۱-۲۸- خاک سفت و نامناسب که سبب منشعب شدن انتهای ریشه گردیده است.



شکل ۱-۲۹- خاک مناسب و قابل نفوذ برای ریشه

بهار قبل از شروع گرمای تابستانه برداشت انجام می‌شود. در حرارت 40° درجه و بالاتر رشد و ذخیره‌سازی قند به حداقل می‌رسد.

بهترین درجه حرارت برای رشد و تولید قند: میانگین درجه حرارت 20° درجه در روز و حدود 10° درجه در شب می‌باشد. مجموع درجه حرارت مورد نیاز چغندرقند از جوانه زدن تا برداشت و در طول دوره رشد (حدود 200 روز) 2400 تا 2800 درجه سانتیگراد است.

عكس العمل چغندرقند نسبت به رطوبت: چغندرقند
به علت داشتن برگهای زیاد با سطح نسبتاً بزرگ به آب زیادی نیاز دارد. نیاز آبی چغندرقند از کاشت تا برداشت به طور متوسط 10 تا 12 هزار متر مکعب در هکتار است. هر قدر میزان نزولات در منطقه پیشتر باشد مقدار آب کمتری برای آبیاری مورد نیاز می‌باشد به طوری که در مناطقی که حدود 600 تا 800 میلیمتر بارندگی با توزیع مناسب وجود داشته باشد کشت دیم چغندرقند امکانپذیر است هر چند که در ایران کشت دیم چغندرقند وجود ندارد.

چغندرقند نسبت به اراضی زهدار و مناطقی که سطح آب زیرزمینی بالای دارند حساس است. در این مناطق انتهای ریشه منشعب و چند شاخه می‌شود و درصد قند کاهش می‌باید (شکل ۱-۲۷).
نیاز آبی چغندرقند در ابتدای رشد و نمو نسبتاً کم ولی در اواسط رشد و نیز در تابستان به حداقل می‌رسد.

**عكس العمل چغندرقند نسبت به خاک: چغندرقند طالب خاکهای رس و لیمونی با واکنش خنثی تا کمی قلیایی است. در خاکهای مختلف عکس العمل چغندرقند متفاوت است به طوری که:
۱- در خاکهایی با درصد رس بالا هرچند عملکرد خوبی دارد اما سیز کردن و برداشت محصول با مشکل رویرو می‌شود.
۲- خاکهایی که دارای مقدار زیادی سنگ هستند و خاکهای سفت و نفوذناپذیر در لایه‌های سطحی، برای کاشت چغندرقند مناسب نیست چون انتهای ریشه منشعب و در نهایت مقدار قند آن کم می‌شود (شکلهای ۱-۲۸ و ۱-۲۹).**

پیمانهٔ مهارتی: تعیین منطقه کاشت چغندر قند

شمارهٔ شناسایی: ۱۴۱-۷۴/ک

مهارت: کشت چغندر قند

شمارهٔ شناسایی: ۱۴۱-۷۴/ک



شكل ۱-۳۰- زراعت چغندر قند در اراضی سور

۳- خاکهای خیلی آهکی و اسیدی برای چغندر قند مناسب نیستند.

۴- در اراضی سور مشکل جوانه زدن وجود دارد اما پس از سبز شدن مقاومت بوته در برابر سوری افزایش می‌یابد. در اراضی سور کشت را پایین‌تر از داغ آب باید انجام دهید. در شکل ۱-۳۰ کشت چغندر قند و مقاومت آن در اراضی سور پس از سبز شدن نشان داده شده است.

حساسیت چغندر قند نسبت به نور: چغندر قند گیاهی است روز بلند. طول روز بلند برای این گیاه با افزایش ذخیره قند همراه است. ضمن اینکه افزایش نور موجب افزایش رشد قسمتهای هوایی مانند برگها نخواهد شد.

شناسایی محل چغندر در گردش زراعی

در تعیین محل چغندر قند در گردش زراعی توجه داشته باشید که چغندر قند گیاهی است و جینی و نیاز فراوان به موادغذایی، خاک حاصلخیز و عمیق دارد. در اجرای برنامهٔ تناوب چغندر قند نکات زیر را مورد رعایت قرار دهید.

۱- چغندر قند را در اوّل برنامهٔ تناوب قرار دهید تا از موادغذایی استفاده لازم را داشته باشد.

۲- گیاهی که بعد از چغندر قند کشت می‌شود از زمین تمیز شده با تهويه مناسب برخوردار است.

۳- با توجه به طولانی بودن دورهٔ رشد و نمو چغندر قند، به فرست زمانی برای آماده‌سازی زمین و کاشت توجه داشته باشید.

۴- کشت چغندر قند بعد از نباتات خانواده لگومینوئز (یونجه، شبدر، ...) نتیجهٔ خوبی به همراه دارد خصوصاً یونجه که علاوه بر بهبود وضعیت خاک و تأمین ازت مورد نیاز، موجب کاهش نماتدهای موجود در خاک نیز می‌شود.

۵- چغندر قند نیاز به آب زیادی دارد تأمین آب مورد نیاز را مدنظر داشته باشید.

جدول ۵-۱- جدول تناوبی در مناطق گرمسیر

چهارم	سوم	دوم	اول	سال \ قطعه
جالیز	گندم	سورگوم	چغندر قند	۱
چغندر قند	جالیز	گندم	سورگوم	۲
سورگوم	چغندر قند	جالیز	گندم	۳
گندم	سورگوم	چغندر قند	جالیز	۴

جدول ۶-۱- جدول تناوبی

چهارم	سوم	دوم	اول	سال \ قطعه
آیش	گندم	آیش	چغندر قند	۱
چغندر قند	آیش	گندم	آیش	۲
آیش	چغندر قند	آیش	گندم	۳
گندم	آیش	چغندر قند	آیش	۴

۶- در دوره تناوب، فاصله دو کاشت چغندر قند را حداقل ۴ تا ۵ سال انتخاب کنید. در زمینهای آلوده به نمایند فاصله دو کشت چغندر قند یا کشت چغندر قند و سایر گیاهان این خانواده را حداقل ۱۰ سال در نظر بگیرید.

۷- کود سبز را در اول، یا آخر تناوب با چغندر قند قرار دهید.

- با توجه به اصول و رعایت نکات اساسی در تعیین برنامه تناوب، در مناطق مختلف می‌توانید تناوبهای زیر را برقرار کنید:
(الف) یکی از برنامه‌های متدائل در مناطق گرمسیر استفاده از گیاهانی مانند سورگوم، گندم و جالیز در تناوب می‌باشد (جدول ۵-۱).

ب) در مناطقی که محدودیت زمانی برای کاشت گندم بعد از چغندر قند وجود دارد و یا در مناطقی که با محدودیت منابع آبی مواجه می‌باشد جدول ۶-۱ را می‌توان توصیه نمود.

ج) تناوب چند قسمتی نیز با استفاده از گیاهان متنوع در برخی از مناطق مرسوم است. (جدول ۶-۲).

جدول ۷-۱- جدول تناوبی

پنجم	چهارم	سوم	دوم	اول	سال \ قطعه
آیش	ذرت	دانه روغنی	گندم	چغندر قند	۱
چغندر قند	آیش	ذرت	دانه روغنی	گندم	۲
گندم	چغندر قند	آیش	ذرت	دانه روغنی	۳
دانه روغنی	گندم	چغندر قند	آیش	ذرت	۴
ذرت	دانه روغنی	گندم	چغندر قند	آیش	۵

د) اجرای تناوب با گردش زراعی ۸ ساله که استفاده از یونجه و غلات دانه‌ریز در آن مرسوم می‌باشد (جدول ۱-۸).

تذکر: ۱- در این تناوب، قطعات ۷ و ۸ را در سال اول به کشت یونجه یکساله اختصاص دهید. ۲- در سال دوم فقط قطعه ۷ نیاز به کشت یونجه یکساله دارد. ۳- به جای یونجه یکساله می‌توانید از کشت شبدر و یا سایر گیاهان علوفه‌ای یکساله استفاده کنید.

جدول ۱-۸- جدول تناوبی

سال قطعه	اول	دوم	سوم	چهارم	پنجم	ششم	هفتم	هشتم
چغندر قند	چغندر قند	گندم	جو	یونجه	یونجه	یونجه	یونجه	یونجه
گندم	گندم	جو	یونجه	یونجه	یونجه	یونجه	یونجه	یونجه
چغندر قند	چغندر قند	یونجه	یونجه	یونجه	یونجه	یونجه	یونجه	یونجه
جو	گندم	یونجه	یونجه	یونجه	یونجه	یونجه	یونجه	یونجه
یونجه	جو	چغندر قند	چغندر قند	یونجه	یونجه	یونجه	یونجه	یونجه
یونجه	یونجه	چغندر قند	گندم	جو	یونجه	یونجه	یونجه	یونجه
یونجه	یونجه	گندم	چغندر قند	یونجه	یونجه	یونجه	یونجه	یونجه
یونجه	یونجه	چغندر قند	چغندر قند	یونجه	یونجه	یونجه	یونجه	یونجه

کار عملی

- با توجه به اصول تناوب و گیاهان موجود در منطقه، یک جدول تناوبی ۵ ساله با استفاده از چغندر قند تعیین نماید.
- شرایط مناسب و نامناسب کشت چغندر قند را در منطقه خود بررسی و اثرات آن را در توسعه کشت چغندر قند تحقیق و گزارش کتبی تهیه و ارائه کنید.

آزمون پایانی

۱- سرانه مصرف قند و شکر در حال حاضر در کشور ما حدود چه میزان است؟

الف: ۱ کیلوگرم ب: ۸ کیلوگرم ج: ۳۰ کیلوگرم د: ۵۰ تا ۶۰ کیلوگرم

۲- میزان متوسط تولید قند و شکر حاصل از یک هکتار زراعت چغندرقند چه مقدار است؟

الف: ۳۰ کیلوگرم ب: ۱۰۰ کیلوگرم ج: ۷۵ کیلوگرم د: ۴ تا ۵ تن

۳- بیشترین سطح زیر کشت چغندرقند در کدام استان کشور وجود دارد؟

الف: خراسان ب: خوزستان ج: فارس د: اصفهان

۴- کدام گزینه در مورد خصوصیات گیاهشناسی چغندرقند صحیح است؟

الف: چغندرقند گیاهی است یکساله با تولید همزمان ساقه و ریشه (غده)

ب: چغندرقند گیاهی است دوساله که در سال اول، تولید ریشه (غده) می نماید.

ج: چغندرقند گیاهی است چند ساله که ابتدا ساقه و بعد ریشه (غده) تولید می کند.

د: چغندرقند گیاهی است دوساله که حتماً در سال اول تولید ساقه می نماید.

۵- بیشترین درصد قند در کدام قسمت چغندرقند وجود دارد؟

الف: سر (طبقه) ب: دم ج: گردن د: قسمت میانی

۶- در برش عرضی چغندرقند تعداد دوازه سطح مقطع چه میزان است؟

الف: ۱ عدد ب: ۳ تا ۶ عدد ج: ۸ تا ۱۲ عدد د: ۲۰ عدد

۷- کدام قسمت در ساختمان گل چغندرقند وجود ندارد؟

الف: کاسبرگ ب: گلبرگ ج: پرچم د: مادگی

۸- ریشه های بزرگ و وزین، درصد قند ۱۴ تا ۱۵ درصد و دیررس و دوره رشد ۲۱۰ تا ۲۴۰ روز مربوط به کدام گونه چغندرقند است؟

ZZ : د Z : ج N : ب E : الف

۹- در کدام نوع بذر، حدود ۳۰ درصد بذور ۲ جوانه تولید می نماید؟

الف: چند جوانه درجه بندی شده ب: تک جوانه مکانیکی

ج: تک جوانه تکنیکی د: تک جوانه زننده

۱۰- کدام مناطق برای چغندرقند مناسب می باشد؟

الف: معتدله با روزهای گرم و شبهاي سرد ب: سردسیر با روزهای گرم و شبهاي سرد

ج: گرم‌سیر با روزها و شبهاي گرم د: نيمه گرم‌سیر با روزهای سرد و شبهاي گرم

۱۱- حداقل درجه حرارت برای جوانه زدن چغندرقند درجه و مناسبترین درجه حرارت جوانه

زدن درجه سانتيگراد می باشد.

پیمانهٔ مهارتی: تعیین منطقه کاشت چغندر قند شمارهٔ شناسایی: ۱۴۱-۷۴/ک	مهارت: کشت چغندر قند شمارهٔ شناسایی: ۱۴-۱-۷۴/ک
--	---

- ۱۲- میزان آب مورد نیاز چغندر قند از کاشت تا برداشت چقدر است؟
- الف: ۲ هزار متر مکعب ب: ۴ تا ۵ هزار متر مکعب
 ج: ۱۰ تا ۱۲ هزار متر مکعب
- ۱۳- کدام خاک برای چغندر قند مناسب است؟
- الف: رس و لیمونی با واکنش خنثی تا کمی قلیایی ب: شنی و آهکی
 ج: رسی و زهدار د: شنی با واکنش اسیدی
- ۱۴- کدام گزینه در مورد نیاز نوری چغندر قند صحیح است؟
- الف: روز کوتاه ب: روز بلند ج: غیرحساس به نور د: سایه دوست
- ۱۵- فاصله کاشت چغندر قند در زمینهای آلوده به نباتد حداقل باید چند سال باشد؟
- الف: ۲ سال ب: ۴ سال ج: ۵ تا ۶ سال د: ۱۰ سال
- ۱۶- کشت کدام گیاه قبل از چغندر قند، موجب کاهش نماتدهای موجود در خاک می‌شود؟
- الف: غلات (گندم) ب: جالیز (خربزه) ج: کود سبز د: یونجه

پیمانه مهارتی: عملیات تهیه زمین چغندرقند
شماره شناسایی: ۱۴-۲-۷۴/ک

مهارت: کشت چغندرقند
شماره شناسایی: ۱۴-۱-۷۴/ک

عملیات تهیه زمین چغندرقند

هدف کلی

تهیه و آماده سازی زمین برای کاشت چغندرقند

هدفهای رفتاری: فرآگیر پس از گذراندن این پیمانه مهارتی، باید بتواند:

- ۱- عملیات شخم را برای زمین چغندر انجام دهد.
- ۲- کود مورد نیاز آلی و معدنی کشت چغندر را برآورد و در زمین مورد استفاده قرار دهد.
- ۳- عملیات خاک ورزی ثانویه را برای کاشت چغندرقند در خاک انجام دهد.
- ۴- کنترل و پیشگیری علفهای هرز را قبل از کاشت در زمین انجام دهد.

مهارت‌های مورد نیاز
مهارت آماده سازی زمین

وسایل، تجهیزات و امکانات مورد نیاز

تراکتور، گاوآهن، دیسک، تریلی، کودپاش، بیل، لولر، کولتیواتور، سموم علفکش، کود آلی، کود معدنی و شیمیابی

زمین: یک هزار متر مربع برای هر نفر

زمان به ساعت	
نظری	عملی
۲۴	۳/۵

پیش آزمون

- ۱- مشخصات خاک را در موقع گاورو شدن شرح دهید.
- ۲- مزایای شخم پاییزه را بنویسید.
- ۳- شبیه مجاز طولی کرت عبارت است از:
الف: ۴ تا ۶ در هزار ب: ۲ تا ۴ در هزار ج: ۱/۵ تا ۸ در هزار
- ۴- مشخصات یک شخم خوب را بیان نماید.
- ۵- سوپر فسفات تریپل برای کدام یک از انواع خاکهای زیر مناسبتر است?
الف: اسیدی ب: آهکی ج: شور
د: هر سه مورد
- ۶- کودپاشی با ماشین چه مزایایی نسبت به کوددهی دستی دارد؟
- ۷- کدام یک از انواع خاکهای زیر نفوذپذیری کمتری دارند?
الف: سنی ب: لومی ج: رسی لومی
د: رسی
- ۸- کدام یک از ادوات زیر ضمن به هم زدن خاک، کلوخه‌ها را نرم می‌کند?
الف: دیسک ب: گاوآهن ج: مرزکش
د: زیرشکن
- ۹- از غلتک در چه مواردی استفاده می‌شود؟
- ۱۰- موارد استفاده از دندانه را ذکر نماید.



۲- عملیات تهیه زمین چغندرقند

خاک ورزی اولیه

عملیات تهیه زمین چغندرقند، حداقل از ۶ تا ۴ ماه قبل از کاشت شروع می‌شود. با توجه به محل چغندرقند در گردش زراعی و نوع محصول قبلی، نحوه تهیه زمین متفاوت است. در انتخاب و آماده‌سازی زمین برای شخم به موارد زیر دقت داشته باشید:

۱- در زمینهایی که در آن تسطیح اساسی انجام شده است به دلیل جابجایی زیاد خاک و پرتوق بودن چغندرقند، از کشت این محصول به عنوان اولین زراعت خودداری نمایید. بهتر است در این اراضی ابتدا جو و یا گیاهان علوفه‌ای کوتاه مدت، سپس چغندرقند کشت شود.

۲- اگر سطح آب زیرزمینی بالا باشد لازم است قبلًاً عملیات زهکشی در مرزه انجام شده باشد.

۳- در صورت وجود سنگ و دیگر عوامل مشکل‌ساز برای عملیات کاشت با وسایل مکانیزه و حتی دستی، این عوامل و عوارض سوء را حذف نمایید.

۴- اگر قبل از کاشت چغندرقند زمین به حالت آیش بوده، در صورت وجود علفهای هرز، با انجام عملیات سطحی مثل دیسک زدن و کولتیواتور زدن آنها را از بین بیرید.

۵- در صورتی که قبل از چغندرقند، کود سبز در زمین کشت شده است در اوایل تابستان و قبل از گل دادن، آن را به وسیله دیسک زدن و یا با استفاده از سایر وسایل، با خاک مخلوط کنید.

۶- چنانچه در برنامه گردش زراعی، چغندرقند بعد از غلات قرار گرفته باشد بعد از برداشت محصول قبلی خراش دادن زمین را با دیسک یا کولتیواتور یا پنجه غازی به منظور مخلوط کردن بقایای گیاهی (کاه و کلش) و علفهای هرز با خاک انجام دهید (مرطوب بودن خاک بعد از این مرحله و تا قبل از شخم پاییزه موجب سبز شدن علفهای هرز و از بین رفتن آنها در عملیات بعدی می‌شود) (شکل ۲-۲).



شکل ۲-۱- جمع کردن سنگ با تراکتور



شکل ۲-۲- مخلوط کردن بقایای گیاهی (کاه و کلش) با خاک



شکل ۲-۳- دیسک برای خرد کردن و مخلوط کردن بقایای گیاهی



شکل ۲-۴- پنجه برای خرد کردن و جمع آوری بقایای گیاهی

۷- در مورد سایر گیاهان، پس از برداشت محصول بقایای گیاهی را در صورت امکان به وسیله دیسک (شکل ۲-۳) و یا کولتیواتور (شکل ۲-۴) خرد و با خاک مخلوط کنید. در غیر این صورت به نحو ممکن آنها را جمع آوری و از مزرعه خارج سازید.

۸- در صورتی که محصول قبلی از گیاهان خانواده لگومینوز خصوصاً یونجه باشد پس از برداشت محصول، در اوایل پاییز، زمین را شخم عمیق بزنید تا در طول پاییز و زمستان ریشه‌های خارج شده یونجه بپوسند و از بین بروند (شکل ۲-۵).



شکل ۲-۵- انجام شخم برای برگرداندن یونجهزار



شکل ۲-۶—نحوه کودپاشی

۹—قبل از شخم عمیق پاییزه حدود ۲۰ تا ۳۰ تن کود حیوانی را به صورت کاملاً یکنواخت در زمین پخش نمایید. برای این کار می‌توانید از دستگاه پخش کود دامی (شکل ۲-۶) استفاده کنید.

شخم در زراعت چغندرقند: در زراعت چغندرقند به نکات زیر توجه داشته باشید و آنها را در عملیات شخم رعایت کنید.

۱—شخم پاییزه موجب افزایش محصول چغندرقند می‌شود. یکی از مهمترین دلایل کمبود محصول در سطح کشور، اجرا نکردن شخم پاییزه در این زراعت می‌باشد.

۲—چون در شرایط مناسب، ریشه اصلی چغندرقند بیشتر از یک متر در خاک نفوذ می‌نماید هر قدر عمق شخم بیشتر باشد ریشه چغندرقند بیشتر در خاک قرار گرفته، درصد قند و وزن ریشه افزایش می‌یابد. به همین دلیل، شخم را به صورت عمیق در خاک انجام دهید. (این زراعت نیاز به شخم عمیق دارد.)

۳—قبل از انجام شخم به گاورو بودن خاک و تأمین رطوبت از طریق تزولات و یا آبیاری توجه داشته باشید.

عملیات شخم در زراعت چغندرقند:

۱—پس از انتخاب مزرعه چغندرقند و انجام عملیات قبل از شخم در پاییز برای شخم زدن از گاوآهن برگردان دار و تراکتور استفاده کنید. در صورتی که خاک سفت و کم عمق باشد به جای گاوآهن برگردان دار می‌توانید از سوسنگ برای شخم استفاده کنید.
۲—شخم را به صورت عمیق (با عمق بیش از ۲۵ سانتیمتر) انجام دهید (شکل ۲-۷).

۳—قبل از کاشت، نیاز به شخم دوم، با عمق سطحی دارید. در مناطق گرمسیر، این شخم را در پاییز و قبل از کاشت انجام دهید اما در سایر مناطق، شخم دوم در اوخر زمستان انجام می‌شود.



شکل ۲-۷—شخم زمین

خاک‌ورزی ثانویه



شکل ۲-۸- عملیات خرد کردن کلوخه‌ها به وسیله دیسک

پس از انجام شخم، زمین را تا موقع کاشت به حال خود رها کنید و با فرا رسیدن فصل و زمان کاشت سطح خاک را کاملاً نرم نمایید و عوامل نامساعد باقیمانده مثل کلوخ و ریشه گیاهان را از بین ببرید تا بستر مناسب برای کاشت بذر فراهم گردد. عملیات خاک‌ورزی ثانویه چغندرقند عبارت است از: نرم کردن زمین چغندرقند: با گاورو شدن زمین قبل از کاشت، حداقل یک بار عملیات دیسک زدن را در خاک انجام دهید (شکل ۲-۸). در صورتی که بعد از دیسک زدن اول در اثر عدم رعایت اصول شخم و یا وضعیت خاک هنوز کلوخه‌های درشت در زمین وجود دارد چند روز بعد یک بار دیگر و در جهت عمود بر عملیات قبلی، دیسک زدن را تکرار کنید.

هموار کردن زمین: ناهمواریهای جزئی موجود در مزرعه را با صاف کن یا لولر کاملاً تسطیح نمایید.

آماده‌سازی زمین از نظر موادغذایی: برای تأمین موادغذایی مورد نیاز چغندرقند در خاک، توجه داشته باشید که این گیاه به موادغذایی زیادی احتیاج دارد و طبق آزمایش‌های انجام شده در نقاط مختلف به طور متوسط در یک محصول خوب تقریباً ۳۰۰ کیلوگرم پتاس، ۲۰۰ کیلوگرم ازت، ۷۰ کیلوگرم فسفر و ۹۰ کیلوگرم آهک از موادغذایی زمین در هر هکتار کاسته می‌شود. این موادغذایی را با اضافه کردن کودهای آلی و معدنی به خاک تأمین کنید. در صورتی که از کود حیوانی استفاده نموده‌اید توجه داشته باشید در هر تن کود دامی به طور متوسط ۱/۵ کیلوگرم ازت، ۱/۵ کیلوگرم فسفر و ۴ کیلوگرم پتاس وجود دارد که با توجه به مقادیر کود دامی مصرف شده، باید مقدار عناصر مذکور را محاسبه و از مقادیر کودشیمیایی مورد نیاز کسر نمایید.

کود شیمیایی: با توجه به نیاز گیاه، دقت داشته باشید مصرف کود شیمیایی به مقدار آب، قدرت حاصلخیزی خاک و چگونگی اجرای عملیات زراعی بستگی دارد. لذا بهتر است برای

جدول ۲-۱

راندمان در هکتار بر حسب تن	برگ و طوفه ریشه	مقدار عناصر مختلف مورد نیاز/ کیلوگرم در هکتار					
		N	P ₂ O ₅	K ₂ O	NaO	CaO	MgO
۳۰	۲۷	۱۲۵	۴۶	۱۸۸	۸۰	۴۰	۴۶
۴۰	۳۶	۱۶۷	۶۱	۲۵۱	۱۰۶	۵۳	۶۱
۵۰	۴۶	۲۰۹	۷۶	۳۱۳	۱۳۳	۷۶	۶۷

تعیین مقدار کودهای مورد نیاز با کارشناسان مشورت نمایید.

مهمترین کودهای مورد نیاز چغندرقند و اثرات آن عبارتند از:

۱- کودهای ازته: در مصرف کودهای

ازته توجه داشته باشید که این گیاه در $\frac{1}{3}$ آخر

دوره رشد خود نیاز به ازت ندارد و حتی استفاده از این کود موجب کاهش قند می‌شود.

ازت را به نسبت ۱۵٪ تا ۲۰٪ کیلوگرم به طور متوسط مصرف کنید اما در صورت

وجود آزمایش خاک به توصیه جدول ۲-۲ عمل نمایید. قسمتی از کود ازته را در موقع

کاشت در زمین پخش نموده، در عمق ۵ تا ۶ سانتیمتری زیرخاک نمایید و باقیمانده را به صورت سرک در ۲ تا ۳ مرحله در موقع

وجین و تنک کردن به کار ببرید.

علاجم کمبود ازت را می‌توانید به صورت رنگ سبز روشن همراه با کوچک و باریک ماندن برگها مشاهده نمایید. (با کمک و راهنمایی مریان)

۲- کود فسفره: کود فسفره مورد نیاز را براساس جدول

۲-۳ (با کمک مریان) تعیین و این کود را قبل از کاشت و همراه با شخم پاییزه با استفاده از ماشین کودپاش مصرف نمایید (شکل ۲-۹).

چغندرقند در اوایل رشد، به فسفر زیادی نیاز ندارد اما

این نیاز پس از ۲ ماه از رشد زیاد خواهد شد.

جدول ۲-۳- توصیه کود فسفره برای چغندرقند براساس تجزیه خاک

مقدار سوپر فسفات تریپل کیلوگرم در هکتار	مقدار فسفر قابل جذب میلیگرم در کیلوگرم خاک	طبقه خاک از نظر مقدار فسفر	ردیف
۱۵٪	کمتر از ۵	خیلی ضعیف	۱
۱۰٪	۵-۹	ضعیف	۲
۵٪	۱۰-۱۵	متوسط	۳
صفرا	بیشتر از ۱۵	خوب	۴



شکل ۲-۹- ماشین کودپاش

علایم کمبود فسفر را (با راهنمایی مریبان) می‌توانید به صورت رنگ سبز تیره در برگها مشاهده کنید.

۳- کود پتانس: پناس، تأثیر سودمندی بر روی محتويات

جدول ۲-۴- توصیه کود پتابیم برای چغندرقند براساس تجزیه خاک

مقدار کود سولفات پتابیم (kg/ha)	پتابیم قابل جذب (میلیگرم در کیلوگرم خاک)	طبقه خاک از نظر مقدار پتابیم	ردیف
۲۰۰	کمتر از ۲۰۰	ضعیف	۱
۱۰۰	۲۰۰-۳۰۰	متوسط	۲
۵۰	۳۰۱-۴۰۰	خوب	۳
۰	۴۰۱-۵۰۰	زیاد	۴

قند گیاه دارد و در عمل کربن‌گیری و ذخیره قند بسیار مؤثر است. کود مورد نیاز را بر اساس جدول ۲-۴ و به کمک مریبان، تعیین و همزمان با کود فسفره، آن را در خاک به کار ببرید.


توجه داشته باشید که

افزودن پتانس بیش از مقدار لازم، برای گیاه مضر است و در متبلور شدن قند در کارخانه ایجاد اختلال می‌نماید.

علایم کمبود پتانس را می‌توانید با ظاهر شدن لکه‌های سفید مایل به زرد یا روشن در لبه و نوک برگها و سوختگی به شکل لکه‌های قهوه‌ای (با کمک مریبان) تشخیص دهید.

۴- استفاده از کود مرکب: برای صرفه‌جویی و سهولت در پخش می‌توانید از کود مرکب به جای کود ساده استفاده کنید در زراعت چغندرقند N-P-K-۱/۸-۳-۱ تهیه و مورد استفاده قرار دهید (شکل ۲-۱۰).

در مواقعي که امکان پخش کود به صورت ماشین وجود ندارد کود را به شیوه دستپاش در زمین پخش کنید و با عملیات بعدی آن را زیر خاک و مخلوط نمایید. این روش دارای معایب است حداقل چهار مورد آن را ذکر کنید (شکل ۲-۱۱).



شکل ۲-۱۰- نمونه‌ای از کود مرکب مورد نظر که زارعین می‌توانند این کود را قبل از کافت با دستگاه کودپاش در سطح زمین پخش و سپس با شخم زیر خاک نمایند و یا بهتر است با کودکار زیر بذر قرار دهند.



شکل ۲-۱۱- مصرف کود به شیوه دستپاش



شکل ۱۲-۲- پخش علفکش با استفاده از سمپاش تراکتوری

مبارزه با علفهای هرز قبل از کاشت: برای مبارزه مکانیکی با علفهای هرز قبل از کاشت، از دو بار کولتیواتور زدن به صورت عمود بر هم استفاده نمایید. در مبارزه شیمیایی با علفهای هرز قبل یا همزمان با کاشت می‌توانید با توصیه کارشناسان و نظارت آنها از علف کش پیرامین استفاده کنید. علف کش را در زمین پخش نموده، به وسیله دیسک کاملاً با خاک مخلوط نمایید. علف کش را به صورت محلول نیز می‌توانید مورد استفاده قرار دهید. توجه داشته باشید از آنجا که چغندرقند گیاهی وجینی است در صورت تراکم علفهای هرز قبل از کاشت حتماً برای مبارزه و از بین بردن آنها از علف کش استفاده نمایید.

کار عملی

- ۱- هر ۴ تا ۵ نفر یک بُنه آموزشی به نسبت ۱۰۰۰ متر مربع زمین به ازای هر نفر تشکیل دهید.
- ۲- کودهای مورد نیاز را به مقدار مورد نیاز بُنه محاسبه، برآورده و تهیه نمایید.
- ۳- علف کش مورد نیاز بُنه را محاسبه، برآورده و تهیه کنید.
- ۴- وسایل مورد نیاز از قبیل تراکتور، گاوآهن، دیسک، انواع هرس و کولتیواتور، سمپاش، ماله را تهیه و برای کار آماده کنید.
- ۵- مراحل تهیه زمین را بترتیب و شرح زیر انجام دهید.
 - ۱- انتخاب زمین و انجام عملیات قبل از شخم
 - ۲- پخش کود حیوانی
 - ۳- شخم عمیق در پاییز
 - ۴- شخم سطحی قبل از کاشت
 - ۵- مبارزه با علفهای هرز (شیمیایی - مکانیکی)
 - ۶- هموار کردن زمین و ماله کشی
 - ۷- پخش کود شیمیایی (در صورت استفاده از روش پخش درهم)

پیمانهٔ مهارتی: عملیات تهیه زمین چغندرقند شمارهٔ شناسایی: ۱۴-۱-۷۴/ک	مهارت: کشت چغندرقند شمارهٔ شناسایی: ۱۴-۱-۷۴/ک
--	--

آزمون پایانی

- ۱- خراش دادن زمین برای مخلوط کردن بقاوی‌گیاهی (کاه و کلش)، علفهای هرز با خاک از چه وسیله‌ای انجام می‌شود؟
- الف: گاوآهن ب: دیسک ج: لولر د: مرزبند
- ۲- در شرایط مناسب، نفوذ انتهای ریشه اصلی چغندرقند در خاک چه میزان است؟
- الف: ۱۰ سانتیمتر ب: ۲۵ سانتیمتر ج: ۱ متر د: ۲ متر
- ۳- عمق شخم پاییزه در زراعت چغندرقند بیشتر از سانتیمتر است و به وسیله انجام می‌شود.
- ۴- شخم مرحله دوم زمین چغندرقند در اواخر زمستان و قبل از کاشت به چه عمقی انجام می‌شود؟
- الف: سطحی ب: نیمه عمیق ج: عمیق د: خیلی عمیق
- ۵- در صورتی که خاک سطحی سفت و کم عمق باشد شخم در زراعت چغندرقند با چه وسیله‌ای انجام می‌شود؟
- الف: گاوآهن برگردان دار ب: گاوآهن بشقابی ج: دیسک د: سوساز
- ۶- کود حیوانی در چه موقعی در زراعت چغندرقند مورد استفاده قرار می‌گیرد؟
- الف: همراه شخم پاییزه ب: همراه شخم بهاره ج: موقع کاشت د: به عنوان سرک
- ۷- در هر تن کود ادامی به طور متوسط کیلوگرم ازت و کیلوگرم فسفر و کیلوگرم پتاس وجود دارد.
- ۸- نحوه استفاده از کود ازته را در زراعت چغندرقند توضیح دهید.
- ۹- میزان کود ازته مورد نیاز چغندرقند به طور متوسط چه مقدار است؟
- الف: ۵۰ کیلوگرم ب: ۱۵۰ تا ۲۰۰ کیلوگرم ج: ۳۰۰ کیلوگرم د: ۴۰۰ تا ۵۰۰ کیلوگرم
- ۱۰- کدام کود در عمل کربن گیری و ذخیرهٔ قند چغندرقند بسیار مؤثر است؟
- الف: ازته ب: فسفره ج: پتاسه
- ۱۱- جهت کنترل علفهای هرز چغندرقند قبل از کاشت، از کدام علف‌کش استفاده می‌شود؟
- الف: توفوردی ب: گراماکسون ج: رانداب د: پیرامین
- ۱۲- مبارزه مکانیکی با علفهای هرز مزارع چغندرقند قبل از کاشت با چه وسیله‌ای و چگونه انجام می‌شود؟
- ۱۳- نحوه استفاده از کود مرکب در زراعت چغندرقند را بترتیب ذکر نمایید.
- ۱۴- مراحل تهیه زمین چغندرقند را بترتیب ذکر نمایید.
- ۱۵- علف‌کش مورد نیاز ۵/۰ هکتار زمین قبل از کاشت چه میزان است؟
- الف: ۱/۵ تا ۲/۵ کیلوگرم ب: ۳ تا ۵ ج: ۶ تا ۱۰ کیلوگرم د: ۷/۵ تا ۱۵ کیلوگرم

پیمانه مهارتی: کاشت چغندر قند

شماره شناسایی: ۱۴-۳-۷۴/ک

مهارت: کاشت چغندر قند

شماره شناسایی: ۱۴-۱-۷۴/ک

کاشت چغندر قند

هدف کلی

توانایی کاشت چغندر قند

هدفهای رفتاری: فرآگیر، پس از گذراندن این پیمانه مهارتی، باید بتواند:

- ۱- زمان کاشت چغندر قند را تعیین نماید.
- ۲- ماشینهای ردیفکار چغندر قند را سرویس نموده، آنها را برای کاشت تنظیم کند.
- ۳- بستر کاشت را بخوبی تهیه نماید.
- ۴- عملیات کاشت بذر را انجام دهد.

مهارت‌های مورد نیاز

مهارت عملیات کاشت

وسایل و تجهیزات مورد نیاز

تراکتور، ردیفکار، آچار و ابزار مورد نیاز، بیل، نهرکن

بذر و کود مورد نیاز

زمین آماده شده به ازای هر نفر هنرجو حداقل ۱۰۰۰ مترمربع

زمان به ساعت	
نظری	عملی
۱۵	۲

پیش آزمون

۱- خصوصیات بذر مرغوب چیست؟

۲- ارزش مصرفی بذری را که درجه خلوص آن ۹۲ درصد و قوئه نامیه آن ۸۵ درصد است تعیین نمایید.

۳- هواکشت چه نوع زراعتی است؟

الف : خارج از فصل

ب : کشت بموقع

ج : کشت فاریاب

د : کشت دیم

۴- معایب بذرپاشی به روش دستی و درهم را شرح دهید.

۵- هیرمکاری چیست؟

الف : کشت بذر پس از آبیاری

ب : خشکه کاری

ج : کشت علوفه همراه بذر

۶- بهاره کردن چیست و به چه منظوری انجام می‌شود؟

۷- عوامل مؤثر در میزان بذر مصرفی را نام ببرید.

۸- عوامل مؤثر در تعیین زمان کاشت را نام ببرید.

۹- عمق کاشت بذر به چه عواملی بستگی دارد؟ حداقل ۴ مورد را ذکر نمایید.

۱۰- مزایای کاشت به صورت نشاکاری را توضیح دهید.

۱۱- روشهای کاشت بذور را نام ببرید.



۳—کاشت چغندر قند



شکل ۱—کاشت چغندر قند

تعیین زمان کاشت چغندر قند

به دلیل گستردگی مناطق کاشت و تنوع اقلیمی، کاشت چغندر قند در نقاط مختلف کشور در دو فصل انجام می‌شود:

۱—کاشت در بهار: اگر محل کاشت مناطقی است که دارای سرمای زمستانه و یخندهان هستند مثل استانهای خراسان، فارس، کرمان و ... کشت چغندر قند را در فصل بهار انجام دهید (شکل ۳-۱).

۲—کاشت پاییزه: اگر محل کاشت در مناطق گرمسیری مثل خوزستان واقع است کشت را به صورت پاییزه از اواسط شهریور تا اواسط آبان انجام دهید.

در تعیین زمان کاشت چغندر قند موارد زیر را مدقن نظر داشته باشید.

۱—در مناطق گرمسیر کاشت را به گونه‌ای انجام دهید که قبل از فرا رسیدن فصل گرمای تابستان ریشه گیاه برای برداشت آماده باشد.

۲—در مناطق سرد و معتدل بلا فاصله پس از سپری شدن خطر سرما، یخندهان و بارش برف در زمانی که درجه حرارت محیط کمتر از ۴ درجه سانتیگراد نباشد کاشت را انجام دهید.

۳—کشت را به تأخیر نیندازید زیرا ہوا کشت (کشت اول فصل) موجب بالا رفتن میزان محصول و افزایش درصد قند به دلیل طولانی شدن دوره رشد می‌شود. از طرفی با ہوا کشت قبل از بروز آفات و بیماریها گیاه رشد کافی نموده، مقاومت بیشتری برای مقابله با آنها خواهد داشت.

برای آشنایی بیشتر با فصل کاشت چغندر قند در مناطق مختلف کشور به جدول ۱-۳ مراجعه نمایید.

پیمانهٔ مهارتی: کاشت چغندر قند شمارهٔ شناسایی: ۱۴-۱-۷۴/ک	مهارت: کشت چغندر قند شمارهٔ شناسایی: ۱۴-۱-۷۴/ک
---	---

جدول ۱-۳- جدول زمانی کاشت چغندر قند در نقاط مختلف کشور (از کتاب زراعت گیاهان صنعتی)

استان	مناطق کاشت	مناسبت‌ترین زمان کاشت
آذربایجان	اشنویه	از حدود اواسط فروردین تا اواسط اردیبهشت.
	ارومیه (رضایه)	از حدود اوایل تا اواخر فروردین.
	بوکان	از حدود اواسط فروردین تا اواسط اردیبهشت.
	پیرانشهر	از حدود اواسط فروردین تا اواسط اردیبهشت.
	خوی	از حدود اوایل تا بیستم فروردین.
	شاهپور	از حدود اوایل تا بیستم فروردین.
	نقده	از حدود اوایل تا اواسط فروردین.
	میاندوآب	از حدود اوایل تا بیستم فروردین.
	مهاباد	از حدود اوایل تا بیستم فروردین.
	اصفهان (سردییر)	از حدود اوایل تا اواخر فروردین.
اصفهان	اصفهان (معتدل)	از حدود اوایل بهمن تا اواخر اسفند.
	شهرضا	از حدود اوایل بهمن تا اواخر اسفند.
	کوهنگ	از حدود اوایل تا اواخر فروردین.
	گلپایگان	از حدود اوایل تا اواخر فروردین.
	ایوان و سایر مناطق	از حدود اواسط اسفند تا اواسط فروردین.
کرمانشاه	اسلام آباد (شاهآباد غرب معتدل)	از حدود اوایل اسفند تا اواخر فروردین.
	اسلام آباد (گرسیر)	از حدود اوایل تا اواخر فروردین.
	کرمانشاه	از حدود اواسط اسفند تا اواخر فروردین.
	پاوه (معتدل)	از حدود اوایل اسفند تا اواخر فروردین.
	سنقر و کلیائی	از حدود اوایل تا اواخر فروردین.
تهران	قصر شیرین	از حدود اوایل اسفند تا اواخر فروردین.
	کرج و حومه	از حدود اواسط اسفند تا اواسط فروردین.
	بروجن	از حدود اوایل تا اواخر فروردین.
چهار محال و بختیاری	شهر کرد	از حدود اوایل تا اواخر فروردین.
	بنجورد	از حدود اوایل تا اواخر اسفند.
	بیرونجند	از حدود اوایل تا اواخر اسفند.
خراسان	تربت جام	از حدود اوایل تا اواخر اسفند.
	تربت حیدریه	از حدود اوایل اسفند تا اواخر فروردین.
	چناران	از حدود اواسط اسفند تا اواخر فروردین.
	سیزوار	از حدود اوایل اسفند تا اواخر فروردین.

پیمانه مهارتی: کاشت چغندرقند شماره شناسایی: ۱۴-۳-۷۴/ک	مهارت: کشت چغندرقند شماره شناسایی: ۱۴-۱-۷۴/ک
--	---

از حدود اوایل اسفند تا اواسط فروردین. از حدود اواسط اسفند تا اواخر فروردین. از حدود اوایل تا اوخر اسفند. از حدود اوایل تا اواخر اسفند. از حدود اوایل اسفند تا اواخر فروردین. از حدود اوایل اسفند تا اواسط فروردین.	شیروان فریمان قوچان کاشمر مشهد نیشابور
از حدود اواسط شهریور تا اواخر مهر. از حدود اواسط شهریور تا اواخر مهر. از حدود اواسط شهریور تا اوخر مهر و اوایل آبان. از حدود اواسط شهریور تا اواخر مهر.	اهواز حسینآباد دزفول شوشتر
از حدود اوایل تا اوخر فروردین.	زنجان
از حدود اوایل تا اوخر فروردین. از حدود اواسط اسفند تا اواسط فروردین.	سمنان شاهroud
از حدود اوایل اسفند تا اوایل اردیبهشت. از حدود اوایل اسفند تا اوایل فروردین. از حدود اوایل اسفند تا اوایل فروردین. از حدود اواسط اسفند تا اوایل فروردین. از حدود اواسط اسفند تا اوایل فروردین. از حدود اواسط اسفند تا اوایل فروردین.	آباده اقلید فسا فیروزآباد کازرون (گرم) کازرون (معتدل)
از حدود اوایل اسفند تا اوایل فروردین. از حدود اوایل اسفند تا اوایل فروردین.	فارس
از حدود اوایل اسفند تا اوایل فروردین. از حدود اوایل اسفند تا اوایل فروردین.	کووار مرودشت ممسنی نیریز یاسوج
از حدود اوایل تا اوخر فروردین. از حدود اوایل تا اوخر فروردین. از حدود اوایل تا بیستم فروردین.	کرستان سقز مریوان
از حدود اوایل اسفند تا اوایل فروردین. از حدود اواسط اسفند تا اواخر فروردین. از حدود اوایل بهمن تا اوایل فروردین.	کرمان سیرجان کرمان
از حدود اواسط اسفند تا اواخر فروردین. از حدود اوایل اسفند تا اواخر فروردین.	لرستان خرمآباد
از حدود اوایل فروردین تا اواسط اردیبهشت.	مرکزی اراک و حومه

پیمانهٔ مهارتی: کاشت چغندر قند شمارهٔ شناسایی: ۳-۱۴-۱/ک	مهارت: کشت چغندر قند شمارهٔ شناسایی: ۱-۱۴-۷۴/ک
--	---

از حدود اواسط فروردین تا اواسط اردیبهشت.	توضیرکان
از حدود اوایل تا اواخر فروردین.	ملایر
از حدود اواسط فروردین تا اواسط اردیبهشت.	نهادن
از حدود دهه اول فروردین تا اواسط اردیبهشت.	همدان

تهیه و آماده‌سازی بذر

یکی از مهمترین عوامل موقیت در زراعت چغندر قند، استفاده از بذر مناسب است. در انتخاب بذر ابتدا رقم مناسب را با توجه به سازگاری، عملکرد، مقاومت در مقابل آفات و بیماریها و شرایط محیطی، زودرسی و دیررسی مشخص نمایید. در تهیه بذر به استاندارد و کیفیت و نحوه عرضه توجه داشته باشید. در جدول ۲-۲ ویژگی‌های بذر چغندر قند و حدود استاندارد آن براساس قوانین انجمن بین‌المللی گواهی بذر مشخص گردیده است. در جدول ۲-۳ با مشخصات انواع بذرها چغندر قند آشنا می‌شوید.

برای بررسی کیفیت بذر تهیه شده عملیات زیر را انجام دهید.

۱- خلوص بذر را در آزمایشگاه تعیین نمایید.

۲- قوه نامیه بذر را تعیین کنید.

۳- رنگ بذر را کنترل کنید تا حالت طبیعی داشته باشد (رنگ سبز نشانه نارس بودن و رنگ تیره نشانه کهنگی بذر است).

جدول ۲-۳- ویژگی‌های بذر چغندر قند و حدود استاندارد آن براساس قانون انجمن بین‌المللی گواهی بذر (ISTA)

ردیف	خصوصیات	میزان مجاز	
		بذر تک جوانه	بذر چند جوانه
۱	خلوص بذر	حداقل ۹۸ درصد	حداقل ۹۸ درصد
۲	خلوص رقم	حداقل ۹۸ درصد	حداقل ۹۸ درصد
۳	میزان رطوبت	حداکثر ۹ درصد	حداکثر ۹ درصد
۴	قوه نامیه	حداقل ۸۰ درصد	حداقل ۹۰ درصد
۵	قطر	۳/۵ تا ۴/۵ میلیمتر	۳/۵ تا ۴/۵ میلیمتر
۶	ضخامت بذر	۲/۲ تا ۳/۲ میلیمتر	-

جدول ۳-۳- مشخصات انواع بذرهای چغندر قند

نوع بذر	اندازه بذر (میلیتر)	حداصل	سرعت جواندزی	وزن هزار دانه	میزان یکمو اختشی	میزان تنتک	ترکیب توده از نظر تعداد جوانه بر حسب درصد	میزان مصرف در هکتار (کیلوگرم)
منوردم ریشه‌کی	۳/۵ - ۴/۵	قطر ۵/۵ - ۶/۵	نامیده٪	گرم	سپز	زمین	تک جوانه	دو جوانه
منوردم ضخامت ریشه‌کی	۲/۴ - ۴	قطر ۴/۵ - ۵/۵	۹۰	زیاد	بسیار	کشت	در مرعده	بلی زردم
منوردم ضخامت تکیه‌کی	۸۵	قطر ۴/۵ - ۵/۵	۱۳ - ۱۵	کم	علی	علی	-	-
مولی زردم معمولی	۳/۵ - ۴	قطر ۶ - ۷	۳۰ - ۴۰	۶۰ - ۷۰	مطلوب	مطلوب	متوسط	متوسط
مولی زردم کالبیره زریز	۸۵	قطر ۴/۵ - ۵/۵	۴۵ - ۵۰	۳۵ - ۴۰	مطلوب	علی	زیاد	-
								۸۱ - ۸۰

پیمانهٔ مهارتی: کاشت چغندر قند شمارهٔ شناسایی: ۳-۱۴-۱-۷۴/ک	مهارت: کشت چغندر قند شمارهٔ شناسایی: ۱-۱۴-۱-۷۴/ک
---	---

در انتخاب بذر به شرایط و سازگاری و معایب و محدودیتهای انواع بذر چغندر قند توجه داشته باشد و براساس شرایط آماده‌سازی زمین و نحوه کشت، بذر مناسب را انتخاب و مورد استفاده قرار دهید. مهمترین خصوصیات و محسن و معایب و کاربرد انواع بذر چغندر قند عبارت است از:

۱- بذر چند جوانه‌ای معمولی: این بذر را در زمینهای که دارای خاک سنگین است و یا تهیه زمین را در آن بخوبی انجام نداده اید به کار ببرید. با استفاده از این بذر امکان دست یابی به تراکم مناسب بوده وجود دارد اماً به طور کلی، با استفاده از این نوع بذر با معایب زیر مواجه می‌شوید:

الف - بوتهای اضافی را باید در سطحی وسیع با تنک کردن حذف نمایید. در اثر تنک کردن بی‌رویه احتمال آسیب دیدن جوانه اصلی وجود دارد.

ب - به دلیل یکنواخت نبودن اندازه بذور، کاشت با دیسک ردیفکار مناسب نیست زیرا عبور بذور از صفحات تقسیم با مشکل رویه‌رو می‌شود و سبز شدن بذور نیز به دلیل تفاوت در اندازه یکنواخت نخواهد بود.

۲- بذر چند جوانه‌ای درجه‌بندی شده: با استفاده از این بذر مشکلات عدم یکنواختی در کاشت و استفاده از دستگاه ردیفکار را نخواهید داشت اماً با مشکل عمدۀ در تنک کردن و حذف بوتهای اضافی کماکان مواجه هستید.

۳- بذر تنک جوانه‌ای مکانیکی: به دلیل صدمات زیاد جوانه‌ها در زمان برش، حتی‌امکان از این بذر کمتر استفاده نمایید.

۴- بذر تنک جوانه‌ای تکنیکی: در شرایطی که امکانات کشت مکانیزه را در اختیار دارید ولی خاک مزرعه دارای بافت نسبتاً سنگین است و نیز تهیه رطوبت کافی برای جوانه زدن مشکل است می‌توانید از این بذر استفاده کنید. اماً این نوع بذرها نیز به دلیل همراه داشتن ۳۰ درصد بذر دو جوانه‌ای، تا حدودی مشکل تنک کردن را خواهند داشت.

مهارت: کشت چغندر قند

شماره شناسایی: ۱۴-۱-۷۴/ک

پیمانه مهارتی: کاشت چغندر قند

شماره شناسایی: ۳-۱۴-۱-۷۴/ک

۵- بذر تک جوانه‌زننده‌کی: با استفاده از این بذر و کاشت مکانیزه آن، امکان حذف کامل عملیات تنک را در اختیار دارید چون بوته اضافی تولید نمی‌شود تا نیازی به انجام عملیات پرهزینه تنک کردن داشته باشد.

برای سهولت بیشتر در عملیات کشت بذر خصوصاً در کشت مکانیزه و با استفاده از ردیفکار و همچنین حفاظت بذر در خاک، بهتر است از بذور پوشش دار استفاده نماید.

طرز تهیه و مزایای بذور پوشش دار چغندر قند
بذر منوزرم (تنک جوانه‌ای) پوشش دار: حتی الامکان و به عنوان روش برتر برای کاشت، از بذر تک جوانه‌ای پوشش دار استفاده کنید (شکل ۲-۳).

مزایای بذر پوشش دار:

۱- بذور یک اندازه و به قطر $4/25$ میلیمتر تهیه می‌شوند و حداکثر ضخامت ماده پوشش دهنده بذر $1/4$ میلیمتر است. از این رو، سهولت می‌توانید از این بذر در کشت مکانیزه استفاده کنید.

۲- ماده پوششی، ضمن حفاظت اولیه بذر پس از جذب رطوبت حل شده، از بین می‌رود و جوانه نیز بسهولت از بذر خارج می‌گردد و هیچ گونه خطر و عوارضی برای گیاه به همراه ندارد.

۳- با آغشته بودن ماده پوششی به سموم ضد عفونی و حشره‌کش، بذور از خطر آفات و بیماریها محفوظ است. توجه داشته باشید بذور چند جوانه‌ای نیز می‌توانند به صورت پوشش دار تهیه و عرضه شوند.

طرز تهیه بذر پوشش دار: برای تهیه بذر پوشش دار با استفاده از دستگاههای مخصوص، بذرها را در لایه‌ای از مواد مختلف مورد نظر از جمله حشره‌کشها و قارچ کشها، مواد غذایی و مواد بی‌اثر در داخل دستگاه قرار داده، آنها را به صورت کروی و یک شکل و اندازه درمی‌آورند و در نهایت به رنگ مشخص هر کارخانه ارائه می‌دهند.



شکل ۲-۳- بذر منوزرم پوشش دار

پیمانهٔ مهارتی: کاشت چغندر قند شمارهٔ شناسایی: ۱۴-۱-۷۴/ک	مهارت: کاشت چغندر قند شمارهٔ شناسایی: ۱-۱۴-۷۴/ک
---	--

مقدار بذر

مقدار بذر مورد نیاز در روش‌های مختلف کاشت، متفاوت است. در زراعت درهم حدود ۲۰ تا ۲۵ کیلوگرم و در زراعت ردیفی ۸ تا ۱۲ کیلوگرم بذر در هر هکتار نیاز دارد. در صورت استفاده از بذرهای تک جوانه، میزان بذر مورد نیاز شما، ۵ تا ۱۰ کیلوگرم است.

کار عملی

میزان بذر مورد نیاز را با توجه به مساحت بنه و نوع بذر تعیین و با توجه به شرایط مزرعه آن را از مناسبترین نوع تهیه نمایید.

ضد عفونی بذر

در صورت استفاده از بذور بدون پوشش، نسبت به ضدعفونی بذر اقدام کنید. برای کنترل و پیشگیری از بیماریها از سومومی مثل سرزان پ، تری تیزان یا سوموم مشابه، به نسبت ۲۰۰ تا ۵۰۰ گرم سم برای هر ۱۰۰ کیلوگرم بذر استفاده نمایید. با استفاده از بشکه‌های ضدعفونی، بذور را با سم آغشته کنید (برای کنترل خسارت حشرات و حیوانات از توصیه کارشناسان برای تهیه سوموم مناسب ضد عفونی استفاده کنید).

کار عملی

براساس مقدار بذر تهیه شده برای بنه، سم ضدعفونی مورد نیاز را (با کمک مریبان) برآورده و تهیه نمایید و سپس با استفاده از بشکه‌های ضدعفونی، عملیات آغشته کردن بذر به سم را انجام دهید.

عمق کاشت بذر چغندر قند

عمق کاشت بذر را در زراعت چغندر قند بر حسب عوامل مختلف ۳ تا ۵ سانتیمتر در نظر بگیرید. در تعیین عمق کاشت به موارد زیر توجه داشته باشید.

پیمانه مهارتی: کاشت چغندرقند

شماره شناسایی: ۱۴-۳-۷۴/ک

مهارت: کشت چغندرقند

شماره شناسایی: ۱۴-۱-۷۴/ک

۱- در صورت استفاده از علف کشها در سطح خاک، بذر را عمیقتر کشت نمایید.

۲- در خاکهای سنگین، بذر را در عمق ۳ تا ۴ سانتیمتر و در خاکهای سبک در عمق ۴ تا ۵ سانتیمتر کشت کنید.

۳- عمق کاشت را در بذور معمولی (چند جوانه) بیشتر و در بذر منوژرم (تک جوانه) کمتر در نظر بگیرید.

روشهای کاشت

کاشت بذر چغندرقند به دو روش مستقیم و غیرمستقیم (تهیه خزانه) انجام می‌شود. روش مستقیم کاشت، خود به دو طریق درهم و ردیفی تقسیم می‌گردد.

کار عملی

برای هزینه آموزشی یکی از روشهای کاشت را انتخاب نموده، پس از برآورده بذر مورد نیاز و تأمین امکانات مناسب با وسعت بنه، نسبت به انجام عملیات کاشت اقدام نمایید.

کشت به روش درهم:

۱- در این روش به صورت دستی (شکل ۳-۳) و یا با استفاده از ماشین مثل کودپاش سانتریفیوژ، سعی کنید بذر را به صورت یکنواخت در زمین پخش نمایید.

۲- سپس آن را به وسیله دیسک یا کولتیواتور همراه با مائرسیک زیر خاک کنید.

۳- کاشت را می‌توانید داخل کرت انجام دهید.

۴- در زراعت باران مصنوعی (آبیاری تحت فشار) نیاز به ایجاد کرت و انهر آبیاری ندارید.

۵- در کشت فاروئی (جویچه) که مناسبتر از روش کرتی است، پس از بذرپاشی فارو و انهر آبیاری را ایجاد نمایید.

توجه داشته باشید روش کشت درهم معایبی دارد. برخی

از این معایب عبارتند از :

۱- افزایش میزان بذر ۳ تا ۴ برابر نیاز واقعی



شکل ۳-۳- بذرافشانی با دست

پیمانهٔ مهارتی: کاشت چغندر قند

شمارهٔ شناسایی: ۱۴-۱-۷۴/ک

مهارت: کشت چغندر قند

شمارهٔ شناسایی: ۱۴-۱-۷۴/ک

- ۲- یکنواخت نبودن عمق کاشت و تراکم بوته
- ۳- افزایش هزینهٔ تنگ کردن
- ۴- ایجاد مشکل برای عملیات مکانیزهٔ بعدی
- ۵- سایر عوامل (این عوامل را در حین اجرا و ادامهٔ عملیات، بررسی و تعیین نمایید).

روش کاشت ردیفی (ماشینی): این شیوه، روش مناسب و مطلوب کاشت بشمار می‌آید و به دلیل یکنواختی در کاشت، سرعت عمل بیشتر، امکان اجرای عملیات مکانیزه در مراحل بعدی و ... از بازدهی بهتری نسبت به روش درهم برخوردار است دقت نمایید برای کاشت با این روش زمین هموار و مسطح باشد.

۱- در این روش، به ردیفکار ۴ تا ۶ ردیفه نیاز دارد. پس از تهیهٔ ردیفکار و تراکتور ابتدا نسبت به تنظیم دستگاه اقدام کنید (شکل ۳-۴).

۲- تراکم کاشت را در خاکهای قوی و با وجود آب لازم ۸۰ تا ۱۰۰ هزار، در خاکها و امکانات متوسط ۷۵ تا ۸۰ هزار و در خاکهای ضعیف و مناطق خشک ۵۰ تا ۶۰ هزار در هر هکتار در نظر بگیرید و فواصل را بر این اساس تنظیم نمایید.

۳- برای تنظیم ردیفکار مخازن که روی شاسی سوار هستند، تیغه‌های فاروئر را باز کردن پیچها و جابجایی در فاصلهٔ مناسب (۵۰ تا ۶۰ سانتیمتر) تنظیم و پیچها را سفت کنید.

۴- در صورتی که دستگاه به صورت توأم می‌تواند کود را پخش نماید، ردیفهای کودپاش را نیز تنظیم نمایید.

۵- سپس موزع مخصوص چغندر قند را در داخل مخزن قرار دهید.

۶- لوله‌های سقوط بذر و شیار بازکنها را بررسی و کنترل کنید.

۷- بذر و کود مورد نیاز را متناسب با وسعت بنه برآورد و داخل مخازن ریخته، فاصله کاشت بذر را روی خطوط حدود ۲۰ سانتیمتر تنظیم کنید.



شکل ۳-۴

۸- پس از تنظیم عمق کاشت، ضمن حرکت دادن تراکتور با سرعت مناسب عملیات کاشت را شروع نمایید.

۹- همزمان، بستر آبیاری را به صورت فارو (جویچه) در بین خطوط کاشت ایجاد نمایید.

۱۰- نحوه باز کردن شیار، قرار گرفتن بذر و کود در عمق و فواصل معین، خاک دادن روی بذر، ایجاد فارو را در تمامی خطوط کاشت کنترل کنید.

کاشت در اراضی سور:

۱- در اراضی سور کشت را روی خطوط انجام ندهید.

۲- در این اراضی فاصله مخزن بذرپاش را ۵ تا ۱۰ سانتیمتر از فارو تنظیم نمایید، به طوری که خط کاشت درست در لبه کناری جوی آبیاری قرار گیرد. در این صورت، فاصله خط کاشت از داغ آب پسته‌ها ۵ سانتیمتر خواهد شد (شکل ۳-۵).

۳- مقدار بذر را $1/5$ برابر اراضی معمولی در نظر بگیرید. روش نشاکاری: این روش، از روش‌های موفق و جدید کاشت چغندرقند به شمار می‌آید که موجب صرفه‌جویی قابل توجهی در مصرف آب و هزینه‌های کنترل آفات و امراض، تنک کردن و ... می‌باشد.

مزایای روش نشاکاری:

۱- صرفه‌جویی در مصرف بذر به طوری که یک کیلوگرم بذر برای یک هکتار کاشت چغندرقند کافی است.

۲- صرفه‌جویی در مصرف آب، به طوری که ۳ مرحله آبیاری مربوط به اوایل کاشت چغندرقند حذف می‌شود و یا به عبارت دیگر، به ۳ مرحله آبیاری کمتر از حد معمول، نیاز دارید و کشت در زمین اصلی را می‌توانید بعد از قطع آبیاری غلات (مثل جو) انجام دهید.

۳- کاهش هزینه کنترل آفات، بیماریها و علفهای هرز.

۴- بینیازی از عملیات تنک کردن.

۵- سهولت در واکاری.

۶- فواصل بوته‌ها کاملاً یکسان است بنابراین برای رسیدن به آب و موادغذایی رقابت نمی‌کنند.



شکل ۳-۵- نحوه تنظیم بذرافشان تراکتوری در اراضی سور

۷- چون گیاه رشد اولیه خود را در خزانه انجام می‌دهد دوران زندگی آنها در زمین اصلی کوتاهتر بوده، همچنین بوته‌های جوان از سرمای اوایل بهار آسیب نخواهند دید.

هرچند کلیه مزایای نشاکاری چغندرقند مهم و قابل توجه می‌باشد اماً صرفه‌جویی در مصرف آب به حدی در کشور ما اهمیت دارد که در صورت رایج شدن این روش قطعاً تحول عظیمی در رعایت اقتصاد آب و رقابت زراعت غلات و چغندرقند برای استفاده از آب در فصل بهار و برطرف شدن خسارت ناشی از کمبود آب برای هر دو زراعت ایجاد خواهد شد و این وضعیت مطلوب می‌تواند موجبات رونق و توسعه کشت چغندرقند را در کشور فراهم نماید. کاشت به روش نشا، در سایر کشورها رایج است اماً در ایران به دلیل نیاز به سرمایه‌گذاری و آموزش کافی، تاکنون در سطح وسیع انجام نشده است اماً در کشت‌های آزمایشی از موفقیت بیشتری نسبت به کشت مستقیم برخوردار بوده است.

به این مقایسه در نمودار ۶-۳ توجه نمایید.

تن در هکتار




شکل ۶-۳- مقایسه وزن ریشه در کاشت نشاپی و مستقیم چغندرقند به منظور کاشت دوم بعد از آبگیری از جو

وسایل و مواد مورد نیاز برای کاشت یک هکتار زمین

- ۱- تهیه مخلوطی از ماسه بادی، خاک زراعی، کود گوسفندی به نسبت یک قسمت ماسه بادی + یک قسمت کود گوسفندی کاملاً پوسیده + پنج قسمت خاک زراعی (حدود ۳ تن خاک زراعی نرم با دانه‌بندی کمتر از ۵ میلیمتر). (میزان ماسه بادی و کود گوسفندی را محاسبه و تهیه نمایید).
 - ۲- کود نیترات آمونیم ۲/۵ کیلوگرم و سوپرفسفات ۳ کیلوگرم
 - ۳- بذر تک جوانه ۱ کیلوگرم
 - ۴- فضای گلخانه ۲۵ ° تا ۴۰ ° مترمربع
 - ۵- گلدان کاغذی ۹۰ هزار
- براساس وسعت بنه و یا زمین مورد کشت وسایل و مواد مورد نیاز را برآورد و تهیه نماید.




شکل ۳-۷- آماده‌سازی گلدان کاغذی برای کاشت نشا



شکل ۳-۸- گلدانهای کاغذی در خزانه با بذور کشت شده داخل آنها

عملیات کاشت

- ۱- پس از تهیه فضای گلخانه به صورت بسته یا زیر پلاستیک خاک گلدان را به نسبت اعلام شده از اختلاط خاک، کود گوسفندی و شیمیابی ذکر شده و ماسه تهیه نماید.
- ۲- گلدانهای کاغذی را مطابق شکل ۳-۷، در ردیفهای منظم آماده کنید و سپس گلدانها را از خاک مخلوط تهیه شده پر نموده، آنها را به طور منظم داخل فضای بسته یا زیر پلاستیک قرار دهید.
- ۳- بذر تک جوانه را در داخل گلدانها کشت کنید. (شکل ۳-۸) و با پارچه نازکی روی گلدانها را برای جلوگیری از حرکت بذر بپوشانید و آبیاری را انجام دهید.
- آبیاری را به صورت مداوم انجام دهید تا رطوبت به انتهای گلدانها نفوذ نماید.



شکل ۳-۹ - تهیه نشای چغندر قند



شکل ۳-۱۰ - نشاهای آماده برای انتقال به زمین



شکل ۳-۱۱ - کاشت نشاها با دست



شکل ۳-۱۲ - کاشت نشاها با ماشین نشاکار

۴- حفاظت، نگهداری و آبیاری نشا در گلخانه را بموقع انجام دهید. نشاهای ۴۰ تا ۴۵ روز پس از کاشت و در مرحله ۴ تا ۶ برگی آماده انتقال به زمین اصلی هستند. یک هفته قبل از کاشت در زمین اصلی نسبت به سازگاری نشا با محیط آزاد از طریق برداشتن پوشش پلاستیکی یا باز کردن پنجره‌های گلخانه اقدام نمایید (شکل ۳-۹).

۵- در زمین اصلی، پس از انجام مراحل تهیه زمین، جوی و پشتہ به فاصله ۵۰ تا ۶۰ سانتیمتر ایجاد نمایید.

۶- نهالهای آماده شده را با گلدان به مزرعه حمل کنید (شکل ۳-۱۰) و بوته‌ها را به صورت کاملاً قائم و در عمق مناسب به فاصله ۲۰ تا ۲۵ سانتیمتر به روش دستی (شکل ۳-۱۱) و یا با استفاده از ماشین نشاکار (شکل ۳-۱۲) روی ردیفها کشت نمایید. بلا فاصله پس از کاشت نشا، در زمین اصلی، آبیاری را در زمین انجام دهید.

پیمانه مهارتی: کاشت چغندر قند شماره شناسایی: ۱۴-۳-۷۴/ک	مهارت: کشت چغندر قند شماره شناسایی: ۱۴-۱-۷۴/ک
---	--

آزمون پایانی

- ۱- در مناطقی که دارای سرمای زمستانه هستند کشت چغندر قند در چه فصلی انجام می شود؟
- الف: بهار ب: تابستان ج: پاییز د: زمستان
- ۲- رنگ نشانه نارس بودن و رنگ نشانه ماندگی بذر چغندر قند است.
- ۳- کدام بذر برای کاشت چغندر قند مناسبتر است؟
- الف - بذر تک جوانه ب : بذر تک جوانه پوشش دار
 د : بذر چند جوانه درجه بندی شده ج : بذر چند جوانه معمولی
- ۴- بذور پوشش دار با چه قطری تهیه می شوند؟
- الف: ۱/۷۵ میلیمتر ب: ۲/۵ میلیمتر ج: ۴/۲۵ میلیمتر د: ۷/۵ میلیمتر
- ۵- برای ضد عفونی بذر چغندر قند از چه سمومی و به چه نسبتی استفاده می کنند؟
- ۶- عمق کاشت بذر چغندر قند چه میزان است؟
- الف: ۱ تا ۲ سانتیمتر ب: ۳ تا ۵ سانتیمتر ج: ۵ تا ۶ سانتیمتر د: ۸ سانتیمتر
- ۷- مقدار بذر مورد نیاز چغندر قند را در روش درهم و ردیفی بنویسید.
- ۸- معایب روش کاشت درهم را بنویسید.
- ۹- فواصل ردیفها در زراعت ماشینی چغندر قند چه میزان است؟
- الف: ۱۰ تا ۲۰ سانتیمتر ب: ۲۰ تا ۳۰ سانتیمتر ج: ۳۰ تا ۴۰ سانتیمتر
- ۱۰- در خاکهای قوی و با وجود آب کافی، تراکم کاشت چغندر قند چه میزان است؟
- الف: ۱۰ تا ۲۰ هزار بوته ب: ۴۰ تا ۵۰ هزار بوته ج: ۸۰ تا ۱۰۰ هزار بوته
- ۱۱- در خاکهای شور، نحوه تنظیم ردیفکار را توضیح دهید.
- ۱۲- در روش نشاکاری، نشاه را تا روز پس از کاشت بذر و در مرحله تا برگی به زمین اصلی منتقل می نمایند.
- ۱۳- صرفه جویی در مصرف آب در روش نشاکاری را توضیح دهید.
- ۱۴- در روش کاشت ردیفی در خطوط کاشت، کنترل چه مواردی را باید انجام دهید؟ فقط نام بیرید.
- ۱۵- در بررسی کیفیت بذر استاندارد، درصد رطوبت چه میزانی باید باشد؟
- الف: ۳ درصد ب: ۹ درصد ج: ۱۸ درصد

پیمانه مهارتی: عملیات داشت چغندرقند
شماره شناسایی: ۱۴-۱-۷۴/ک

مهارت: کشت چغندرقند
شماره شناسایی: ۱۴-۱-۷۴/ک

داشت چغندرقند

هدف کلی

توانایی مراقبت و نگهداری از زراعت چغندرقند

هدفهای رفتاری: فرآگیر پس از گذراندن این پیمانه مهارتی، باید بتواند :

- ۱- آبیاری را به نحو صحیح در زراعت چغندرقند انجام دهد.
- ۲- سله‌شکنی، تنک کردن و واکاری را در حد مطلوب انجام دهد.
- ۳- با آفات و بیماریها و علفهای هرز مبارزه کند.
- ۴- کود سرک مورد نیاز را در زراعت به کار برد.

مهارت‌های مورد نیاز

- ۱- مراقبتها ویژه داشت
- ۲- آبیاری
- ۳- کنترل آفات و امراض

وسایل، تجهیزات و امکانات مورد نیاز

تراکتور، نهرکن، کولتیواتور، بیل، فوکا، سمپاش، مشمع، کاش، کودپاش، تجهیزات حفظ نباتات، کود سرک ازته و کود مایع

زراعت: کشت شده در بنه‌ها به ازای هر نفر ۱۰۰۰ مترمربع

زمان به ساعت	
نظری	عملی
۱۰۰	۱۵/۵

پیش آزمون

- ۱- مدت آبیاری، در آبیاری باران مصنوعی به چه عواملی بستگی دارد؟
 - ۲- با رسم شکل، نحوه ورود آب به کرت به روشهای مختلف را شناس دهید.
 - ۳- سیفون را تعریف کرده، موارد استفاده از آن را بنویسید.
 - ۴- حداقل چهار مورد از روشهای انتشار ویروسهای گیاهی را بنویسید.
 - ۵- از روشهای کترل زراعی با آفات اثر شخم را شرح دهید.
 - ۶- سوم سیستمیک را همراه با یک مثال تعریف نمایید.
 - ۷- راههای انتشار علفهای هرز را نام ببرید.
 - ۸- دو اصطلاح دوره کارنس و ماده مؤثر را در سوم تعریف کنید.
 - ۹- علایم کمبود ازت را در گیاه ذکر نمایید.
 - ۱۰- تنک کردن چیست و به چه منظوری انجام می شود؟
 - ۱۱- سله چیست و چه معایبی دارد؟
 - ۱۲- کدام کود به عنوان سرک مورد استفاده می باشد؟
- الف : ازت ب : فسفر ج : پتاس
- ۱۳- خاکدهی در زراعت به چه منظوری انجام می شود؟
 - ۱۴- دبی چیست و حد مناسب آن در زراعت چه مقدار است؟

د : آهک



پیمانهٔ مهارتی: عملیات داشت چغندرقند

شمارهٔ شناسایی: ۷۴-۱-۱۴-۴/ک

مهارت: کشت چغندرقند

شمارهٔ شناسایی: ۱-۱۴-۷۴/ک

۴—عملیات داشت چغندرقند

توانایی عملیات داشت چغندرقند

پس از زیر خاک کردن بذر چغندرقند، عملیات کاشت خاتمه یافته است. پس از این مرحله تا موقع برداشت، مهمترین عملیات داشتی که باید در زراعت چغندرقند انجام شود شامل آبیاری، سله‌شکنی و خاک‌دادن، تنک کردن و واکاری، استفاده از کود سرک، کنترل علفهای هرز و آفات و بیماریهای است. انجام موقع و مناسب این عملیات باعث خواهد شد تا زراعت، با موفقیت و عملکرد خوبی همراه باشد.

آبیاری چغندرقند

مقدار آب مورد نیاز چغندرقند: توجه داشته باشید چغندرقند به دلیل طولانی بودن دوره رشد و نمو، دارا بودن برگهای پهن، بالا بودن شدت تنفس و تبخیر و تعرق از طریق برگها و فصوص فعالیت، به آب زیادی نیاز دارد. با توجه به شرایط آب و هوایی کشور در مناطق معتدل مثل همدان، اصفهان، آذربایجان، خراسان، کرج به ازای هر هکتار ۱۰ تا ۱۲ هزار متر مکعب و در مناطق گرمتر مثل فارس، کرمان، جنوب خراسان، سمنان به ازای هر هکتار به ۱۲ تا ۱۵ هزار متر مکعب آب برای زراعت چغندرقند نیاز دارد. **روشهای آبیاری:** با توجه به روش کاشت بذر، آبیاری را

به سه طریق زیر می‌توانید انجام دهید :

۱—آبیاری کرتی: در صورتی که بستر تهیه بذر را به صورت کرتی تهیه نموده‌اید طول و عرض کرت را با توجه به جنس و شیب زمین و مقدار آب، به صورت مناسب تعیین نمایید (شکل ۴-۱). در این روش تلفات آب زیاد است و به نیروی انسانی بیشتری نیاز دارد. عوارض روش کرتی برای زراعت چغندرقند شامل سفتی خاک، سله بستن خاک سطحی، ممانعت از بیرون آمدن جوانه‌ها، کند شدن رشد ریشه و همچنین افزایش حساسیت گیاه در برابر بیماریهای است.



شکل ۱-۴—آبیاری نواری (کرتی)



شکل ۲-۴- آبیاری نشتی

اگر شیب زمین کمتر از 5° درصد و نفوذپذیری خاک، متوسط می باشد از شکل توسعه یافته روش کرتی یعنی آبیاری نواری استفاده نمایید تا مشکلات کمتری برای مکانیزاسیون کشت داشته باشید.

۲- آبیاری نشتی (شیاری): در این روش که مناسبترین طریقه آبیاری ثقلی چغدرقند می باشد (شکل ۲-۴) لازم است همزمان با کاشت و یا بعد از آن، شیارهایی به عمق ۱۵ تا ۲۵ سانتیمتر بین خطوط کاشت ایجاد نمایید. طول شیارها را متناسب با جنس خاک و شیب زمین تعیین کنید.

در هر دو روش کرتی و شیاری، انهر آبیاری را برای آبرسانی ایجاد نمایید. در ابتدای زمین و در محلهایی که آب وارد کرت یا شیار می شود حداقل به یک نهر آبیاری و در انتهای زمین به یک نهر زه کش عمود بر خطوط کاشت نیاز دارد.

۳- آبیاری بارانی: در صورتی که امکانات آبیاری بارانی را در اختیار دارید (شکل ۳-۴) پس از کاشت و زیر خاک کردن بذر، نیاز به ایجاد انهر اصلی، فرعی، زه کش و شیار و کرت ندارید آب را به وسیله آپیشهایی که روی لوله تحت فشار قرار دارند به صورت بارانی در اختیار گیاه قرار دهید. تلفات آب در این روش کمتر از سایر روشهاست.



شکل ۳-۴- دستگاه آبیاری بارانی در مزرعه چغدر