



شکل ۴-۴- اولین آبیاری مزرعه چغندرقند به روش سیفونی

نظام آبیاری چغندرقند: پس از کاشت، اگر زمین تاحدی مرطوب باشد یک بار آبیاری برای جوانه‌زدن و سبزشدن زراعت کافی است (شکل ۴-۴) و در غیر این صورت، برای سبزشدن یکنواخت مزرعه به فاصله حدود ۷ روز، آبیاری مجدد را انجام دهید. توجه داشته باشید بذر چغندرقند به علت داشتن یک لایه پوشش سخت در هنگام جوانه‌زدن به آب زیاد و تقریباً ۲ برابر نیاز آبی سایر گیاهان در این مرحله نیاز دارد. برای خروج جوانه از خاک نیز حتماً باید سطح خاک مرطوب و عاری از سله باشد. در غیر این صورت، تعداد زیادی از جوانه‌ها خسارت می‌یابند.

پس از سبزشدن یکنواخت مزرعه در اوایل رشد و نمو، نیاز به آبیاری کمتری دارید ولی با گرم شدن هوای افزایش تعداد برگ این نیاز افزایش می‌باید. حداقل نیاز آبی در تابستان رخ می‌دهد. فواصل آبیاری علاوه بر نیاز گیاه به شرایط آب و هوایی و وضعیت خاک نیز بستگی دارد.

در اوایل فصل رشد، آبیاری را ۱۰ تا ۱۵ روز یک بار انجام دهید (شکل ۴-۵). در مناطق معتدل فاصله را بیشتر و در حد ۱۵ روز و در مناطق گرم و خشک ۱۰ تا ۱۲ روز یک بار انجام دهید. در تابستان فواصل آبیاری را کمتر و هر ۷ تا ۸ روز یک بار در نظر بگیرید. در اواخر دوره رشد مجدداً فاصله آبیاری را بیشتر و در حد اوایل دوره رشد انجام دهید.

زمان آبیاری را می‌توانید از شکل ظاهری برگ‌ها که در زمان تشنجی، رنگ سبز تیره به خود می‌گیرند یا اندازه گیری رطوبت خاک تعیین نمایید. در آبیاری توجه داشته باشید چغندرقند $\frac{2}{3}$ آب مورد نیاز خود را تا عمق ۴۰ سانتیمتری و بقیه را از اعماق بیشتر تأمین می‌کند. از این رو آبیاری را به گونه‌ای انجام دهید که تا عمق ۶۰ سانتیمتری مرطوب شود. در اوایل رشد چون عمق توسعه ریشه کمتر است مقدار آب را در آبیاری کمتر در نظر بگیرید. دقت کنید هر چه فاصله آبیاری کمتر باشد عملکرد بیشتری خواهد داشت اماً آبیاری خیلی زیاد نیز باعث می‌شود که مقدار درصد قند کمتر شده، مواد ازته زیان آور در گیاه افزایش یابد.



شکل ۴-۵- سبزشدن یکنواخت بذرها با دقت در کاشت و آبیاری صحیح حاصل می‌شود.

مهارت: کشت چغندرقند

شماره شناسایی: ۱۴-۷۴-۱

پیمانه مهارتی: عملیات داشت چغندرقند

شماره شناسایی: ۷۴-۱۴-۴



شکل ۴-۶- کشت در جنب داغ آب در اراضی شور



شکل ۴-۷- آبیاری سیفونی



شکل ۴-۸- آبیاری نشاء چغندرقند

آبیاری در خاکهای شور: در این اراضی، توصیه می‌شود از آب با دبی کم اما با مدت زمان آبیاری طولانی استفاده کنید تا قدرت نفوذ و صعود آب در خاک افزایش یابد. در کشت ردیفی، چون بذر در ۵ سانتیمتری کثار جوی قرار دارد آب زودتر به بذر می‌رسد و نمکهای موجود در خاک، فرصت کافی برای انتقال به بستر بذر نخواهد داشت و نمک نیز به جای محل کاشت در وسط پسته جمع می‌شود و طبعاً زراعت با مشکل کمتری از نظر شوری مواجه می‌شود (شکل ۴-۶).

توجه داشته باشید که در آبیاری زراعت چغندرقند، برای کنترل دبی آب و جلوگیری از فرسایش، یکی از روشهای مناسب، استفاده از سیفون برای هر شیار است (شکل ۴-۷). در ابتدای آبیاری می‌توانید از دو سیفون برای هر شیار استفاده نمایید و با رسیدن آب به انتهای شیار دبی را با حذف یک سیفون کاهش دهید. به نحوه استقرار سیفون در شکل ۴-۷ دقت کنید اگر سیفون در اختیار ندارید برای هر ۴ تا ۵ شیار یک راه ورودی آب از نهر اصلی تعبیه نمایید (شکل ۴-۸). برای جلوگیری از فرسایش در انها و مجاری ورودی آب و همچنین برای تنظیم مقدار آب ورودی می‌توانید از پلاستیک و کلش در انها و ورودیها استفاده کنید.

در کشت غیرمستقیم و نشاکاری، دقت کنید که بلافضله بعد از کاشت نشا، آبیاری را انجام دهید. تأخیر در آبیاری موجب از بین رفتن نشا در زمین اصلی خواهد شد.

سله‌شکنی

در اثر وجود سله، در وهله اول مشکل خروج جوانه‌ها پیش می‌آید و در مراحل بعدی ریشه‌های چغندرقند برای تأمین آب و مواد غذایی و توسعه ریشه با مشکل جدی روبرو می‌شوند. برای رفع این مشکل، سله‌شکنی را در مراحل زیر انجام دهید:

الف- برای خروج جوانه‌ها: در این مرحله برای جلوگیری از آسیب‌دیدن و از بین رفتن جوانه‌ها سعی کنید خاک مزرعه



شکل ۹-۴- سله‌شکنی و تهویه خاک

از موقع کاشت تا خروج جوانه‌ها مرطوب باقی بماند. این دوره حدود ۷ تا ۱۲ روز طول می‌کشد چون زمین مرطوب سله ندارد و جوانه‌ها برای خروج از خاک خارج خواهند شد.

ب - بعد از هر آبیاری به روش‌های غرقابی و نشتی، معمولاً به سله‌شکنی نیاز دارد. در زراعتهای ردیفی سله‌شکنی را با استفاده از تراکتور (شکل ۹-۴) با رینگهای باریک (عرض لاستیک کمتر از ۳۰ سانتیمتر) و کولتیواتورهای مختلف، انجام دهید چنانچه عرض لاستیک زیاد باشد در اثر کوییدگی و فشار چرخها، ریشه‌ها آسیب می‌ینند.

ج - در اوایل رشد، سله‌شکنی چغندرقند را می‌توانید تؤمن با حذف علفهای هرز انجام دهید.

د - سله‌شکنی در سطوح کوچک را با دست و با استفاده از بیل یا کچ بیل (فوکا) در حالت ایستاده و وجین کن و شفره به صورت نشسته انجام دهید (شکل ۹-۱۰).

ه - در سطوح کوچک و زراعتهای ردیفی می‌توانید از کولتیواتورهای دستی استفاده کنید. با ۸ ساعت کار قادر خواهید بود حدود ۴۰۰۰ مترمربع چغندرکاری را با این روش سله‌شکنی نمایید.




شکل ۹-۱۰- وجین و سله‌شکنی مزرعه چغندر

خاک دادن پای بوته

در زراعتها ریدیفی با استفاده از نهرکنهای کوچک یا پنجه غازیها همراه با سله‌شکنی و وجین، خاک بین خطوط کاشت را به سمت پسته‌ها بریزید تا عمل خاک دادن پای بوته انجام گیرد و رشد و نمو ریشه‌ها افزایش یابد.



شکل ۱۱-۴- تنک کردن چغندرقند



شکل ۱۲- تنک کن

تنک کردن، تقریباً پرهزینه‌ترین مرحله داشت چغندرقند است. بیشترین عملیات تنک کردن را در زراعتها که از بذور معمولی چند جوانه استفاده شده خواهید داشت و کمترین عملیات تنک در زراعتی که از بذور تک جوانه ژنتیکی استفاده شده انجام می‌گیرد.

مهمترین نکاتی که در تنک کردن چغندرقند باید رعایت نمایید عبارت است از :

۱- هر قدر تنک کردن دیر انجام شود تأثیر کمتری خواهد داشت.

۲- در صورت وجود آفات و شرایط نامناسب و احتمال خطر از بین رفتن تعدادی از بوتهای تنک کردن را در ۲ تا ۳ مرحله انجام دهید.

۳- تنک کردن را به صورتی انجام دهید که پس از خاتمه عملیات ۸۰ تا ۱۰۰ هزار بوته در هکتار یا ۸ تا ۱۰ بوته در مترمربع زمین باقی مانده باشد (شکل ۱۱-۴).

مراحل و چگونگی تنک کردن: به طور معمول، تنک کردن را در دو مرحله انجام دهید.

الف — در مرحله ۲ تا ۳ برگی شدن بوته: در این مرحله، با استفاده از ماشین تنک کن (شکل ۱۲-۴) یا وسایل دستی، فاصله بوتهای را روی ردیف به حدود ۱۰ سانتیمتر برسانید و بقیه را حذف کنید. این مرحله را تقریباً ۲۰ روز پس از جوانه‌زنی انجام دهید. در زراعتها که ای فاصله دو کپه را به ۲۰ و حداقل ۲۵ سانتیمتر برسانید در هر کپه حداقل ۳ بوته باقی بگذارید.

پیمانه مهارتی: عملیات داشت چغندر قند

شماره شناسایی: ۱۴-۱-۷۴/ک

مهارت: کشت چغندر قند

شماره شناسایی: ۱۴-۱-۷۴/ک



شکل ۱۳-۴- مزرعه چغندر قند بعد از عملیات تنک اولیه

ب- مرحله ۴ تا ۶ برگی شدن: در این مرحله، در زراعتهاي تک بوته، فاصله ۲ بوته را در روی خط به حدود ۲۰ سانتیمتر برسانيد و بوته های اضافی را حذف نمایيد (شکل ۱۳-۴). در زراعتهاي کپه ای تنها یک بوته باقی گذاشته، بقیه را حذف نمایيد. برای صرفه جویی در وقت و هزینه با حرکت در داخل شیار دو ردیف کاشت را در مسیر حرکت خود تنک کنید. در مناطقی که خطر آفات مثل کارادرینا وجود دارد این مرحله از تنک را بعد از رفع خطر آفات انجام دهید.

واکاري

در صورت کمبود بوته چغندر قند در قسمتهاي از زراعت، هرچه سریعتر و حداکثر تاموقع تنک کردن اولیه نسبت به واکاري و کاشت مجدد بذر به صورت دستی اقدام کنید. توجه داشته باشید واکاري بسیار پرهزینه است و اگر قسمت عمده مزرعه نیاز به واکاري داشته باشد این عمل مقرر به صرفه نخواهد بود در صورتی که فرصت زمانی وجود داشته باشد، کاشت مجدد مزرعه با ردیفکار هزینه کمتری را خواهد داشت.

کود سرک

کود ازته را در مراحل اولیه و موقع تنک کردن در دو مرحله، با توصیه کارشناسان به نسبت ۱۰۰ کیلوگرم در هکتار به صورت سرک مورد استفاده قرار دهید.

در کشت ردیفی با کودکار، کود را در عمق ۵ تا ۶ سانتیمتری زیر خاک نمایيد. کود را می توانید با استفاده از کودپاش سانتریفوژ یا مخازن کود فاقد لوله های سقوط (شکل ۱۴) در زمین پخش نمایید و با استفاده از پنجه غازی زیر خاک کنید.

در صورت دسترسی نداشتن به ماشین آلات، کود را به صورت دستی در داخل شیارها پخش کنید. بهتر است کودپاشی را قبل از وجين یا سله شکنی انجام دهید تا در اثر اين عملیات کود با خاک مخلوط شود. بعد از کودپاشی، بلا فاصله عملیات آبیاری را انجام دهید.



شکل ۱۴-۴- مصرف کود به صورت سرک با استفاده از ماشین پخش کود

کود مایع: در صورت مشاهده کمبود عناصر غذایی بر روی گیاه (جدول ۱-۴) (با تشخیص و توصیه کارشناسان) از کود مایع در زراعت استفاده نمایید. این کودها را به نسبت ۲ تا ۵ کود مایع با آب مخلوط کرده، بوسیله محلول پاش روی گیاه بپاشید. کود مایع را همزمان با سمپاشی می‌توانید در زراعت استفاده نمایید. علایم کمبود بعضی از عناصر غذایی با بررسی برگها و وضع ظاهری گیاه قابل تشخیص هستند.

جدول ۱-۴—علایم کمبود عناصر غذایی در چغندر قند

عنصر غذایی	علایم کمبود
کلسیم	سوختگی در نوک برگ و چین خوردگی قاعده برگها
گوگرد	حالت زرد (کلروز) در برگها که در حالت پیشرفته لکه‌های قهوه‌ای نامنظم در لبه برگها و دمبرگها بوجود می‌آید.
منیزیوم	نقاط کوچک زرد کم رنگ در حاشیه برگها، نقاط زرد لیمویی در بین رگبرگها، لبه برگها به صورت راه راه و مخطوط از بین رفتن جوانه‌های مرکزی و وسطی بوته، اختلال در گرده‌افسانی
بور	زردی (کلروز) در برگها، رنگ پریدگی بین رگبرگها، لکه‌های نکروتیک روی برگها
آهن	لکه‌های زرد روی برگهای خارجی
منگنز و کلر	کاهش سطح برگ و جمع شدن اطراف برگ به سمت بالا و قاشقی شکل شدن آنها
مولیبدن	وجود قسمتهای نکروزه به رنگ قهوه‌ای مایل به خاکستری در برگهای مسن
مس	ظهور لکه‌های سفید فرورفته در سطح بالای برگ و بین رگبرگها که بعداً قهوه‌ای می‌شود و جداشدن برگ از بوته
روی	کوچک و باریک ماندن برگها همراه با رنگ سبز روشن
ازت	رنگ سبز تیره در برگها
فسفر	ظهور لکه‌های سفید مایل به زرد یا روشن در لبه و نوک برگها و سوختگی به شکل لکه‌های قهوه‌ای
پتان	

کنترل آفات چغندر قند

چغندر قند دارای آفات زیادی است که در مراحل مختلف رشد، این گیاه را مورد حمله قرار می‌دهند. خسارت آفات خصوصاً در اوایل رشد و نمو بوته بسیار زیاد و قابل توجه است. با بازدید مستمر مزروعه چغندر قند این آفات را شناسایی نموده، با روش مؤثر و بموقع آنها را کنترل نمایید.

وسایل و مواد مورد نیاز: سمپاش اتومایزر، سمپاش

تراکتوری

تجهیزات مخصوص حفظ نباتات شامل لوپ - ذره‌بین -

بینوکولر - میکروسکوپ - جعبه حشرات - تخته مخصوص -

تیوب شیشه‌ای – پنس – سنjac ایتاله حشرات – اتالوار
مواد مورد نیاز: الکل سفید، سموم مختلف براساس نظر
کارشناسان و یا توصیه‌های کترلی در پورمان (پیمانهٔ مهارتی)

کار عملی

همگام با آموزش پیمانهٔ مهارتی در زمینهٔ کنترل آفات،
عملیات زیر را برای کسب مهارت بیشتر انجام دهید:
۱- آفات موجود در مزرعه چغندرقند را جمع‌آوری و
به کمک مربیان، شناسایی کرده برچسب بزنید و در جعبه‌های
مخصوص نگهداری نمایید.

۲- گیاهان آفت‌زده را جمع‌آوری و نگهداری نموده،
به همراه آفت مربوط، در جعبه‌های مخصوص قرار دهید.
۳- زمان بروز و نحوهٔ خسارت آفات را در مزرعه بررسی
و یادداشت نمایید.

۴- آفات موجود در مزرعه را براساس توصیه‌های موجود
در پیمانهٔ مهارتی و یا نظر کارشناسان حفظ نباتات، به روش‌های
مختلف کنترل نمایید. میزان سموم مورد نیاز را براساس وسعت
مزرعه برآورد و مورد استفاده قرار دهید. (با کمک مربیان)
مهمنترین آفات چغندرقند و مشخصات و نحوهٔ زندگی و
طرز خسارت و روش‌های کنترل آنها عبارت است از:

۱- برگخوار چغندرقند (کارادرینا):

مناطق انتشار: اکثر مناطق کشور

مشخصات ظاهری:

الف - حشره کامل: پروانهٔ نسبتاً گوچکی به طول ۱۰ تا ۱۳ میلیمتر با بالهای قهوه‌ای که روی هر بال، ۲ لکهٔ لوییانی شکل و
گرد وجود دارد (شکل ۱۵-۴).



شکل ۱۵-۴- حشره کامل کارادرینا



شکل ۱۶-۴- لارو کارادرینا



شکل ۱۷-۴- نحوه خسارت آفت کارادرینا



شکل ۱۸-۴- پروانه آگروتیس

ب-شفیره: به رنگ قهوه‌ای و محل حضور آن در داخل خاک است.

ج-لارو: سبزرنگ و گاهی به رنگ قهوه‌ای، به طول تا ۳۰ میلیمتر با ۳ نوار طولی (شکل ۱۶).

د-تخم: کوچک و زرد رنگ و با قطر حدود ۵ میلیمتر طرز خسارت و علایم آن: لاروها برگخوارند و با تعذیه از برگ آن را به صورت توری درمی‌آورند (شکل ۱۷). بیشترین خسارت را در نسل دوم و در خرداد ماه مشاهده می‌نمایید. زیست‌شناسی: آفت به صورت لارو یا شفیره زمستان داخل خاک باقی می‌ماند و در اوایل بهار پروانه‌ها ظاهر شده تخم‌ریزی می‌نمایند. آفت در هر سال حدود ۵ نسل دارد.

روش کنترل: با مشاهده آفت، با یکی از سموم فسفره مثل دیازینون به میزان ۱/۵ لیتر در هکتار، سمپاشی را انجام دهید (با توصیه مریبان).

۲- شبپره زمستانی (آگروتیس) یا کرم طوقه بر:
مناطق انتشار: در کلیه مناطق چند رقند وجود دارد و به سایر محصولات نیز خسارت وارد می‌نماید.

مشخصات ظاهری:

الف-حشره کامل: پروانه شبپره است با بالهای خاکستری یا قهوه‌ای که روی هر بال ۳ لکه گرد، مثلثی و لوبيایی شکل وجود دارد (شکل ۱۸).

ب-شفیره: خرمایی رنگ و در داخل لانه گلی به سر می‌برد.

پیمانه‌مهراتی: عملیات داشت چندرقد

شماره‌شناسایی: ۱۴-۱-۷۴/ک

مهارت: کشت چندرقد

شماره‌شناسایی: ۱۴-۱-۷۴/ک



شکل ۱۹-۴-۱۹- لارو در داخل خاک (اگروتیس)



شکل ۲۰-۴-۲۰- خسارت اگروتیس روی ریشه



شکل ۲۱-۴-۲۱- لارو کرم طوقه بر

ج- لارو: خاکستری تا سیاه درشت و به طول حدود ۵۰ میلیمتر (شکل ۴-۱۹).

د- تخم حشره: حدود ۵/۰ میلیمتر و به رنگ روشن است که بتدریج تیره می‌شود.

طرز خسارت و علایم آن: لارو عموماً داخل خاک زندگی می‌کند و بیشترین خسارت آفت مربوط به تغذیه از ریشه و طوفه است (شکلهای ۲۰-۴ و ۲۱-۴) و مقداری نیز از برگها تغذیه می‌کند. تغذیه زیاد آفت منجر به از بین رفتن بوته چندرقد می‌شود.

برای مشاهده آفت (لارو)، در داخل خاک زیر کلوخه‌های کوچک، اطراف بوته را جستجو نمایید.

زیست‌شناسی: حشره، زمستان را به صورت لارو و به ندرت به صورت شفیره داخل خاک می‌گذراند. معمولاً پروانه‌ها در اردیبهشت‌ماه ظاهر می‌شوند. آفت ۳ نسل دارد که حیات نسل دوم قابل توجه می‌باشد.

روش کنترل: سمپاشی را با یکی از سموم فسفره (به توصیه کارشناسان) انجام دهید. در مورد لاروهای درشت محلول پاشی تأثیر زیادی ندارد. برای کنترل آنها طعمه مسموم به نسبت ۱۰۰ کیلوگرم سبوس با ۵ لیتر آب و حدود ۳ کیلوگرم از سموم کارباریل یا لیندین فراهم کنید و هنگام غروب آن را روی خطوط کاشت بپاشید. در هر هکتار، به ۱۰۰ کیلوگرم طعمه مسموم نیاز دارد.

پیمانه مهارتی: عملیات داشت چغدرقند

شماره شناسایی: ۱۴-۷۴/ک

مهارت: کشت چغدرقند

شماره شناسایی: ۱۴-۷۴/ک



شکل ۲۲-۴- حشره کامل شب پره گاما



شکل ۲۳-۴- لارو شب پره گاما



شکل ۲۴-۴- نحوه خسارت آفت شب پره گاما



شکل ۲۵-۴- حشره کامل بید چغدرقند

۳- شب پره گاما:

مناطق انتشار: در اکثر مناطق وجود دارد و آفت مشترک بین چغدرقند و بسیاری از گیاهان زراعی است.

مشخصات ظاهری:

الف - حشره کامل: پروانه شب پره به رنگ خاکستری مایل به قهوه‌ای با یک لکه نقره‌ای رنگ به شکل گاما روی بالهای جلویی می‌باشد (شکل ۲۲-۴).

ب - شفیره: به رنگ سیاه کامل و بندرت دارای پیله است.

ج - لارو: به رنگ سبز مایل به زرد به طول ۳۵ میلیمتر (شکل ۲۳-۴) و از روی علامت مشخصه (حرکت قوسی لارو) براحتی می‌توانید آن را شناسایی کنید.

د - تخم: حشره سفید مایل به سبز به قطر ۱ میلیمتر

طرز خسارت و علایم آن: خسارت را بر روی برگ و به شکل توری درآمدن برگ در اثر تغذیه آفت می‌توانید مشاهده نمایید (شکل ۲۴-۴).

زیست‌شناسی: حشره، زمستان را به صورت لارو به سر می‌برد. آفت حدود ۳ سل دارد و نسل اول آن بیشترین خسارت را بر روی چغدرقند وارد می‌سازد.

روش کنترل: در زمان بروز آفت سمپاشی را (به توصیه کارشناسان) با یکی از سوم فسفره انجام دهید.

۴- بید چغدرقند (پروانه لیتا):

مناطق انتشار: آفت اختصاصی چغدرقند و در تمام مناطق مشاهده می‌شود.

مشخصات ظاهری:

الف - حشره کامل: پروانه کوچکی به طول ۷ میلیمتر با رنگ قهوه‌ای متمایل به زرد است و بالهایی با نقاط کوچک سیاه رنگ دارد (شکل ۲۵-۴).

پیمانهٔ مهارتی: عملیات داشت چغدرقد

شمارهٔ شناسایی: ۱۴-۱-۷۴/ک

مهارت: کشت چغدرقد

شمارهٔ شناسایی: ۱۴-۱-۷۴/ک



شکل ۴-۲۶—لارو بید چغدرقد

ب—شفیره: قرمز رنگ و داخل پیله سفید وجود دارد.

ج—لارو: به اندازهٔ حدود ۱۲ میلیمتر به رنگ زرد روشن و بتدریج نوارهای قرمز درشت در آن بوجود می‌آید (شکل ۴-۲۶).

د—تخم حشره: بیضی‌شکل و حدود ۵/۰ میلیمتر و رنگ آن در ابتدا روشن است.


طرز خسارت و علایم آن: خسارت آفت را در اواسط بهار می‌توانید در برگ‌هایی که از لبه و دم برگ‌ها مورد تغذیه لارو قرار گرفته مشاهده نمایید. نسل‌های بعدی حتی جوانه‌ها را مورد حمله قرار می‌دهند و سیاهی رنگ جوانه‌ها از علایم خسارت این آفت می‌باشد. لارو به محل طوفه نیز حمله می‌کند و کانالهایی در سرریشه ایجاد می‌نماید (شکل ۴-۲۷).

زیست‌شناسی: زمستان گذرانی به صورت لارو در بوته‌های چغدرقد و سرریشه‌هایی که باقی مانده انجام می‌شود. این آفت ۳ تا ۵ نسل دارد. بیشترین فعالیت و شدت خسارت را در اوایل تابستان که هوا گرم و خشک است مشاهده می‌نمایید.

روش کنترل: با مشاهده آفت (به توصیه کارشناسان) با یکی از سموم فسفره مثل دیازینون به نسبت ۱/۵ لیتر سم برای هر هکتار سمپاشی را انجام دهید.



شکل ۴-۲۷—نحوه خسارت بید چغدرقد



شکل ۴-۲۸- فرم بالدار شته



شکل ۴-۲۹- فرم بی بال شته



شکل ۴-۳۱- خسارت بر روی شته سیاه در پشت
برگ چغدر



شکل ۴-۳۲

۵- شته سیاه:

مناطق انتشار: در تمام نقاط کشور

مشخصات ظاهری: حشره کامل را به شکل ظاهری سیاه تیره به طول ۲ تا ۳ میلیمتر با فرم بالدار و بدون بال می‌توانید مشاهده نمایید (شکل ۴-۲۸ و ۴-۲۹). تخم حشره به اندازه $\frac{1}{8}$ تا $\frac{1}{9}$ میلیمتر بیضوی و سیاه براق است.

طرز خسارت و علایم آن: این آفت به اندامهای هوایی مثل برگ، ساقه و گل حمله می‌کند و با فرو بردن قطعات دهانی به داخل برگها از شیره گیاه تغذیه می‌کند. علاوه بر آن خسارت بیشتری از طریق انتقال بیماریهای ویروسی به گیاه وارد می‌نماید. علایم خسارت را به صورت پیچیده شدن برگها (شکل ۴-۳۰)، پژمردگی و زرد و خشک شدن آنها (شکل ۴-۳۲)، وجود ماده چسبناک (علسک) دفع شده از آفت که باعث کثیفی و اجتماع مورچه و مگس است بسهولت می‌توانید در مزرعه مشاهده نمایید. آفت نیز خصوصاً در پشت برگها قابل مشاهده است (شکل ۴-۳۱).

زیست‌شناسی: این آفت، زمستان را به صورت تخم می‌گذراند و تعداد زیادی نسل در سال دارد.

روشهای کنترل:

۱- بیولوژیکی، با استفاده از کفشدوزک قرمز رنگ ۷

نقاطهای


۲- سمپاشی با یکی از سموم مثل متابیستوکس، دتمیوات، سوپراسید به میزان یک لیتر برای هر هکتار (با توصیه کارشناسان).

پیمانهٔ مهارتی: عملیات داشت چغندرقند

شمارهٔ شناسایی: ۱۴-۱-۷۴/ک

مهارت: کشت چغندرقند

شمارهٔ شناسایی: ۱۴-۱-۷۴/ک



شکل ۴-۳۳- حشره کامل



شکل ۴-۳۴- شفیره



شکل ۴-۳۵- لارو



شکل ۴-۳۶- نمایش دستجات تخم در پشت برگ

۶- مگس چغندرقند:

مناطق انتشار: در تمام مناطق چغندرکاری

مشخصات ظاهری:

الف - حشره کامل: مگس کوچکی است به طول ۵ میلیمتر رنگ بالها شفاف مایل به زرد با سر قهوه‌ای (شکل ۴-۳۳).

ب - شفیره: استوانه‌ای شکل و به رنگ قرمز تیره می‌باشد (شکل ۴-۳۴).

ج - لارو: سفید متمایل به زرد بدون پا و به طول حدود ۸ میلیمتر است (شکل ۴-۳۵).

د - تخم: موزی شکل به رنگ سفید با سطح مشبک و دارای طولی حدود یک میلیمتر است (شکل ۴-۳۶).



شکل ۴-۳۷

طرز خسارت و علایم آن: لارو، برگ را سوراخ کرده، بین دو غشا قرار می‌گیرد و از قسمت گوشته و سبز آن تغذیه می‌کند. قسمتهای خسارت دیده را به صورت باد کرده و زرد رنگ که بعداً خشک می‌شود بسهولت می‌توانید روی برگ مشاهده نمایید (شکل ۴-۳۷).

زیست‌شناسی: حشره، زمستان را به صورت شفیره داخل خاک می‌گذراند. آفت ۲ تا ۴ نسل دارد که خسارت‌های نسلهای ۲ و ۳ بیشتر است.

روش کنترل: با مشاهده لاروها که در اردیبهشت ماه خسارت بیشتری دارند سمپاشی را انجام دهید. برای سمپاشی (با توصیه کارشناسان) از سوموم فسفره مثل دیازینون یا دتمیوات استفاده نمایید. از محلول آب تنباق و مویان نیز می‌توانید برای سمپاشی استفاده کنید. کندن و سوزاندن برگ‌های آلوده موجب کاهش آفت در نسلهای بعد می‌شود.

۷- کک چغدرقند:

مناطق انتشار: در تمام مناطق چغدرکاری

مشخصات ظاهری:

الف - حشره کامل: سوسک کوچک سیاهرنگی به طول ۲ میلیمتر است (شکل ۴-۳۸).

ب - شفیره: به رنگ سفید و دارای ۲ قلاب در انتهای شکم می‌باشد.



شکل ۴-۳۸ - کک چغدرقند

ج - لارو: به رنگ سفید و طولی تا ۵ میلیمتر دارد و دارای ۳ جفت پای صدری می‌باشد (شکل ۴-۳۹).



شکل ۴-۳۹ - لارو آفت

پیمانه‌مهراتی: عملیات داشت چغدرقند


شماره‌شناسایی: ۱۴-۱-۷۴/ک

مهارت: کشت چغدرقند


شماره‌شناسایی: ۱۴-۱-۷۴/ک



شکل ۴۰-۴- خسارت کک‌های زمستان‌گذران



شکل ۴۱-۴- خسارت کک‌های نسل جدید



شکل ۴۲-۴- خرطوم کوتاه

د- تخمهای کوچک، به طول $\frac{4}{4}$ میلیمتر، تخم مرغی شکل و به رنگ زرد و روشن است.

طرز خسارت و علایم آن: خسارت لارو کم است اما حشره كامل آن از برگها و جوانه تغذیه می‌کند. خسارت در اوایل رشد و تا قبل از ۴ برگ شدن می‌تواند موجب نابودی مزرعه چغدرقند شود (شکل ۴۰-۴). علایم را به صورت سوراخهای روی برگ و یا خشک شدن بوته (شکل ۴۱-۴) در اثر تقدیه از جوانه می‌توانید مشاهده نمایید. در مزارع کوپه خسارت بیشتری وجود دارد.

زیست‌شناسی: زمستان‌گذرانی به صورت حشره كامل در زیر گیاهان خشکیده و کلوخه‌ها انجام می‌شود. آفت یک نسل در سال دارد و حشرات كامل تا موقع برداشت روی محصول مشاهده می‌شوند.

روش کنترل: علفهای هرز و بقایای گیاهی را در اوایل بهار از بین بیرید. برای سمپاشی (با توصیه کارشناسان) از سمومی مثل فوزالون، آتریمفس استفاده نمایید.

۸- خرطوم کوتاه چغدرقند:

مناطق انتشار: در تمام مناطق چغدرکاری

مشخصات ظاهری:

الف- حشره كامل: سوسک باریک به طول $10\text{--}16$ میلیمتر رنگ عمومی بدن خاکی رنگ و دارای خرطوم کوتاه می‌باشد.


ب- شفیره: سفیدرنگ و به طول 15 میلیمتر شبیه حشره كامل است.

ج- لارو: قوسی‌شکل بدون پا، سفیدرنگ دارای سر قهوه‌ای یا زرد روشن است.

د- تخم: بیضی‌شکل به طول یک میلیمتر و زرد رنگ می‌باشد. تخمهای در زیر پولک سیاه رنگ ناشی از ترشح بزاق حشره وجود دارند و به همین دلیل این آفت خال‌سیاه نیز نامیده می‌شود.



الف شکل ۴۳-۴- نحوه خسارت ب



شکل ۴۴- خرطوم بلند چغندرقند



الف



ب

شکل ۴۵-۴- نحوه خسارت

طرز خسارت و علایم آن: به محض سبزشدن چغندرقند، حشره کامل آفت از برگ اولیه تغذیه می کند و با تغذیه برگها را به شکل داس درمی آورد. لارو از برگ و ریشه تغذیه می کند و باعث پژمردگی و زرد و خشک شدن بوته می شود. یک لارو می تواند یک بوته را ازین بین ببرد خسارت در روزهای آفتابی و گرم بیشتر است. زیست شناسی: این آفت، زمستان را به صورت حشره کامل و یا به شکل لارو در داخل خاک و بقایای گیاهی می گذراند آفت ۳ نسل در سال دارد و مهمترین خسارت در نسل اول دیده می شود. روش کنترل: کنترل زراعی مثل ازین بین بردن علفهای هرز، آبیاری موقع می تواند از شدت خسارت آفت کم نماید. در صورت مشاهده آفت و یا علایم آن مثل خال سیاه در برگ (با توصیه کارشناسان) با استفاده از سموم فسفره مزرعه را سمپاشی نمایید.

۹- خرطوم بلند دمبرگ چغندرقند (سرخرطومی ساقه):

مناطق انتشار: در تمام مناطق چغندرقند کاری

مشخصات ظاهری:

الف - حشره کامل: سوسک کوچک و تقریباً زرد رنگی به طول ۷ تا ۸ میلیمتر است.

ب - شفیره: سفید متمایل به زرد به طول ۹ میلیمتر داخل رگبرگها تشکیل می شود.

ج - لارو: سفیدرنگ با سر قهوه ای به طول ۹ میلیمتر و بدون پا می باشد.

د - تخم: سفید مایل به زرد، بیضی شکل به طول $8/8^{\circ}$ میلیمتر در داخل رگبرگها وجود دارد.

طرز خسارت و علایم آن: حشرات کامل در اوایل بهار از دمبرگها تغذیه می کنند و بعد به برگها حمله کرده، با تغذیه از برگها آنها را به صورت مشبک درمی آورند. لارو حشره از مغز دمبرگ تغذیه می کند و دالانی در داخل دمبرگها بوجود می آورد و بعد باعث پژمردگی و زرد شدن برگها می شود. دمبرگهای خسارت دیده قهوه ای و سیاه نگ است.

پیمانهٔ مهارتی: عملیات داشت چغندرقند شمارهٔ شناسایی: ۱۴-۱-۷۴/ک	مهارت: کشت چغندرقند شمارهٔ شناسایی: ۱۴-۱-۷۴/ک
---	--

زیست‌شناسی: این آفت، زمستان را به صورت حشرهٔ کامل و زیر بقایای گیاهی و کلوخه‌ها می‌گذراند و در بهار به مزارع حمله می‌کند. تخمگذاری این آفت، در داخل دمبرگ انجام می‌شود. در هر دمبرگ ممکن است تا ۱۰ عدد لارو وجود داشته باشد. آفت ۳ نسل در سال دارد. خسارت نسلهای دوم و سوم بیشتر است.

روش کنترل: با مشاهده آفت با استفاده از یکی از سموم فسفره مزرعه را سمپاشی نمایید (با توصیه کارشناسان).

بیماریهای مهم چغندرقند

چغندرقند دارای بیماریهای زیادی است. انواع عوامل بیماری‌زای گیاهی مثل قارچها، باکتریها، ویروسها و نماتدها موجب بروز بیماری و خسارت در چغندرقند می‌شوند. بیماریهای مهم چغندرقند عبارت‌اند از:

- ۱- سفیدک سطحی
- ۲- پوسیدگی ریشهٔ چغندرقند
- ۳- موzaایک چغندرقند
- ۴- نماتد چغندرقند
- ۵- سفیدک داخلی
- ۶- لکه گرد
- ۷- زنگ چغندرقند
- ۸- پوسیدگی باکتریایی ریشه
- ۹- سرطان چغندرقند
- ۱۰- زردی چغندرقند
- ۱۱- پیچیدگی و تورم رگبرگها
- ۱۲- ریشه‌ریشی (ریزومنیا)

در این پیمانهٔ مهارتی با چهار مورد از مهمترین بیماریهای چغندرقند که موجب بروز خسارات فراوان در مزارع این محصول می‌شود از نظر مناطق انتشار، عامل بیماری، نحوهٔ خسارت، زیست‌شناسی و روش‌های کنترل آشنا می‌شوید. برای مهارت‌آموزی

بیشتر، همگام با آموزش نکات مهم این بیماریها، عملیات شناسایی و کنترل را انجام دهید.

کار عملی

۱- بوته‌های بیمار و آلوده به عوامل بیماری زا را (با کمک کارشناسان) جمع‌آوری و شناسایی نموده، پس از خشک‌کردن اندامهای بوته بیمار آنها را حتی‌الامکان در جعبه‌های مخصوص نگهداری نمایید.

۲- زمان و نحوه خسارت بیماریها را بررسی و یادداشت‌برداری نمایید و مهمترین بیماری چفندرقند را از نظر میزان خسارت در مزرعه (بنه) مشخص کنید.

۳- تا حد امکان کنترل بیماریها چفندرقند را انجام دهید.
وسایل و مواد مورد نیاز: سمپاش

وسایل مخصوص حفظ نباتات: لوب، ذره‌بین، بینوکولر، میکروسکوپ، تخته مخصوص، مقوا، پنس، سنجاق، جعبه مخصوص نگهداری عوامل بیمار و اندامهای خسارت دیده مواد مورد نیاز: سوموم مختلف مورد نیاز براساس نظر کارشناسان و یا توصیه‌های کنترلی در این پیمانه مهارتی

۱- سفیدک سطحی:

عامل بیماری: نوعی قارچ است.

مناطق انتشار: اکثر مناطق چفندرکاری کشور

طرز خسارت و علایم آن: ابتدا در پشت برگ‌ها پوشش گردمانندی بوجود می‌آید که بعداً به روی برگ و دیگر اندامهای هوایی نیز سراحت می‌کند. برگ‌ها، شادابی خود را از دست داده، برگ‌های جوان به صورت چروکیده و زردرنگ درمی‌آید. در اثر بیماری، عمل فتوسنتر مشکل شده، برگ‌های جدید روی گیاه بوجود می‌آید و تولید برگ جدید موجب کاهش عملکرد خواهد شد.

زیست‌شناسی: تکنیر و انتشار به وسیله کنیدیها صورت می‌گیرد. کنیدیها توسط باد و باران بر روی برگ بوته‌های جوان قرار گرفته، در صورت مساعد بودن رطوبت و حرارت ۲۰ تا ۲۵ درجه سلسیوس در برابر این بیماری می‌افزایند.



شکل ۴۶-۴- بیماری سفیدک حقیقی چفندرقند

پیمانهٔ مهارتی: عملیات داشت چغدرقند شمارهٔ شناسایی: ۱۴-۱-۷۴/ک	مهارت: کشت چغدرقند شمارهٔ شناسایی: ۱۴-۱-۷۴/ک
--	---

زیست‌شناسی: قارچ قادر است در تمام مراحل رشد، چغدرقند را مورد حمله قرار دهد. میزان خسارت، بعد از تنک کردن قابل توجه است. ایجاد هر گونه زخم و خراش روی ریشه موجب تسریع نفوذ انگل به داخل ریشه و افزایش خسارت می‌گردد. سفتی و نفوذناپذیری خاک و رطوبت بیش از اندازه، موجب پیشرفت بیماری می‌شود.

روش‌های کنترل: مبارزه با عامل این بیماری که قارچ خاکزی است بسیار مشکل می‌باشد. برای پیشگیری، از تناوب، عدم کشت کرتی، استفاده از ارقام مقاوم، ضدغونی خاک و بذر و حذف علفهای هرز استفاده نمایید.

۳- بیماری ویروسی موzaئیک چغدرقند:

عامل بیماری: ویروس موzaئیک چغدرقند
مناطق انتشار: یکی از ۳ بیماری مهم ویروسی چغدرقند است که از سال ۱۳۴۰ مشاهده شده است و در حال حاضر در اکثر نواحی چغدرکاری کشور انتشار دارد.

میزانها: انواع چغدر

طرز خسارت و علایم آن: این بیماری، باعث توقف یا کندی رشد بوته‌ها و کوچک ماندن ریشه می‌شود. علایم آن را به صورت لکه‌های کوچک زرد رنگ نامنظم و متعدد بر روی برگهای میانی مشاهده می‌نمایید که بعداً در روی برگهای جوان حالت موzaئیکی بوجود می‌آید و در حالت شدیدتر برگها را غالباً به حالت پیچیدگی و لوله‌ای شدن می‌توانید مشاهده کنید.

زیست‌شناسی: این ویروس به سیلهٔ انواع شته منتقل می‌شود. علفهای هرز کانون آلدگی اولیه هستند. پس از ورود به داخل چغدرقند، به حالت سیستمیک درآمده، پس از ۸ تا ۹ روز نشانه‌های بیماری ظاهر می‌شود.

روش‌های کنترل: برای کنترل بیماری باید با عوامل انتقال (مثل شته) از طریق سمپاشی مبارزه کنید و علفهای هرز را از بین بیرید و در صورتی که کشت را بعد از اتمام پرواز شته بالدار انجام دهید تا حدود زیادی بیماری را کنترل خواهید کرد اما توجه داشته باشید

درجه سانتیگراد پس از ۲ تا ۵ ساعت جوانه می‌زند و رشد و توسعه پیدا می‌کند. این قارچ در حرارت زیاد نمی‌تواند فعالیت داشته باشد. به همین دلیل در مرداد ماه توسعه کمی دارد و در شهریور ازشدت بیشتری برخوردار است.

روش کنترل: بمحض مشاهده سفیدک مبارزه را انجام دهید تا حداقل ۱۰٪ افزایش محصول داشته باشد.

الف - روش شیمیایی: با مشاهده اولین علایم آلدگی، سمپاشی را با یکی از سوم زیر انجام دهید (با کمک و توصیه کارشناسان).

۱- از گل گوگرد به نسبت ۱۵ تا ۲۵ کیلوگرم در هکتار به صورت گردپاشی استفاده نمایید.

۲- از سومومی مثل کاراتان به نسبت ۱ تا ۱/۵ در هزار، به صورت سمپاشی استفاده کنید.

۳- ۲ تا ۳ نوبت سمپاشی را با استفاده از گوگرد و تابل به مقدار ۴ تا ۶ کیلوگرم در هکتار انجام دهید.

ب - روش زراعی: کنترل علفهای هرز، استفاده از ارقام مقاوم، رعایت فواصل کاشت و از بین بردن بقایای گیاهی موجب کنترل بیماری می‌شود.

۲- بیماری پوسیدگی ریشه چغدرقند:

عامل بیماری: قارچ و عمدتاً فوزاریوم و ریزوکتونیا می‌باشد.

مناطق انتشار: مناطق مختلف کشور

میزانها: علاوه بر چغدر تعداد زیادی از گیاهان زراعی طرز خسارت و علایم آن: در مراحل پیشرفته برگهای خارجی و سپس برگهای داخلی حالت پلاسیده به خود می‌گیرند. با بررسی ریشه، پوشش قارچی صورتی رنگ را در قسمت تزدیک طوفه و پوشش سفیدرنگ را در قسمت پایین ریشه که مرطوب تر است می‌توانید مشاهده کنید. رنگ طبیعی ریشه، قهوه‌ای متمایل به سیاه می‌شود. در اثر این پوسیدگی آوندها آسیب دیده، قطع جریان شیره گیاهی موجب آسیب دیدن برگها و اندامهای هوایی می‌شود.

کشت در زمان مناسب انجام شود و آن را خیلی به تأخیر نیندازید.

۴- نماد چغندرقند:

عامل بیماری: نماد چغندرقند با ظاهری شبیه کرم و قابل

رؤیت با چشم

مناطق انتشار: اولین بار در سال ۱۳۴۸ در ایران شناسایی شده است. هم اکنون، در بیشتر استانهای کشور مثل خراسان، آذربایجان، کرمانشاه، فارس انتشار دارد.

میزبانها: در ایران، علاوه بر چغندرقند، انواع کلم، ترب، تریجه، شلغم، شاهی و اسفناج میزبان این بیماری می‌باشند. طرز خسارت و علایم آن: نشانه‌های بیماری را عموماً در ماههای تیر و مرداد در برگها بررسی نمایید که در هنگام تابش آفتاب و در روز به صورت پژمردگی برگها ظاهر می‌شود و در شب و به هنگام خنک شدن هوا دوباره حالت شادابی را بدست می‌آورد.

کل بوته را در این حالت به صورت رنجور و ضعیف و زرد با رشد کم در مزرعه می‌بینید. در این حالت با جستجوی ریشه، آنها را کوچک و بد شکل با ریشکهای فرعی زیاد می‌بینید که بر روی آنها سیستهای سفید رنگ به اندازه حدود یک میلیمتر با چشم عادی قابل تشخیص می‌باشد.


زیست‌شناسی: نماد از سن دوم لاروی وارد ریشه چغندرقند می‌شود. تعداد نسل بسته به شرایط محیطی، دارای ۴ نسل در سال می‌باشد و دوره زندگی هر نسل ۴۰ تا ۷۰ روز به طول می‌انجامد. نماد دارای دو شکل جنسی است ماده جوان لیمویی شکل و سفید شیری به اندازه $6/6$ تا $8/0$ میلیمتر که بعداً رنگ ماده تبدیل به قهوه‌ای شده و به آن «سیست» گفته می‌شود. نماد نر، کرمی شکل و به اندازه $1/6$ تا $1/3$ میلیمتر است.

روشهای کنترل: مبارزه شیمیایی مقوون بصرفه نیست و کارآیی چندانی ندارد ولی (با توصیه کارشناسان) از سمومی مثل تمیک به نسبت ۵ کیلوگرم در هکتار بلا فاصله بعد از کاشت می‌توانید استفاده کنید و آن را در زمین پخش نمایید.

کشت را هرچه زودتر و در اول فصل انجام دهید.



شکل ۴-۴۷



شکل ۴-۴۸- نماد چغندرقند *Heterodera schachtii* Schmidt

الف - ماده بالغ با کیسه تخم. ب - سیست نماد با کیسه تخم. ج - سر نماد نر. د - مقطع عرضی سر نماد نر. ه - منظره دهانه *amphid* در سر نماد نر. و - لارونر سن ۴ در آستانه تغییر جلد. ز - دم نماد نر. ح - نماد نر بالغ. ط - ناحیه مری در نماد نر. ی - ناحیه سر در لاروسن ۲. ک - منظره عمومی لاروسن ۲.

مهارت: کشت چغندرقند

شماره شناسایی: ۱۴-۷۴-۱

پیمانه مهارتی: عملیات داشت چغندرقند

شماره شناسایی: ۷۴-۱۴-۴

در صورت آلودگی بودن مزرعه به نماد، در تناوب، حداقل تا ۵ سال از کشت مجدد چغندرقند و سایر میزانهای مشترک خودداری نمایید.

علفهای هرز چغندرقند

چغندرقند، گیاهی وجینی است و کنترل علفهای هرز اثر زیادی در افزایش محصول به همراه خواهد داشت. در کلیه مراحل رشد چغندرقند خصوصاً در اوایل و بعد از کاشت هرچه سریعتر کنترل علفهای هرز را با روش‌های مختلف انجام دهید.

وسایل و تجهیزات مورد نیاز: سمپاش اتومایزr و سمپاش تراکتوری، بیل، فوکا، تراکتور و کولتیواتور، مقوا، چسب، هرباریوم سوموم علف کش مطابق جدول ۲-۴ با توصیه و نظرات کارشناسان حفظ نباتات مناسب با وسعت مزرعه محاسبه و تهیه شود.

آشنایی با علفهای هرز مهم و اختصاصی چغندرقند: با توجه به دامنه وسیع کشت چغندرقند در مناطق مختلف، انواع علفهای هرز در زراعت این محصول وجود دارد که با مهمترین آنها در جدول ۴-۲ همراه با ذکر نام علمی به اهمیت اقتصادی و مناطق انتشار آنها آشنا می‌شوید. تعدادی از این علفها یکساله هستند که کنترل آنها را با سهولت بیشتری می‌توانند انجام دهید. کنترل علفهای هرز چند ساله چغندرقند مشکلتر است و باید با روش‌های پیشگیری، آنها را کنترل نمود.



شکل ۴-۵۰- سوروف



شکل ۴-۴۹- تاج خروصی

پیمانه‌مهراتی: عملیات داشت چند رقند


شماره‌شناسایی: ۱۴-۱-۷۴/ک

مهارت: کشت چند رقند

شماره‌شناسایی: ۱۴-۱-۷۴/ک



شكل ۵۲-۴- پیچ صحرا



شكل ۵۱-۴- کنگر وحشی



شكل ۵۴-۴- سس



شكل ۵۳-۴- سلمه تره



شكل ۵۶-۴- سلمه تره



شكل ۵۵-۴- پنیرک

پیمانه مهارتی: عملیات داشت چغدرقند

شماره شناسایی: ۱۴-۱-۷۴/ک

مهارت: کشت چغدرقند

شماره شناسایی: ۱۴-۱-۷۴/ک



شکل ۴-۵۸—تمشک وحشی



شکل ۴-۵۷—گاورس



شکل ۴-۵۹—تاجریزی

جدول ۴-۲ - علفهای هرز چغدرقد

ردیف	نام علمی	نام فارسی	مناطق انتشار اقتصادی	تیره	زیاد	تمام مناطق
۱	Amaranthus sp	تاج خروس		تاجخ	زیاد	اکثر مناطق
۲	Acroptilon repenes L.				زیاد	اکثر مناطق
۳	Centaurea SP.	گل گندم			کم	اکثر مناطق
۴	Cichorium intybus L.	کاسنی			کم	همه مناطق
۵	Lactuca SP.	گاوچاک کن			کم	اکثر مناطق
۶	Sonchus asper Vill	شیر تیغک			کم	کرج
۷	Xanthium spinosum L.	توق			کم	کرج
۸	Chenopodium album L.	سلمک			زیاد	همه مناطق
۹	Convolvulus arvensis L.	پیچک			کم	اکثر مناطق
۱۰	Conringia orientalis	حومه کرج		—	زیاد	حومه کرج
۱۱	Lepidium draba L.	ارمک			زیاد	اکثر مناطق
۱۲	Crosophora tinctoria (L.) Raf.	گوش بره			زیاد	کرج
۱۳	Euphorbia helioscopia L.	شیرسگ	همدان، فارس		کم	اکثر مناطق
۱۴	Fumaria Vaillantii. Lois.	شاه تره			کم	تمام مناطق
۱۵	Cynodon dactylon L.	مرغ			زیاد	اکثر مناطق
۱۶	Echinochloa crus - galli Beav.	سوروف			زیاد	کرج
۱۷	Phragmites communis Trin.	نی			زیاد	اکثر مناطق
۱۸	Setaria viridis L.	گاورس			زیاد	اکثر مناطق
۱۹	Avena ludoviciana Durieu.	بولاف			کم	اکثر مناطق
۲۰	Astragalus SP.	خارشتر			کم	تمام مناطق
۲۱	Glycyrrhiza glabra L.	شیرین بیان			زیاد	کرج، خوزستان
۲۲	Medicago sativa L.	بونجه			کم	تمام مناطق
۲۳	Melilotus officinalis Lam.	بونجه زرد			کم	کرج
۲۴	Goebelia alopecuroides Bge.	تلخ بیان			کم	کرج
۲۵	Althea SP.	خطمی	اکثر نقاط		کم	
۲۶	Malva SP.	پنیرک			زیاد	
۲۷	Rumex crispus L.	ترشک			کم	اکثر مناطق
۲۸	Hulthemia persica Mich.	ورک	مناطق مرکزی		کم	
۲۹	Atriplex SP.	شور	مناطق جنوبی و مرکزی		کم	
۳۰	Solanum nigrum L.	تاج بیزی	اکثر مناطق		زیاد	
۳۱	Tribulus terrestris L.	خارج خسک			کم	اکثر مناطق
۳۲	Sorghum halepense L.	قیاق			زیاد	اکثر مناطق
۳۳	Portulaca oleracea L.	خرفه			زیاد	اکثر مناطق

کار عملی

۱- علفهای هرز روییده در مزرعه چغندرقند را (به کمک مریبان) جمع آوری، شناسایی و نگهداری نمایید و نوع آنها را از نظر یکساله و چندساله مشخص کنید.

۲- راههای ورود و توسعه علفهای هرز در مزرعه چغندرقند را بررسی و تعیین کنید. به عواملی مثل استفاده از کود تازه، بذر ناخالص، انتقال بهوسیله آب و باد و ادوات، باقی بودن علفهای هرز از زراعت قبلی، عدم تهیه مناسب زمین و ... توجه داشته باشید.

کنترل علفهای هرز: در اوایل رشد چغندرقند اگر در مزرعه علف هرزی دیده می شود همراه با تنک کردن، آنها را وحین کنید. با این عمل اولاً موجب رشد چغندرقند شده، مجالی به رشد علفهای هرز نمی دهد ثانیاً امکان تولید بذر و تکثیر مجدد علفهای هرز را از بین می برد.

روش مکانیکی: در روش مکانیکی در زراعتها ریفی و سطوح وسیع، از کولتیواتورها برای کنترل علفهای هرز در بین ریفها استفاده نمایید (شکل ۴-۶). با کولتیواتور زدن، عملیات سله شکنی و بعضًا خاک دادن پای بوته ها را به طور همزمان انجام دهید.

در زراعتها در هم و یا سطوح محدود وحین را با دست و با استفاده از فوکا انجام دهید.

وحین را در ۲ تا ۳ مرحله در اوایل رشد زراعت انجام دهید. بعضًا ممکن است تا ۵ بار نیاز به وحین داشته باشید.

در صورت اقدام به وحین دستی و ریختن خاک در داخل

شیارها و ایجاد مشکل برای آبیاری، نسبت به ترمیم جویها (شیارها)

با دست یا بیل و یا کولتیواتور (ماشینی) اقدام کنید.

توجه داشته باشید که در وحین مکانیزه نیز امکان از بین بردن

علفهای هرز روی ریف بهوسیله ماشین مشکل و بعضًا غیرممکن

است در این روش نیز نیاز به تلفیق عملیات دستی و ماشینی خواهد داشت.



شکل ۴-۶- استفاده از کولتیواتور دوار در زراعت چغندرقند

پیمانهٔ مهارتی: عملیات داشت چغندرقند

شمارهٔ شناسایی: ۱۴-۱-۷۴/ک

مهارت: کشت چغندرقند

شمارهٔ شناسایی: ۱۴-۱-۷۴/ک

روش شیمیایی: کنترل شیمیایی علفهای هرز در زراعت چغندرقند را می‌توانید با سهولت بیشتر و عملیات کمتری نسبت به سایر روشها انجام دهید. در مراحل مختلف (با توصیه کارشناسان)، از علف‌کش‌های زیر استفاده نمایید.

الف - قبل و یا همزمان با کاشت: از علف‌کش پیرامین به نسبت ۳ تا ۵ کیلوگرم در هکتار استفاده کنید. علف‌کش را در زمین پخش نموده، به کمک دیسک با خاک مخلوط کنید.

ب - پس از سبزشدن چغندرقند، از علف‌کش‌های کاملاً انتخابی مثل بتانال استفاده کنید تا آسیبی به زراعت وارد نشود. بتانال را به نسبت ۱ تا ۲ لیتر براساس توصیه‌های فنی مورد استفاده قرار دهید.

علف‌کش‌های زیادی در زراعت چغندرقند دارای کارآیی و استفاده هستند، که با اسمای تجاری مختلف به بازار عرضه می‌شوند.

با مهمترین علف‌کش‌های مؤثر در کنترل با علفهای هرز چغندرقند در مراحل مختلف رشد زراعت در جدول ۴-۳ آشنا می‌شوید:

جدول ۴-۳ - علف‌کش‌های مؤثر در کنترل با علفهای هرز چغندرقند

نام معمولی	نام تجاری	زمان مصرف	میزان مصرف (کیلوگرم در هکتار)
بن رود و کسن	تاب مید	پس از سبزشدن	۱/۵ تا ۲/۲۵
دالوپون	دوپون	=	۶/۸ تا ۳/۴
تی. سی. آ	تی. سی. آ	پیش از سبزشدن	۶/۸ تا ۱۰
تری فولارین	ترفلان	پس از کاشت	۰/۵۶۲ تا ۰/۸۴۵
باربان	کاربین	پس از سبزشدن	۰/۱۲۵ تا ۰/۱۴۵
آی. بی. سی	بتانال	پس از کاشت و برداشت	۶/۸ تا ۳/۴
اندوتال	اندوتال	پیش از سبزشدن و پس از کاشت	۵ تا ۳/۴
پیازون	پیرامین	پیش و پس از کاشت و پس از سبزشدن	۴/۵ تا ۳/۶
سايكلووات	رونیت	پیش از کاشت	۴/۵ تا ۲/۸

برای کنترل شیمیایی با استفاده از علف کشها، نکات زیر را رعایت نمایید :

- ۱- در پخش سموم به صورت گرد، قبل از کاشت زمین را کاملاً به صورت صاف و بدون کلوخ آماده کنید.
- ۲- در حرارت‌های کمتر از ۱۵ درجه از علف کش استفاده نکنید زیرا کارآیی لازم را ندارد. بهترین درجه حرارت برای استفاده از علف کشها ۱۸ تا ۲۲ درجه و رطوبت ۷۰ درصد است. بهتر است به هنگام عصر سمپاشی را انجام دهید.
- ۳- علف کشها را موقع کاشت در زمانی انجام دهید که فاصله‌ای تا زمان آبیاری وجود نداشته باشد.
- ۴- برای کنترل علفهای هرز پهن برگ، بعد از سبزشدن زراعت، توجه داشته باشید که برگهای حقیقی چغندرقند تشکیل شده باشد و گرنه بوته‌های چغندرقند در اوایل رشد دچار سوختگی و نابودی می‌شوند.
- ۵- در سطوح کوچک، از سمپاش پشتی با فشار ۱/۵ تا ۲ آتمسفر و در سطوح وسیع از سمپاشهای تراکتوری (شکل ۶۳) در صورت کشت ردیفی با فشار سمپاش در حد ۲/۵ تا ۴ آتمسفر استفاده کنید. اگر علفهای هرز به صورت موضعی وجود دارد نیازی به سمپاشی کل مزرعه نیست. در این گونه موقع از سمپاش پشتی استفاده کنید.
- ۶- در بعضی مواقع که تنوع علفهای هرز پهن برگ و نازک برگ دیده می‌شود براساس توصیه‌های ترویجی و کارشناسی از مخلوط دو علف کش در زراعت استفاده کنید.



شکل ۶۱-۴- سمپاشی مزرعه چغندرقند

کار عملی

کنترل علفهای هرز را در بنه آموزشی یا مزرعه چغندرقند در مراحل مختلف و با روش‌های مورد آموزش در این پیمانه مهارتی انجام دهید :

پیمانه‌مهارتی: عملیات داشت چغدرقدن شماره‌شناسایی: ۱۴-۱-۷۴/ک	مهارت: کشت چغدرقدن شماره‌شناسایی: ۱۴-۱-۷۴/ک
--	--

آزمون پایانی

- ۱- روش‌های آبیاری چغدرقدن را نام ببرید.
- ۲- نیاز آبی چغدرقدن در موقع جوانه‌زدن نسبت به سایر گیاهان چگونه است؟
- الف: نصف نیاز سایر گیاهان ب: به اندازه سایر گیاهان ج: دو برابر سایر گیاهان د: چهار برابر سایر گیاهان
- ۳- فواصل آبیاری چغدرقدن را در فصول مختلف ذکر کنید.
- ۴- در آبیاری اراضی شور، کدام روش توصیه می‌شود؟
- الف: دبی کم مدت زمان طولانی ب: دبی زیاد مدت زمان زیاد ج: دبی کم مدت زمان کم د: دبی زیاد مدت زمان کم
- ۵- بازدهی کار با کولتیواتورهای دستی در زراعت ردیفی با ۸ ساعت کار چه میزان است؟
- الف: ۲۰۰ مترمربع ب: ۱۰۰۰ مترمربع ج: ۴۰۰۰ مترمربع د: ۲۰،۰۰۰ مترمربع
- ۶- در تنک کردن، تراکم مناسب بوته چه میزان باید در نظر گرفته شود؟
- الف: ۱ تا ۲ بوته در مترمربع ب: ۲ تا ۵ بوته در مترمربع ج: ۸ تا ۱۰ بوته د: ۲۰ بوته
- ۷- تنک کردن چغدرقدن در چند مرحله و چگونه انجام می‌شود؟
- ۸- کود ازته معمولاً در نوبت و به میزان تقریبی کیلوگرم به عنوان کود سرک مصرف می‌شود.
- ۹- رنگ سبز تیره در برگها نشانه کمبود کدام عنصر غذایی است؟
- الف: ازت ب: فسفر ج: پتاس د: کلسیم
- ۱۰- وجین به روش مکانیکی در زراعت چغدرقدن، در چند مرحله و با چه وسایلی انجام می‌شود؟
- ۱۱- پس از سبزشدن زراعت چغدرقدن کدام علف کش را مورد استفاده قرار می‌دهید؟
- الف: پیرامین ب: بتانال ج: رونیت د: اندوتال
- ۱۲- برای کنترل علفهای هرز پهن برگ پس از سبزشدن چغدرقدن، به چه موردی باید توجه داشته باشید؟
- ۱۳- کنترل شتۀ سیاه را توضیح دهید.
- ۱۴- طرز واردآمدن خسارت و علایم آن در زراعت چغدرقدن به وسیله مگس چغدرقدن را بنویسید.
- ۱۵- مشخصات ظاهری برگخوار چغدرقدن (کارادرینا) را ذکر کنید.
- ۱۶- در مبارزه با کدام آفت از طعمه مسموم استفاده می‌شود؟
- الف: شتۀ سیاه ب: کارادرینا ج: بید چغدرقدن
- د: شب پره زمستانی (اگروتیس)
- ۱۷- زیست‌شناسی بید چغدرقدن (پروانه لیتا) را شرح دهید.
- ۱۸- خصوصیات و علامت مشخصه لارو شب پره گاما را ذکر نمایید.
- ۱۹- در روش شیمیایی کنترل سفیدک سطحی (حقیقی) از چه سوموم استفاده می‌شود؟ یک مورد را ذکر کنید.
- ۲۰- طرز خسارت نماتد را در چغدرقدن بنویسید.

پیمانه مهارتی: عملیات برداشت چغندر قند

شماره شناسایی: ۱۴-۵-۷۴/ک

مهارت: کشت چغندر قند

شماره شناسایی: ۱۴-۱-۷۴/ک

عملیات برداشت چغندر قند

هدف کلی

توانایی برداشت محصول چغندر قند

هدفهای رفتاری: فرآگیر پس از گذراندن این پیمانه مهارتی، باید بتواند :

۱- زمان مناسب برداشت را تعیین نماید.

۲- سرزنه، کندن، ردیف کردن و بارگیری چغندر قند را انجام دهد.

۳- ماشینهای برداشت چغندر قند را توضیح دهد.

۴- محصول را با کیفیت مناسب به کارخانه تحویل نماید.

مهارت‌های مورد نیاز

استاندارد برداشت محصول

وسایل، تجهیزات و امکانات مورد نیاز

بیل، چنگک، تراکتور، غده کن و در صورت امکان ماشین آلات برداشت، تریلی، وسایل حمل محصول، چاقوی سرزنه، مزرعه چغندر قند آماده برداشت

زمان به ساعت	
عملی	نظری
۱۲	۴

پیش آزمون

- ۱- تفاوت رسیدن تجاری و فیزیولوژیکی را توضیح دهید.
- ۲- از عوامل اقتصادی مؤثر در برداشت محصول، حداقل ۶ مورد را ذکر کنید.
- ۳- نحوه اتصال غده‌کنها را به تراکتور و چگونگی تنظیم عمق کار را توضیح دهید.
- ۴- چه عواملی موجب تلفات یا ضایعات محصول در ضمن برداشت می‌باشد.
- ۵- در دستگاه چغندریاب فاصله چاقو و چرخ کنگره و در چغندرکن فاصله عقب تیغه‌ها به ترتیب چه میزان است؟

ب : ۷۰ میلیمتر، ۲۸ سانتیمتر

د : ۷۵ تا ۱۰۰ میلیمتر، ۳۸ میلیمتر

۶- تلفات ناشی از تأخیر در برداشت محصولات کشاورزی را ذکر کنید.

۷- زمان برداشت در گیاهان غده‌ای و رشته‌ای را توضیح دهید.

۸- سرویس و نگهداری غده‌کنها را توضیح دهید.

۹- بازدهی برداشت گیاهان غده‌ای با وسایل دستی (مثل بیل) به طور روزانه تقریباً چه میزان است؟

ب : ۲۰۰۰ تا ۲۵۰۰ مترمربع

الف : ۵۰۰ تا ۱۰۰۰ مترمربع

ج : ۵۰۰۰ مترمربع

۱۰- تلفات ناشی از خبره‌بودن برداشت کننده محصول در روش دستی را ذکر نماید.



برداشت چغندر قند

فاصله کاشت تا برداشت چغندر قند، بر حسب نوع رقم ۱۵° تا ۲۷° روز است. برداشت باید موقعی انجام شود که وزن غده و درصد قند به حداقل رسیده باشد. برای برداشت به زمان شروع کار کارخانجات قند محلی توجه داشته باشید و از طرفی تا زمانی که درجه حرارت محیط کشت بیشتر از ۴ درجه سانتیگراد باشد رشد چغندر قند از نظر افزایش وزن و افزایش قند ادامه دارد. در مناطق گرمسیر در حرارت ۴ درجه و بالاتر رشد و ذخیره سازی قند به حداقل می رسد.



شکل ۱-۵- مزرعه چغندر قند در اوایل دوره رشد و نمو

علایم رسیدگی چغندر قند

- ۱- زرد شدن برگ های مسن
- ۲- حالت پژمردگی برگها
- ۳- کند شدن رشد برگ های جوان و اندام های هوایی در خاتمه دوره رشد، برداشت باید هر چه زودتر انجام شود. در مناطق سرد و معتدل محاسن تعجیل در برداشت عبارت است از:
 - ۱- وجود فرصت کافی برای آماده کردن و حمل محصول به کارخانه
 - ۲- جلوگیری از کاهش محصول و کاهش درصد قند ناشی از بروز سرما و یخ بندان
 - ۳- وجود فرصت کافی در تناوب، برای کشت گندم بعد از برداشت چغندر قند در پاییز

فکر کنید و پاسخ دهید

- ۱- حدائق سه مورد از معایب تأخیر در برداشت چغندر قند را ذکر نمایید.
- ۲- محاسن تعجیل در برداشت چغندر قند در مناطق گرمسیر چیست؟

فصل برداشت

در کشت بهاره، برداشت چغندر قند، در فصل پاییز قبل از سرمای زمستان باید انجام شود. دورهٔ برداشت از اوایل مهر تا آذرماه می‌تواند ادامه داشته باشد. در کشت پاییزه در مناطق گرمسیر برداشت از فروردین تا خردادماه انجام می‌شود.

جدول ۱-۵- جدول زمانی برداشت چغندر قند در نقاط مختلف کشور

استان	مناطق کاشت	مناسبتین زمان برداشت
آذربایجان	اشنوه	از حدود اوایل مهر تا اواسط آبان
	ارومیه (رضائیه)	از حدود اواسط مهر تا اوایل آبان
	بوکان	از حدود اوایل مهر تا اواسط آبان
	پیرانشهر	از حدود اواسط مهر تا اواسط آبان
	خوی	از حدود اوایل تا اواخر مهر
	شاپور	از حدود اوایل تا اواخر مهر
	تقده	از حدود اواسط مهر تا اواسط آبان
	میاندوآب	از حدود اوایل مهر تا اواسط آبان
	مهاباد	از حدود اواسط مهر تا اوایل آذر
	اصفهان (سردیسیر)	از حدود اوایل مهر تا اواخر آبان
اصفهان	اصفهان (معتل)	از حدود اوایل مهر تا اواخر آبان
	شهرضا	از حدود اواسط مهر تا اواخر آبان
	کوهرنگ	از حدود اواسط مهر تا اواخر آبان
	گلپایگان	از حدود اواسط مهر تا اواخر آبان
	ایلام	ایوان و سایر نقاط
کرمانشاهان	ایلام	از حدود اواسط آبان تا اواسط آذر
	اسلامآباد (شاهآباد غرب)	از حدود اوایل شهریور تا اواخر مهر
	پاوه (معتل)	از حدود اوایل شهریور تا اواخر مهر
	سنقر و کلیانی	از حدود اوایل شهریور تا اواخر مهر
	قصرشیرین	از حدود اوایل شهریور تا اواخر مهر
تهران	کرمانشاه	از حدود اوایل شهریور تا اواخر مهر
	پاوه (معتل)	از حدود اوایل شهریور تا اواخر مهر
	کرج و حومه	از حدود اوایل مهر تا اواخر آبان
چهارمحال و بختیاری	بروجن	از حدود اواسط شهریور تا اواسط مهر
	شهرکرد	از حدود اواسط شهریور تا اواسط مهر

از حدود اوایل مهر تا اواخر آبان	بجنورد	
از حدود اوایل مهر تا اوایل آبان	بیرجند	
از حدود اوایل مهر تا اوایل آبان	تریت جام	
از حدود اوایل مهر تا اوایل آبان	تریت حیدریه	
از حدود اوایل مهر تا اواخر آبان	چناران	
از حدود اوایل مهر تا اواخر آبان	سبزوار	خراسان
از حدود اوایل مهر تا اواخر آبان	شیروان	
از حدود اوایل مهر تا اواخر آبان	فریمان	
از حدود اوایل مهر تا اواخر آبان	قوچان	
از حدود اوایل مهر تا اوایل آبان	کاشمر	
از حدود اوایل مهر تا اواخر آبان	مشهد	
از حدود اوایل مهر تا اواخر آبان	نیشابور	
از حدود اوایل اسفند تا اواخر اردیبهشت	اهواز	
از حدود اوایل اسفند تا اواخر اردیبهشت	حسین آباد	خوزستان
از حدود اوایل اسفند تا اواخر اردیبهشت	دزفول	
از حدود اوایل اسفند تا اواخر اردیبهشت	شوستر	
از حدود اوایل مهر تا اواخر آبان	قزوین و حومه	زنجان
از حدود اوایل مهر تا اواخر آبان	سمنان	سمنان
از حدود اوایل مهر تا اواخر آبان	شاہرود	
از حدود اوایل آبان تا اواخر آذر	آباده	
از حدود اوایل مهر تا اواسط آذر	اقلید	
از حدود اوایل مهر تا اواسط آذر	فسا	
از حدود اوایل آبان تا اواسط دی	فیروزآباد	
از حدود اوایل آبان تا اواسط دی	کازرون (گرم)	
از حدود اوایل آبان تا اوایل دی	کازرون (معتدل)	فارس
از حدود اوایل مهر تا اواسط آذر	کوار	
از حدود اوایل مهر تا اواسط آذر	مرودشت	
از حدود اوایل مهر تا اواسط آذر	ممسمی	
از حدود اوایل مهر تا اواسط آذر	نیریز	
از حدود اوایل مهر تا اواسط آذر	یاسوج	

از حدود اوایل تا اواخر آبان	بیجار	
از حدود اوایل تا اواخر آبان	سقز	کردستان
از حدود اواسط مهر تا اواسط آبان	مریوان	
از حدود اوایل آبان تا اواخر آذر	بردسیر	
از حدود اوایل آذر تا اواخر دی	سیرجان	کرمان
از حدود اوایل آبان تا اواخر آذر	کرمان	
از حدود اواسط مهر تا اواسط آبان	بروجرد	لرستان
از حدود اوایل تا اواخر آبان	خرم آباد	
از حدود اوایل تا اواخر مهر	اراک و حومه	مرکزی
از حدود اوایل مهر تا اواخر آبان	توضیگان	
از حدود اوایل مهر تا اواخر آبان	ملایر	
از حدود اوایل مهر تا اواخر آبان	نهاوند	همدان
از حدود اوایل مهر تا اواخر آبان	همدان	

عملیات برداشت چغندرقند

مراحل برداشت چغندرقند شامل کندن و خارج کردن ریشه از خاک، سرزنه و برگزنه و جمع‌آوری و آماده‌سازی محصول برای حمل است. عملیات برداشت چغندرقند به دو روش دستی و مکانیکی انجام می‌شود. در هر دو روش، در صورتی که قبل از برداشت سطح خاک خیلی سفت باشد با یک آبیاری سبک عملیات برداشت را می‌توانید با سهولت بیشتری انجام دهید.

الف - روش دستی: استفاده از این روش در زراعتهای کرتی، غیرردیفی و سطحی کوچک معمول است. نحوه و اصول برداشت در این روش عبارت است از :

۱- کندن ریشه: عملیات کندن ریشه با استفاده از بیل و یا چنگالهای مخصوص انجام می‌شود هرچند که در برداشت دستی کیفیت محصول بیشتر حفظ می‌شود ولی این روش، معایب زیادی هم دارد از جمله :

الف - به نیروی انسانی بیشتری نیاز دارد و به همین دلیل، هزینه برداشت زیادتر خواهد بود. در این روش، به وسیله یک نفر نیروی انسانی با ۸ ساعت کار روزانه، محصول حدود ۶۰۰ تا ۸۰۰ مترمربع را می‌توانید از خاک خارج نمایید.



شکل ۲-۵- شخم مزرعه برای برداشت غده‌ها



شکل ۵-۳— سرزنى دستى چغندر قند



شکل ۵-۴— قطع برگها و دم برگها



شکل ۵-۵— چغندرهای سرزده آماده بردن



شکل ۶-۵— بارگیری چغندر قند

ب— به دلیل کوتاه بودن روزها در پاییز بازدهی برداشت خیلی کم است.

ج— با طولانی شدن دوره برداشت، احتمال بروز ضایعات فراوان در محصول وجود دارد.

۲— سرزنى و برگ زنى: پس از کندن محصول از زمین، باید بلا فاصله عملیات حذف برگ و طوقه انجام شود (شکل ۵-۵). دلایل انجام این عملیات عبارت است از: بیشترین مواد ناخالص و کمترین مقدار قند در طوقه وجود دارد.

بعد از برداشت، فعالترین قسمت ریشه ازنظر تنفس طوقه است و با ادامه تنفس موجب کاهش وزن ریشه می شود. وجود برگ، دم برگ و طوقه در سیلو موجب فاسد شدن محصول می گردد.

رشد برگها و جوانه ها در روی طوقه موجب کاهش مواد ذخیره ای ریشه می شود.

برای حذف برگ و طوقه توجه داشته باشید که: اولاً از کارد یا چاقو و وسایل لبه تیز برای قطع برگها و طوقه استفاده نکنید تا سطح زخمی کمتری در ریشه ایجاد شود، زیرا آسیب دیدن زیاد ریشه، محیط مناسبی برای نفوذ و رشد باکتریها، فارچها و مخمرها بوجود می آورد.

ثانیاً در سرزنى نیاز به حذف کامل طوقه وجود ندارد زیرا موجب کاهش محصول خواهد شد طوقه را به گونه ای قطع نمایید که امکان رشد مجدد برگها و جوانه ها وجود نداشته باشد.

ثالثاً همراه با سرزنى عملیات حذف ریشه های اضافی را نیز انجام دهید. پس از عملیات سرزنى برای جلوگیری از کاهش وزن و فساد یا فعال شدن جوانه های خفت باقیمانده در روی طوقه، سعی کنید هرچه زودتر محصول را به کارخانه حمل نموده، تحویل دهید (شکل ۶-۵).

پیمانهٔ مهارتی: عملیات برداشت چغندر قند

شمارهٔ شناسایی: ۱۴-۱-۷۴/ک

مهارت: کشت چغندر قند

شمارهٔ شناسایی: ۱۴-۱-۷۴/ک



شکل ۷-۵- سیلوی چغندر در مزرعه با پوشش شاخ و برگ و علف برای جلوگیری از خشک شدن

در صورت ناکافی بودن محصول برای حمل، عدم دسترسی به وسایل حمل و نقل و یا آماده نبودن کارخانه، حتماً محصول را در محلی به صورت که درآورده، روی آنرا با کاه و کلش پوشانید، تا در معرض تابش مستقیم نور خورشید فرارند اشته باشد (شکل ۷-۵).

کار عملی


۱- حداقل 200 مترمربع از زراعت چغندر قند را به روش دستی برداشت نمایید.

۲- طول زمان برداشت را در این سطح (200 مترمربع) محاسبه نمایید و نیاز به نیروی انسانی را برای سطح یک هکتار به روش دستی محاسبه کنید.


۳- کیفیت برداشت محصول را بررسی نموده، نقاط ضعف و قوت آن را تعیین کنید و در گزارش کار ارائه دهید.

ب- برداشت با وسایل مکانیکی: با توجه به اینکه عملیات برداشت چغندر قند (شامل کندن، سرزنشی، ردیف کردن، بارگیری و حمل) بسیار پرهزینه است و یکی از مهمترین عوامل غیراقتصادی بودن کشت و توسعه این محصول به شمار می‌آید وسایل مکانیکی متعددی برای انجام مراحل برداشت چغندر قند تهیه گردیده است که هر کدام از آنها یک یا چند مرحله از برداشت را انجام می‌دهند. اینک، با وسایل مهم برداشت و نحوه استفاده از آنها آشنا می‌شوید.

۱- دستگاه چغندرکن (لیفتر): این دستگاه به صورت یک ردیفه و یا دو ردیفه، شامل شاسی و تیغه‌های خارج کننده ریشه است که با نیروی تراکتور در زراعتهای ردیفی قابل استفاده می‌باشد (شکل ۷-۸). برای استفاده از این وسیله، تیغه‌ها را بر روی شاسی متناسب با فواصل کاشت ردیفها تنظیم کنید و عملیات کندن و خارج کردن ریشه‌ها را با تراکتور انجام دهید. با این وسیله فقط ریشه‌ها از خاک خارج شده، در مسیر حرکت باقی می‌ماند که باید باقی عملیات شامل سرزنشی و حمل را به وسیله نیروی انسانی انجام دهید. با این دستگاه روزانه می‌توانید با 8 ساعت کار حدود $3/5$ هکتار زمین را برداشت نمایید.




شکل ۷-۸- چغندرکن




شکل ۹-۵—وسایل دور دیفه جهت خارج کردن ریشه چغندر از خاک

در کندن ریشه‌ها به وسیله چغندرکن، فاصله تیغه‌ها را بدرستی تنظیم کنید تا ریشه‌ها حین برداشت صدمه نبینند. در اراضی سنگین و یا موقعی که قدرت تراکتور کم است برداشت را با یک ردیف از دستگاه انجام دهید و تیغه‌های ردیف دوم را حذف کنید در مواقعی که رشد اندامهای هوایی زیاد است. برای کاهش تراکم و جلوگیری از جمع شدن ریشه‌ها در فاصله بین تیغه و چرخهای عقب تراکتور تیغه‌ها را برای برداشت یک در میان خطوط تنظیم نمایید.

در صورتی که دستگاه چغندرکن در اختیار ندارید می‌توانید از گاوآهن تراکتوری با حذف صفحه‌های برگردان استفاده کنید. برای این کار، بکوشید حتماً چرخهای تراکتور بین ردیفها حرکت نمایید در فاصله کاشت خطوط با حدود ۶۰ سانتیمتر مشکل زیادی برای برداشت به این طبق نخواهد داشت.



شکل ۱۰-۵



شکل ۱۱-۵—نمایش قطع ریشه بیش از اندازه با وسایل مختلف

۲—وسایل مکانیکی سرزن: این وسایل چند ردیفه‌اند و با کاردهای مخصوصی که دارند با حرکت روی بوته‌ها عمل سرزنی را انجام می‌دهند (شکل ۱۰-۵) در استفاده از وسایل مکانیکی سرزنی توجه داشته باشید که :

الف—کشت به صورت ردیفی باشد.
ب—تنظیمهای مربوط را بدقت انجام دهید، تا عملیات حذف برگ و طوقه به اندازه انجام شود.
فاصله زیاد، موجب باقی ماندن برگ و طوقه می‌شود و فاصله خیلی کم باعث قطع و از بین رفتن قسمتی از محصول می‌گردد.

حذف و از بین رفتن محصول را در اثر عدم تنظیم می‌توانید در شکل ۱۱-۵ مشاهده نمایید. یک سانتیمتر برش اضافه ۸ درصد و ۳ سانتیمتر برش اضافه، ۲۲ درصد تلفات محصول را به همراه دارد.

پیمانه‌مهارتی: عملیات برداشت چغندر قند

شماره‌شناسایی: ۱۴-۱-۷۴/ک

مهارت: کشت چغندر قند

شماره‌شناسایی: ۱۴-۱-۷۴/ک



شکل ۱۲-۵-برداشت ماشینی سرزنی چغندر



شکل ۱۳-۵-کندن غده‌ها با ماشین



شکل ۱۴-۵-ردیف کردن چغندرهای کنده شده



شکل ۱۵-۵-ردیف‌های چغندر آماده بردن به کارخانه

ج- از این وسیله در اراضی مسطح و هموار استفاده کنید تا ضایعات محصول کاهش یابد.

۳- کماین: در سطوح وسیع و برای اقتصادی شدن تولید چغندر قند، از کماین استفاده نمایید. کماینهای در انواع مختلف ساخته شده‌اند. تعدادی از آنها، برگها را قطع می‌کنند و می‌توانند آنها را در مخازنی جمع‌آوری کنند که بعداً از این برگها می‌توانند برای خوراک دام و یا سیلو کردن استفاده نمایید.



دسته‌ای دیگر پس از قطع برگها آنها را خرد کرده، در زمین پخش می‌نمایند و باعث افزایش ماده‌آلی خاک می‌شوند.

کماینهای کامل‌تر، عملیات سرزنی و خارج کردن ریشه‌ها را انجام می‌دهند و محصول را یا در ردیفهایی بر روی زمین باقی می‌گذارند و یا در مخازنی جمع‌آوری می‌نمایند.

توجه داشته باشید که کماینهای چغندر قند عموماً کششی هستند و نیاز به تراکتورهایی با نیروی محرکه زیاد دارند و قسمتهای برداشت کننده مجزاست و جدا از هم عملیات را انجام می‌دهند. این قسمتهای مجزا شامل برگ‌زن، چغندرکن و بارکن است. کماینهایی که دو مرحله را توأم انجام می‌دهند مثل چغندرکنی و بارگیری، نیاز به نیروی کششی 11° قوه اسب دارند. با این کماینهایها امکان برداشت ۸ هکتار محصول در یک روز وجود دارد.



شکل ۱۶-۵- برداشت مکانیزه چغندر قند در دو مرحله (کنند، سرزدن) و بارگیری



شکل ۱۷-۵- کمباین چغندر قند

در برداشت چغندر قند به وسیله کمباین به نکات زیر توجه داشته باشید :

- ۱- استفاده از کمباین تنها در اراضی وسیع و تعابنها و یا به صورت اجاره مقرن به صرفه می باشد چون هزینه تهیه کمباین و خرید و تأمین لوازم یدکی آن زیاد است.
- ۲- از کمباین در اراضی مسطح و کشت منظم و ردیفی استفاده نمایید.
- ۳- در استفاده از کمباین به تنظیم دقیق سرزن و غده کن توجه داشته باشید.
- ۴- در برداشت با کمباین قسمتی از دمبرگها و طوقه با ریشه باقی می ماند و خاصیت سیلو کردن این گونه محصولات کمتر است.
- ۵- همزمان با استفاده از کمباین، وسیله حمل را تهیه نمایید تا محصول توسط بارکن، بارگیری و هزینه تخلیه بار در حاشیه مزرعه و بارگیری مجدد برای حمل به کارخانه وجود نداشته باشد.

کار عملی

- ۱- با قیمانده زراعت چغندر قند را با استفاده از وسایل مکانیکی برداشت نمایید.
- ۲- بازدهی عملکرد را در این مزرعه به هکتار محاسبه نمایید و با بازدهی روش دستی مقایسه کنید.
- ۳- کیفیت برداشت مکانیکی را بررسی و با روش دستی مقایسه کنید.
- ۴- در صورتی که کمباین برداشت چغندر قند در محل وجود ندارد با بازدید از مزارع در حال برداشت به وسیله کمباین بازدهی و کیفیت برداشت با کمباین را محاسبه و بررسی نمایید.

حفظ کیفیت چغندر قند

در تولید و برداشت چغندر قند، به حفظ کیفیت توجه زیادی داشته باشید. در حال حاضر کارخانجات ارزش و قیمت خرید را براساس کیفیت محصول تعیین می‌کنند. مهمترین عواملی که در کیفیت چغندر قند اثر دارد عبارت اند از:

۱— عدم وجود ناخالصی و افت کمتر محصول: در آماده‌سازی محصول برای حمل و تحویل به کارخانه دقت نمایید مواد اضافی از جمله سنگ و مواد غیر محلول در آب، علف و برگ‌های سبز و همچنین گل و لای همراه محصول نباشد زیرا در کارخانه برای تعیین افت، این مواد جدایشده، همراه باشستشوی، نسبت وزنی آن در کل محصول تحویلی محاسبه می‌گردد و ضمن اینکه وزن کلی کاهش می‌یابد قیمت کمتری نیز برای محصول تعیین می‌شود. علاوه بر اینکه، مجبور خواهد بود هزینه بارگیری و حمل این ضایعات را نیز پرداخت نمایید.

۲— درصد قند یا عیار چغندر قند: مهمترین عاملی که در حال حاضر در تعیین قیمت محصول چغندر قند نقش دارد درصد قند پیشتر ریشه می‌باشد. با رعایت اصول زراعی خصوصاً به هنگام برداشت نسبت به بالابودن درصد قند دقت داشته باشید. نمونه‌برداری در کارخانه به طرق مختلف انجام می‌شود. به هر حال توجه داشته باشید قسمتهایی مثل طوقه را که قند کمتری دارد به اندازه جدا کرده باشید تا در عیارسنجی، محصول شما قیمت بیشتری به دست آوردد.

نمونه‌برداری با دست یا چنگک: نمونه‌برداری در موقع اضطراری به این طریق انجام می‌شود. برای نمونه‌گیری که از قسمت فوقانی محصول انجام می‌گیرد نماینده کارخانه و فروشنده محصول هر کدام ۱۵ نمونه ریشه را انتخاب می‌کند و سپس آنها را مخلوط کرده، مورد عیارسنجی قرار می‌دهند.

نمونه‌برداری با سوند یا دستگاه رویرو: در این روش از یک سیلندر مکعب مستطیل استفاده می‌شود که از بالای محموله داخل محصول می‌شود و ریشه‌هایی را که داخل سیلندر قرار



شکل ۱۸-۵— شستن چغندر



شکل ۱۹-۵- نمونه برداری از روی دستگاه تخلیه و یا نوار نقاله



شکل ۲۰-۵- ریشه



شکل ۲۱-۵- سیلوی چغندر در مزرعه با پوشش شاخ و برگ و علف و خاک برای جلوگیری از بخزدن

می گیرد به بیرون منتقل می کند. پس از آن ، عمل توزین و آزمایش عیارسنجد صورت می گیرد.

نمونه برداری از روی دستگاه تخلیه و یا نوار نقاله: در این روش نمونه برداری به صورت تصادفی و حین انتقال چغندرها به سیلو انجام می شود. نمونه هایی که به وسیله بیلچه یا بعد از آن روی نقاله برداشت شده، به قسمت عیارسنجد منتقل می گردد (شکل ۱۹-۵).

۳- سالم بودن و حفظ طراوت ریشه ها: دقت داشته باشید که برداشت و نگهداری و حمل محصول، با رعایت اصول برداشت و نگهداری ریشه ها با حداکثر وزن و کیفیت به کارخانه تحویل گردد. نکاتی که در این زمینه باید رعایت شود عبارت است از :

الف - برداشت صحیح: ریشه ها را سالم و بدون زخم خوردگی برداشت نمایید (شکل ۲۰-۵). در اثر آسیب دیدن ریشه ها قسمتی از محصول در مزرعه باقی می ماند و ریشه های ناقص برداشت شده محیط مناسبی برای بروز بیماری های قارچی و پوسیدگی می باشند.

ب - جلوگیری از پلاسیدگی محصول: قبل از برداشت محصول در صورت خشکی هوا و بالابودن درجه حرارت، عملیات آبیاری را تا موقع برداشت انجام دهید تا ریشه ها دچار پلاسیدگی نشود و گرنه برداشت ریشه های پلاسیده مشکل است و ضایعات فندی را در کارخانه افزایش می دهد ضمن اینکه کاهش وزن ریشه را نیز به همراه خواهد داشت.

ج - سیلو کردن محصول: در صورتی که بلا فاصله امکان حمل و تحویل چغندر قند را ندارید برای حفظ طراوت، محصول را سیلو نمایید.

در سیلو کردن به نکات زیر توجه داشته باشید :
چغندر سالم و خالص را سیلو (سیلوی روی زمینی) نمایید.
ارتفاع و عرض سیلو را به ابعاد ۱/۵ در ۱/۵ در نظر بگیرید
(شکل ۲۱-۵).

پیمانه مهارتی: عملیات برداشت چغندر قند

شماره شناسایی: ۱۴-۱-۷۴/ک

مهارت: کشت چغندر قند

شماره شناسایی: ۱۴-۱-۷۴/ک



شکل ۲۲-۵—سیلوی چغندر در مزرعه با پوشش نایلونی

درجه حرارت سیلو را کنترل نمایید. بهترین درجه حرارت در سیلوی چغندر قند ۲ تا ۵ درجه می‌باشد.
دقت کنید که زمان سیلو کردن زیاد نباشد.
سطح خارجی سیلو را با استفاده از بقایای گیاهی، کلش و یا خاک پوشانید (شکل ۲۲-۵).

در صورتی که طول محصول سیلو شده زیاد باشد به تهویه محصول توجه داشته باشید برای این کار می‌توانید در داخل سیلو حلقه‌های لاستیک فرسوده رادر کنار هم عمود بر طول سیلو در سطح زمین قرار دهید در این صورت لاستیکها به صورت یک کانال در داخل محصول قرار دارد. در ساعت‌گرم روز ابتدا و انتهای کانال را مسدود کنید و در شبها برای تهویه ورودی و خروجی کانال را باز نمایید.

۴—**ترکیبات چغندر قند:** در کارخانجات پیشرفته برای تولید محصول شکر بیشتر ضریب قلایای محصول را از نسبت مقدار قند، مقدار یون پتاسیم، مقدار یون سدیم و ازت مضر تعیین می‌کنند. بهترین عملکرد محصول، زمانی است که ازت زیان‌آور موجود در چغندر قند در حداقل باشد. توصیه می‌شود به عملیات بهزراعی خصوصاً زمان مصرف و مقدار مجاز کودهای ازته کاملاً توجه داشته باشید و از پلاسیده شدن ریشه و نگهداری نامناسب در سیلو نیز جلوگیری نمایید تا ازت زیان‌آور در حداقل باشد.

نحوه انتقال و تحويل چغندر قند

پس از برداشت، در صورت آمادگی کارخانجات قند سریعاً نسبت به انتقال و تحويل محصول اقدام نمایید. در ایران معمولاً حمل و نقل چغندر قند به عهده تولید کننده است. از آنجا که در حال حاضر حدود ۱۰ تا ۲۵ درصد از قیمت فروش صرف هزینه حمل می‌شود و تفاوت بین حمل مناسب و نامناسب بسیار زیاد است، رعایت نکات زیر در این زمینه مهم است :

۱—از وسیله نقلیه مناسب برای حمل استفاده نمایید. برای حفظ و جلوگیری از ریخت محصول در بین راه، داشتن روکش و چادر از ضروریات حمل می‌باشد.



شکل ۵-۲۳— در انتظار نوبت برای کارخانه



شکل ۵-۲۴— محوطه کارخانه برای تخلیه چغندر



شکل ۵-۲۵— جمع آوری برگ چغندر برای خوراک دام

۲— برای تحویل محصول، به شرایط کارخانه از نظر ساعت تحویل توجه داشته باشد و محصول را به گونه‌ای بارگیری نماید که حداقل زمان برای تخلیه در کارخانه وجود داشته باشد تا ضمن کاهش هزینه کامیون از ضایعات محصول جلوگیری نماید (شکل ۵-۲۳).

۳— در انتقال و حمل محصول، به ظرفیت کارخانه برای تحویل محصول توجه داشته باشد. معمولاً کارخانجات تمایل کمتری به تحویل محصول در یک مقطع محدود دارند زیرا سیلوکردن در کارخانه موجب کاهش بازده محصول می‌شود. از این رو، قبل از حمل محصول، با کارخانه هماهنگی لازم را به عمل آورید (شکل ۵-۲۴).

نحوه نگهداری و عمل آوری برگ چغندر قند

پس از برداشت محصول و حذف قسمتی از طوقه با عملیات دستی یا ماشینی، مقدار زیادی برگ و طوقه حاصل می‌شود که دارای ارزش غذایی قابل توجه‌ای به عنوان علوفه دام است (شکل ۵-۲۵). در یک مزرعه با عملکرد متوسط حدود ۲۵ تن برگ سبز و طوقة تولید می‌شود و برگ چغندر قند ۵۰ درصد پروتئین بیشتری نسبت به برگ ذرت دارد و از نظر ارزشی تنها ۱۰ درصد از یونجه و شبدر کم ارزش‌تر است و در مجموع ۶ درصد پروتئین قابل هضم دارد. از آنجا که این تولید با ارزش می‌تواند درآمد خوبی را به همراه داشته باشد ذیلاً با نحوه نگهداری و عمل آوری برگ چغندر قند آشنا می‌شوید. برگ چغندر قند را می‌توانید به صورت خشک شده یا به روش سیلوکردن نگهداری نمایید.

الف— خشک کردن: اهمیت تولید و ارزش برگ

خشک شده عبارت است از:

۱— برگ خشک تولید شده از هر هکتار چغندر کاری معادل

پیمانهٔ مهارتی: عملیات برداشت چغندر قند شمارهٔ شناسایی: ۱۴-۱-۷۴/ک	مهارت: کشت چغندر قند شمارهٔ شناسایی: ۱۴-۱-۷۴/ک
--	---

محصول یک هکتار کشت جو می‌باشد.

۲- نسبت برگ و طوقه خشک شده به ریشه، حدود ۱۲ درصد است.

روش خشک کردن: برگ و طوقه را که در حدود ۸۵ درصد رطوبت دارد در معرض هوا قرار داده، با زیر و رو کردن برگها رطوبت را به کمتر از ۱۰ درصد برسانید. بی توجهی و بی دققی در زیر و رو کردن، موجب فساد برگها می‌شود.

ب- سیلو کردن: در صورتی که امکان برداشت ماشین برگها وجود دارد برگها را به سیلو حمل و عملیات سیلو کردن را انجام دهید. در سیلو کردن به نکات و عملیات زیر توجه داشته باشید:

- ۱- موقع سیلو کردن ماده خشک برگها حدود ۲۵ درصد باشد.
- ۲- دقت نمایید خاک و املاح اضافی همراه برگ نباشد.
- ۳- برای خنثی کردن اسید اگزالیک موجود در برگها، به ازای هر ۱۰۰ کیلوگرم برگ، مقدار ۱۰۰ گرم کربنات کلسیم در موقع سیلو کردن به برگها اضافه کنید.

مشخصات سیلوی خوب برگ چغندر قند: سیلوی خوب در شرایطی هوایی حاصل می‌شود. رنگ زرد متمایل به سبز روشن همراه با بوی سرکه با حالت فیزیکی تُرد و pH حدود ۴/۲، نشانه خوب سیلو شدن است.

رنگ سبز مایل به آبی روشن، حالت لیزشدن سیلو و بوی پنیر گندیده، نشانه فاسد بودن سیلو می‌باشد.

کار عملی

۱- عملیات سیلو کردن صحیح غده (ریشه) را در مزرعه انجام دهید.

۲- از کارخانه قند بازدید نمایید و با اصول حمل و تحویل محصول آشنا شوید.

۳- پس از برداشت محصول ریشه، برگها را جمع آوری کرده، به یکی از دو روش، خشک یا سیلو نمایید و مقدار تولید وزنی برگ را نسبت به تولید ریشه بررسی و مقایسه کنید.

پیمانه‌مهارتی: عملیات برداشت چغندرقند شماره‌شناسایی: ۱۴۵-۱-۷۴/ک	مهارت: کشت چغندرقند شماره‌شناسایی: ۱۴-۱-۷۴/ک
--	---

آزمون پایانی

۱- زمان کاشت تا برداشت چغندرقند، چند روز است؟

الف: ۱۰۰ روز ب: ۱۳۰ روز ج: ۱۵۰ تا ۲۷۰ روز د: ۳۰۰ تا ۳۵۰ روز

۲- علایم رسیدن چغندرقند را ذکر نماید.

۳- بازدهی برداشت دستی چغندرقند با ۸ ساعت کار روزانه چه میزان است؟

الف: ۶۰۰ تا ۸۰۰ مترمربع ب: ۱۸۰۰ تا ۲۰۰۰ مترمربع

ج: ۳۰۰۰ تا ۴۰۰۰ مترمربع

۴- در مورد طوche کدام مورد درست است؟

الف: دارای بیشترین ناخالصی و بیشترین مقدار قند ب: دارای کمترین ناخالصی و کمترین مقدار قند

ج: دارای کمترین ناخالصی و بیشترین مقدار قند د: دارای بیشترین ناخالصی و کمترین مقدار قند

۵- عملیات برداشت چغندرقند شامل چه مراحلی است؟ بترتیب نام ببرید.

۶- بازدهی برداشت با دستگاه چغندرکن (لیفتر) در یک روز چه مقدار است؟

الف: ۱/۵ هکتار ب: ۳/۵ هکتار ج: ۵ هکتار د: ۸ هکتار

۷- نحوه استفاده از دستگاه چغندرکن (لیفتر) در موقعي را که رشد اندامهای هوایی زیاد است توضیح دهيد.

۸- در وسائل مکانيکي سرزن یک سانتيمتر برش اضافي درصد و ۳ سانتيمتر برش اضافي درصد تلفات محصول را به همراه دارد.

۹- کمباینهای چغندرقند شامل چه قسمتهای مستقلی است؟ نام ببرید.

۱۰- کمباینهایی که دو مرحله برداشت را توان انجام می‌دهند دارای چه بازدهی‌ای هستند و به چه میزان نیروی کششی نیاز دارند؟

۱۱- در استفاده از کمباین به چه تنظیمهای باید توجه داشته باشید.

۱۲- مواد اضافی را که باعث ناخالصی و افت محصول می‌شود نام ببرید.

۱۳- عوامل مؤثر در حفظ کيفيت محصول چغندرقند را نام ببرید.

۱۴- بهترین درجه حرارت سيلوکردن چغندرقند قبل ازحمل به کارخانه چه میزان است؟

الف: ۰ تا ۲ درجه ب: ۲ تا ۵ درجه ج: ۱۰ تا ۱۲ درجه د: ۱۵ تا ۲۰ درجه

۱۵- در حال حاضر چند درصد از قيمت فروش محصول چغندرقند صرف هزينة حمل می‌شود؟

الف: ۵ درصد ب: ۱۰ تا ۲۵ درصد ج: ۳۰ درصد د: ۴۰ تا ۵۰ درصد

۱۶- بروتئين قابل هضم برگ چغندرقند چه مقدار است؟

الف: ۵۰ درصد ب: ۱۵ درصد ج: ۶ درصد د: ۱ درصد

۱۷- برای خشک کردن اسيد اگزاليك موجود در برگها در موقع سيلوکردن، از چه ماده‌اي و به چه نسبت استفاده می‌نمایيد؟

۱۸- میزان تولید برگ و طوche خشک نسبت به وزن ريشه تولیدی چند درصد است؟

الف: ۱۰ تا ۱۲ درصد ب: ۲۰ درصد ج: ۳۰ تا ۳۵ درصد د: ۵۰ تا ۶۰ درصد

ارزیابی اقتصادی کشت چغندر قند

هدف کلی

کسب مهارت ارزیابی اقتصادی زراعت چغندر قند

هدفهای رفتاری: فرآگیر پس از گذراندن این پیمانه مهارتی، باید بتواند :

- ۱- عملکرد وزنی و درصد قند مزرعه را بررسی و برآورد نماید.
- ۲- ارزش اقتصادی تولیدات جنبی را برآورد نماید.
- ۳- هزینه‌های تولید و درآمدها را تعیین و سود تولید را محاسبه و برآورد کند.
- ۴- با نحوه تنظیم قرارداد با مراکز خرید محصول و ضوابط و مقررات تولید آشنا شود.

مهارت‌های مورد نیاز
آشنایی با محاسبات ریاضی در حد دوره راهنمایی

وسایل و تجهیزات مورد نیاز
لوازم التحریر و دفتر محاسبه و گزارش کار
امکانات لازم برای بازدید از کارخانجات قند
آخرین فرمهای بیمه و عقد قرارداد

زمان به ساعت	
عملی	نظری
۴	۱

پیش‌آزمون

- ۱- عوامل مؤثر در عملکرد محصول را در زراعتها م مختلف ذکر نماید.
- ۲- بیمه کردن محصول به چه منظوری انجام می‌شود؟
- ۳- مساحت یک هکتار زمین چند مترمربع است؟
الف: ۱۰۰ ب: ۱۰۰۰
ج: ۱۰،۰۰۰ د: ۱۰۰،۰۰۰
- ۴- یک مترمکعب آب برابر چند لیتر است?
الف: ۱۰ لیتر ب: ۱۰۰ لیتر
ج: ۱۰۰۰ لیتر د: ۱۰،۰۰۰ لیتر
- ۵- ضایعاتِ پس از برداشت محصول چغندر قند را ذکر نماید.
- ۶- عوامل مؤثر در افزایش هزینه تولیدات کشاورزی را نام ببرید.
- ۷- تفاوت درآمد خالص و ناخالص را توضیح دهید.
- ۸- متوسط عملکرد محصول چگونه تعیین و برآورد می‌شود؟
- ۹- از عواملی که موجب ایجاد هزینه در عملیات کاشت زراعت می‌شود حداقل ۶ مورد را نام ببرید.
- ۱۰- هزینه برداشت محصولات زراعی به روش مکانیزه بیشتر است یا به روش دستی؟ چرا؟

کسب حداکثر درآمد، امکان اقتصادی شدن و توسعه کشت را فراهم نماید.

آیا می‌دانید چرا در بعضی از مناطق، کشت چغندر قند از رونق افتاده است ولی در برخی دیگر از توسعه خوبی برخوردار است. به جداول سطح زیر کشت و عملکرد چغندر قند در پیمانه مهارتی شماره ۱ توجه نمایید و تفاوتها را برای توسعه کشت مورد بررسی قرار دهید.

در ارزیابی اقتصادی تولید چغندر قند باید به کلیه فرآورده‌ها و قسمتهای قابل استفاده این محصول توجه کافی داشته باشد و با اعمال مدیریت لازم حداکثر درآمد را از همه قسمتها کسب نمایید. با متوسط عملکرد ۳۰ تن در هکتار تولیدات حاصله عبارت است از:

- ۱- قند ۴ تا ۵ تن
- ۲- ملاس ۱/۵ تن

بررسی میزان تولید یا عملکرد چغندر قند

پس از برداشت محصول، عملکرد را براساس واحد سطح برآورد کنید و آن را با متوسط عملکرد کشور و دنیا مقایسه نمایید. متوسط برداشت محصول در ایران حدود ۲۶ تا ۳۰ تن در هکتار است در حالی که متوسط برداشت در کشورهای پیشرفته بالغ بر ۴۵ تا ۵۰ تن در هکتار می‌باشد و عملکرد در بسیاری از مزارع در این گونه کشورها به حدود ۱۰۰ تن در هکتار رسیده است. با دقت در این عملکردها متوجه می‌شوید که متوسط عملکرد در دنیا نزدیک به دو برابر کشور ماست.

بدیهی است که عملکرد در کشورهای پیشرفته کاملاً اقتصادی است و این خود بزرگترین عامل توسعه چغندرکاری در این مناطق به شمار می‌آید. شما نیز باید تلاش کنید تا با رعایت اصول علمی و بهزروعی عملکرد را به حدود ۵۰ تن در هکتار برسانید و با استفاده از تولیدات جنبی یا با فرآوریهای جدید با

در برآورد هزینه‌ها توجه داشته باشید نیروی انسانی مورد نیاز در زراعت غیرماشینی در عملیات کاشت حدود ۱۷/۹۵، در عملیات داشت ۳۳/۰۶ و عملیات برداشت ۳۵/۸۷ نفر در روز و جمماً از کاشت تا برداشت ۸۶/۸۸ نفر در روز است. هر قدر در زراعت از ماشین بیشتر استفاده کنید هزینه نیروی انسانی کمتری خواهد داشت. برای نمونه، با یک نفر کارگر به طور متوسط در ۸ ساعت حدود ۱ تن چغندر قند را می‌توانید از زمین خارج نموده، سرزنشی و بارگیری نماید درحالی که برخی از کمباينها در همین مدت، محصول ۸ هکتار زمین یعنی حدود ۲۰۰ تن را برداشت می‌نمایند. با بررسی هزینه‌ها مشاهده می‌کنید که هزینه برداشت با ماشین نسبت به نیروی انسانی بسیار پایین‌تر است و بعضاً به $\frac{1}{5}$ می‌رسد.

پس در تولید اقتصادی توجه داشته باشید که هر قدر سطوح کشت وسیعتر و امکان کشت مکانیزه بیشتر فراهم باشد در مجموع هزینه تولید کمتر و درآمد خالص بیشتری خواهد داشت. در تولید عملیات مختلف را براساس اصول علمی و فنی انجام دهید تا عملکرد زیاد امکان اقتصادی شدن تولید را فراهم نماید. در عملکردهای کمتر از ۲۰ تن در هکتار، زراعت چغندر قند از سود لازم برخوردار نیست.

در برآورد هزینه کلیه فعالیتهاي انجام شده را براساس هزینه رایج مثل دستمزد کارگر، هزینه کارکرد ماشین‌آلات، هزینه تهیه نهاده‌های مختلف مثل کود، بذر، سموم و ... و حتی هزینه تهیه آب، ارزش اجاره‌ای زمین و ... را در جدول هزینه؛ به طور کامل و دقیق در طول دوره تولید درج و محاسبه کنید (جدول ۱-۶). در تنظیم جدول برآورد هزینه به موارد زیر توجه داشته باشید:

- ۱- در ستون، شرح عملیات هزینه‌های قبل از کشت را با ذکر تعداد یا مقدار عوامل، مثل دیسک به تعداد یک یا دو بار و با ذکر هزینه هر واحد درج کنید و در ستون جمع هزینه نیز حاصل جمع تعداد و مقدار واحد را محاسبه و یادداشت کنید.
- ۲- هزینه‌ها را بر حسب تقدم عملیات، در جدول درج کنید. به این روش، در صورت نیاز می‌توانید با تفکیک هزینه‌ها در

۳- تفاله ۱۵ تن

۴- برگ سبز و طوفه ۲۵ تن

در فروش محصول به کارخانجات سه مورد اول یعنی قند، ملاس و تفاله در کارخانه تولید می‌شود و بهای مجموعه فرآورده‌های ریشه براساس قیمت تضمینی خرید چغندر قند به تولید کننده پرداخت می‌گردد اما در سیاستهای تشویقی موجود برای توسعه کشت، مقداری قند و تفاله و حتی ملاس با قیمت ارزان و یارانه‌ای به تولید کننده تحویل می‌شود که ارزش یارانه حاصل را می‌باید به عنوان درآمد در برآورد اقتصادی محاسبه نمود.

اما برگ سبز و طوفه، قسمتی است که در مزرعه باقی می‌ماند و شما باید آن را جمع آوری، نگهداری و عمل آوری کنید و با استفاده از آن در دامداری یا فروش به دامداران کسب درآمد بیشتری نمایید. پس قیمت فروش محصول به کارخانه بعلاوه ارزش یارانه محصولات و فرآورده‌های تحویلی و حتی ارزش یارانه وسایل و نهاده‌های دریافتی از کارخانجات یا مراکز خرید و ارزش برگ حاصله به صورت مجموع، تعیین کننده درآمد زراعت چغندر قند می‌باشد و باید مورد محاسبه قرار گیرد.

برآورد هزینه تولید چغندر قند

در تولید چغندر قند با هزینه‌های مختلف مواجه هستید که عبارت است از:

- ۱- طولانی بودن دوره رشد و فعالیت گیاه
- ۲- وجود آفات و بیماریهای زیاد
- ۳- نیاز گیاه به آب زیاد
- ۴- وجود آفات و بیماریهای زیاد
- ۵- محدودیتهاي کشت تمام مکانیزه
- ۶- تنک کردن و دیگر عملیات داشت
- ۷- مراحل متعدد برداشت
- ۸- کرایه حمل
- ۹- سایر موارد ...

پیمانهٔ مهارتی: ارزیابی اقتصادی کشت چغندر قند شمارهٔ شناسایی: ۱۴-۶-۷۴/ک	مهارت: کشت چغندر قند شمارهٔ شناسایی: ۱۴-۱-۷۴/ک
--	---

از عوامل شاخص تولید برای آشنایی بیشتر با نحوه تنظیم جدول مشخص گردیده است. در تولید ممکن است بعضی از این عوامل در منطقه شما نیاز به هزینه نداشته باشد و یا از هزینه کمتر و بیشتر

مورد عملیات مختلف مثل کاشت و ... به طور جداگانه نیز هزینه‌ها را برای عملیات استخراج و در بررسیها مورد استفاده قرار دهید.
۳- در جدول ۲-۶، برای مثال، شرح و برآورد هزینه تعدادی

جدول ۱-۶- هزینه‌های کشت چغندر قند

ردیف	شرح عملیات یا عوامل هزینه	تعداد یا مقدار عوامل	هزینه واحد	جمع هزینه	توضیحات
					جمع

جدول ۲-۶- هزینه‌های کشت چغندر قند برای یک هکتار به عنوان الگوی درج هزینه‌ها

ردیف	شرح عملیات یا عوامل هزینه	تعداد یا مقدار عوامل	هزینه واحد	جمع هزینه	توضیحات
۱	تهیه آب	۱۲۰۰۰ مترمکعب	۲۰۰ ریال	۲,۴۰۰,۰۰۰	به نفعیک نیز قابل درج است
۲	شخم	۱ بار	۱۰۰,۰۰۰ ریال	۱۰۰,۰۰۰	
۳	دیسک	۲ بار	۳۰,۰۰۰ ریال	۶۰,۰۰۰	
۴	کود حیوانی	۱۰ تن	۶۰,۰۰۰ ریال	۶۰۰,۰۰۰	
۵	کود شیمیایی (ازته، فسفره، پتاسه ...)	۱۰ کيسه	۲۰,۰۰۰ ریال	۲۰۰,۰۰۰	
۶	پخش کود با دستگاه	۱ نوبت	۲۰,۰۰۰ ریال	۲۰,۰۰۰	
۷	بذر	۲۰ کیلو	۷۵ ریال	۱۵,۰۰۰	
۸	ضدغونی بذر	۱ نوبت	۱۰,۰۰۰ ریال	۱۰,۰۰۰	
۹	کاشت بذر با ردیفکار	۱ نوبت	۵۰,۰۰۰ ریال	۵۰,۰۰۰	
۱۰	آماده‌سازی انهر برای آبیاری	۵ کارگر	۲۰,۰۰۰ ریال	۱۰۰,۰۰۰	
۱۱	تنک کردن و وجین	۱۲ کارگر	۲۰,۰۰۰ ریال	۲۴۰,۰۰۰	
۱۲	کولتیواتور (وجین، سله‌شکنی)	۱ نوبت	۳۰,۰۰۰ ریال	۳۰,۰۰۰	
۱۳	علف کش	۴ لیتر	۲۵,۰۰۰ ریال	۱۰۰,۰۰۰	
۱۴	سم	۳ لیتر	۲۰,۰۰۰ ریال	۶۰,۰۰۰	
۱۵	سمپاشی	۳ کارگر	۲۰,۰۰۰ ریال	۶۰,۰۰۰	
۱۶	کود سرک	۲ کيسه	۲۰,۰۰۰ ریال	۴۰,۰۰۰	
۱۷	کودپاشی	۱ کارگر	۲۰,۰۰۰ ریال	۲۰,۰۰۰	
۱۸	برداشت (کلیه مراحل ۴ گانه)	۱ نوبت	۴۰۰,۰۰۰ ریال	۴۰۰,۰۰۰	
۱۹	کرایه حمل	۳۰ تن	۳۰,۰۰۰ ریال	۹۰۰,۰۰۰	
۲۰	متفرقه (بیمه و عمل آوری برگ و ...)			۳۰۰,۰۰۰ ریال	
جمع					۵,۷۰۵,۰۰۰

مهارت: کشت چغندر قند

شماره شناسایی: ۱۴-۱-۷۴/ک

پیمانه مهارتی: ارزیابی اقتصادی کشت چغندر قند

شماره شناسایی: ۶-۱۴-۱-۷۴/ک

برخوردار باشد، از جدول ۲-۶ به عنوان الگو استفاده نماید.

برآورد اقتصادی تولید

در برآورد اقتصادی تولید، پس از محاسبه هزینه‌ها، محاسبه درآمدها را نیز انجام دهید. برای این منظور، فروش محصول شامل ریشه (غده) به کارخانجات قند، برآورد درآمد حاصل از تولید برگ، یارانه‌های دریافتی از مرکز خرید محصول و ... را باید در نظر بگیرید. اما ابتدا توجه داشته باشید که برای کسب درآمد مطمئن باید مواد زیر را انجام داده باشید:

الف - قبل^۱ پیمان تولید محصول با کارخانه قند را منعقد نموده باشید تا کارخانه براساس مفاد پیمان ملزم به خرید محصول تولیدی باشد و شما نیز محصول را مطابق قرارداد آماده و تحويل نمایید در غیر این صورت، ممکن است تولید محصول منطقه پیشتر از ظرفیت کارخانه باشد و بهمین دلیل کارخانه از خرید محصول متفرقه و بدون قرارداد خودداری نماید در این حال، برخلاف سایر تولیدات کشاورزی، امکان فروش مناسب محصول را در بازار

آزاد نخواهد داشت و احتمال ضرر و زیان فراوان وجود دارد. در تولید و تحويل محصول، به مفاد پیمان از جمله سطح زیر کشت، حداقل مقدار محصول مورد تعهد برای تولید (به منظور اجتناب از جریمه‌شدن)، توصیه‌های زراعی، نحوه تحويل، استاندارد محصول، مقررات مربوط به تحويل و ... کاملاً توجه کنید. در این زمینه، یک نمونه فرم پیمان نامه و مفاد مندرج در آن آشنا می‌شوید. پیمان نامه را مطالعه کنید و نکات مهم آن را بخاطر بسپارید.

ب - برای کاهش هزینه‌ها از خدمات و امکانات متقابل عامل خرید^۱ مثل کود، بنر اصلاح شده، سموم و ماشین‌آلات مخصوص استفاده کنید. عموماً این مرکز کارت مشخصات استفاده کننده پیمان کشت چغندر قند را صادر و خدمات ممکن و مقدور را در اختیار تولید کننده قرار می‌دهد و بدون اخذ بها در این کارت درج می‌نمایند و قیمت و بهای این خدمات را با شرایط مناسب‌تر و مطمئن‌تر نسبت به بازار آزاد در موقع خرید محصول از تولید کننده دریافت می‌کند که خود نوعی وام بدون بهره و

۱- عامل خرید، عمدتاً کارخانجات قند است.

مهارت: کشت چغندر قند

شماره شناسایی: ۱۴-۷۴-ک

پیمانه مهارتی: ارزیابی اقتصادی کشت چغندر قند

شماره شناسایی: ۶-۱۴-۷۴/ک

فرم مشخصات پیمان نامه

شماره:

شماره پیمان:

تاریخ:

بسمه تعالیٰ

شرکت سهامی شکر

کارخانه قند.....

مقدار چغندر تحویلی
در سال
.....

پیمان کشت و خرید چغندر قند در سال

به منظور تأمین چغندر مصرفی کارخانه قند به نمایندگی آقای پیمانی با آقای فرزند دارای شماره شناسنامه (که از این پس پیمانکار نامیده می شود) در اراضی با شرایط زیر منعقد می گردد :

۱- پیمانکار متعهد می شود که مقدار تن چغندر را در سطح هکتار کشت و در دوره بهره برداری به کارخانه تحویل نماید.

۲- کارخانه بذر مورد نیاز کشت و همچنین کود شیمیایی و سموم لازم را براساس سهمیه تخصیص یافته با احتساب بها در اختیار پیمانکار قرار خواهد داد مشروط بر اینکه از طرف شرکت سهامی پخش کود و سایر ادارات ذیربطری در عرضه کافی و بموقع آن اشکالی پیش نیاید.

۳- پیمانکار موظف است دستورات کارخانه و کلیه عملیات زراعی (کاشت، داشت، برداشت) را صحیح و بموضع بهمورد اجرا گذاشته، در صورت مشاهده هر گونه وضع غیرعادی و بروز آفات فوراً برای راهنمایی و بررسی لازم به بازرسی کشت حوزه خود یا واحد کشاورزی کارخانه مراجعه نماید.

۴- کارخانه در ارائه خدمات توسط ماشین آلات و ادواء زراعی هیچ گونه تعهدی ندارد، لیکن در حد مقدورات و ادواء موجود با پیمانکاران همکاری کرده، هزینه آن را به حساب پیمان منعقده منظور می نماید.

۵- پیمانکار متعهد می گردد بمحض ابلاغ کارخانه و قبل از فصل یخ‌بندان، محصول چغندر مزرعه خود را برداشت و پس از زدن سر برگ و طوفه و جداسازی گل و خاک چسبیده به آن محصول را طبق ضوابط آگهی کارخانه و برابر نوبت با وسیله مناسب تدریجاً به کارخانه حمل و تحویل نماید. بدیهی است با توجه به شرایط آب و هوایی، هر گونه برنامه‌ای که از طرف کارخانه برای نحوه تحویل تنظیم گردد، پیمانکار ملزم به رعایت آن خواهد بود.

تسهیل کننده کشت به حساب می آید.

۶- توزین چغندر در داخل کارخانه و در روی باسکول به عمل می آید و اعتراض به افت و درصد عیار تا زمانی که بار تخلیه نشده، قابل قبول است و در صورت لزوم یک بار تکرار می گردد. پس از تخلیه چغندر هیچ گونه اعتراضی پذیرفته نخواهد شد و کارخانه مجاز است از تحويل چغندرهای خارج از استاندارد با افت زیاد و درصد قند خیلی کم، ناسالم و فاسد و چغندرهای متفرقه (لبوبی و علوفه ای) و همچنین چغندرهای کمتر از اندازه متعارف و خیلی کوچک خودداری نماید.

۷- چون سطح قرارداد کشت با توجه به ظرفیت مصرفی کارخانه تنظیم می شود از این رو، حداکثر تا میزان ۱۰٪ کسری یا ازدیاد چغندر تحويلی قابل قبول و کارخانه از تحويل چغندر بیش از آن خودداری می کند و در صورت کسری بهازای هر تن ۱۵۰۰ ریال بابت هزینه های سر بار کارخانه از حساب پیمانکار کسر می نماید.

۸- کارخانه پس از توزین وسیله پر و خالی حامل چغندر بر روی باسکول، افت و عیار را در قبض مربوط درج می کند. مبنای محاسبه همین قبض است که در دفاتر قانونی کارخانه و در صورتحساب پیمانکار منظور می گردد.

۹- بهای چغندر : بهای محصول چغندر عبارت است از مبلغی که هر ساله توسط مقامات ذیصلاح دولتی براساس عیار معینی تعیین و طرفین ملزم به رعایت آن هستند و نحوه پرداخت آن با توجه به چگونگی دریافت تسهیلات بانکی و تأمین نقدینگی طی آگهی جداگانه از سوی کارخانه اعلام خواهد شد.

۱۰- پیمانکار موافقت می نماید که زراعت این پیمان را کلاً طی قرارداد جداگانه ای تحت پوشش بانک کشاورزی منطقه خود بیمه نموده، به کارخانه و کالت می دهد که بهازای هر هکتار حق بیمه اعلام شده (سهم کشاورز) را به صندوق بیمه پرداخت و از محل بهای چغندر تحويلی کسر نماید.

۱۱- پیمانکار برای تضمین حسن انجام تعهدات خود متناسب با پیمان، باید سفته هایی به هزینه و تعهد خود و امضای یک نفر پیمانکار معتبر دیگر که به عنوان ضامن وی تلقی خواهد شد به کارخانه تسلیم نماید.

۱۲- چنانچه قوانین و مقررات الزام اور جدیدی، وضع شود که درنتیجه اجرای آن تغییراتی در بها و مزایای چغندر ایجاد گردد در مفاد این پیمان نیز نافذ خواهد بود.

۱۳- در صورت بروز هر گونه اختلاف، نظر مؤسسه تحقیقات اصطلاح بذر چغندر قند و وزارت کشاورزی قطعی و برای طرفین لازم الاجراست.

۱۴- این قرارداد دارای ۱۴ بند و در ۳ نسخه تنظیم شده است و در حکم واحد می باشد و پیمانکار و ضامن وی با مطالعه دقیق مفاد آن؛ مبادرت به امضاء نموده، یک نسخه به پیمانکار تحويل گردید.

امضای بازرس کشت منطقه

امضای ضامن

امضای پیمانکار

پیمانه مهارتی: ارزیابی اقتصادی کشت چغندر قند
شماره شناسایی: ۱۴-۶-۷۴/ک

مهارت: کشت چغندر قند
شماره شناسایی: ۱۴-۱-۷۴/ک

بسمه تعالی

شرکت سهامی شکر کارخانه قند	نظریه و گواهی بازرس کشت

کارت مشخصات پیمان کشت چغندر سال ۱۳

تذکر: کلیه پیمانکاران کشت چغندر قند باید در زمان
تحویل نهاده ها و تسویه حساب، این کارت را همراه داشته باشند
در غیر این صورت هیچ گونه اقدامی نخواهد شد.

تلفن کارخانه قند

فرم مشخصات پیمان کشت

نهاده های تحویلی به پیمانکاران

شماره پیمان تاریخ

نام نام خانوادگی	نام پدر
محل کشت
مقدار چغندر سال قبل
میزان تعهد چغندر سال جاری
امضای مسؤول کشت منطقه	امضای پیمانکار

ملاحظات	مبلغ یا مقدار	شرح	تاریخ

فرم ثبت نهاده های تحویلی

امضای رئیس چغندرکاری

امضای نماینده شرکت

ج - با توجه به پرهزینه بودن و آسیب‌پذیری زیاد محصول در مقابل عوامل و شرایط نامناسب حتماً محصول را بیمه کنید تا امکان جبران خسارت به هنگام از بین رفتن تمام یا قسمتی از محصول وجود داشته باشد. البته عامل خرید در پیمان نامه، التزام به بیمه نمودن را جزو شرایط قرارداد منظور می‌نماید. در حال حاضر بیمه محصولات از طریق بانک کشاورزی و براساس قرارداد فیما بین در فرمایهای ویژه انجام می‌شود.

پس از انجام عملیات تضمینی کسب درآمد با برداشت محصول مشکلی برای فروش چغندر قند به کارخانجات نخواهد داشت و با حمل سریع محصول و با استفاده از وسایل نقلیه مناسب در برنامه زمان‌بندی شده از طریق مرکز خرید ضمن کاهش هزینه، می‌توانید حداکثر محصول تولیدی را بدون ضایعات عمده به کارخانه تحويل دهید (شکل ۱-۶) و براساس قیمت تضمینی،



شکل ۱-۶ - تخلیه چغندر در ابتدای خط کارخانه



شکل ۳-۶ - سیلوی چغندر در کارخانه



شکل ۲-۶ - سیلوی چغندر در کارخانه با کنترل شرایط حرارت و رطوبت

مسلسل
تاریخ صدور
شماره بیمه نامه
شعبه کد شعبه استان
بسمه تعالیٰ
فرم شماره ۱
بیمه نامه



صندوق بیمه محصولات کشاورزی

سنجاقه بیمه نامه کشاورزی

خانم	۱- بیمه گر: صندوق بیمه محصولات کشاورزی	
آقای	۲- زراعت مورد بیمه: سال زراعی ۳	
شرکت شماره شناسنامه	مکانیزه <input type="checkbox"/>	بهاره <input type="checkbox"/>
صادره تاریخ تولد	نیمه مکانیزه <input type="checkbox"/>	تابستانه <input type="checkbox"/>
فرزند نشانی :	ستنی <input type="checkbox"/>	باپیزه <input type="checkbox"/>
	Dیم <input type="checkbox"/>	دیم <input type="checkbox"/>
	۴- نوع کشت: منابع آب: ۵- نوع بذر: تاریخ کاشت:	

چنانچه بیمه گذار بوكالت یا به نمایندگی از طرف افراد و یا شرکت مبادرت به عقد قرارداد بیمه بنماید مشخصات کامل سایر افراد بیمه گذار،
توجه: اعم از حقیقی یا حقوقی، با مشخصات کامل مزارع مورد بیمه و سایر توضیحات لازم (بخصوص در مورد شرکتها) می‌باشد در فرم
ضمیمه این بیمه نامه که جزء لاینفک قرارداد است منعکس شود.

سنجاقه بیمه نامه کشاورزی

استان قطعه ۱: شمال	۶- محل زراعت
شمال قطعه ۲: شمال	مورد بیمه (حدود اربعه)
شمال قطعه ۳: شمال	

۷- خطرهای موضوع: سیل <input type="checkbox"/> تگرگ <input type="checkbox"/> سرما <input type="checkbox"/> زلزله <input type="checkbox"/> طوفان <input type="checkbox"/> بخش قطعه ۱: شمال	۸- مدت قرارداد: از کاشت (حداکثر زمان کاشت) تا برداشت محصول (حداکثر)
۹- مساحت بیمه شده ده هکتار (به حروف)	

۱۰- کل حق بیمه ریال	۱۱- برداختی کشاورز ریال
۱۲- حداکثر تعهد بیمه گر برای هر هکتار ریال	هکتار

۱۳- برداختی کمک دولت ریال	۱۴- صندوق در قبال دریافت حق بیمه مندرج در فوق معهده می شود که در صورت بروز خسارت ناشی از خطرهای بیمه شده بمزارع موضوع این بیمه نامه طبق شرایط مندرج در آئین نامه و دستورالعمل اجرایی که بعضی از موارد آن در ظهر این ورقه آمده است به بیمه گذار غرامت برداخت نماید.
۱۵- محل برداخت غرامت بانک کشاورزی شیوه خواهد بود.	۱۶- بیمه گذار علاوه بر رعایت مفاد مندرج در ظهر این بیمه نامه معهده است در صورت بروز خسارت ناشی از خطرهای تحت پوشش به زراعت بیمه شده، موضوع خطر را در اسرع وقت و حداکثر طرف مدت ۷ روز کتابی به شعبه بانک کشاورزی فوق الذکر و در صورت عدم امکان به یکی از شعب بانک کشاورزی در استان اعلام نماید.

۱۷- صدور این بیمه نامه به هیچ وجه دلیلی بر تأیید مالکیت بیمه گذار نمی باشد.	صندوق بیمه محصولات کشاورزی
---	----------------------------

بیمه گذار یا نماینده او نام و نام خانوادگی امضاء	نام و نام خانوادگی امضاء
--	-----------------------------

سنجاقه بیمه نامه کشاورزی

پیمانهٔ مهارتی: ارزیابی اقتصادی کشت چغندر قند شمارهٔ شناسایی: ۱۴-۶-۷۴/ک	مهارت: کشت چغندر قند شمارهٔ شناسایی: ۱۴-۱-۷۴/ک
--	---

جدول ۳-۶ درآمد ناخالص تولید چغندر قند

ردیف	شرح تولیدات چغندر قند	مقدار تولید	قیمت واحد	جمع درآمد ناخالص	توضیحات
					جمع

قیمت واحد، درآمد ناخالص را محاسبه و در ستون مربوط درج نمایید.

ارزش یارانهٔ دریافتی را با توجه به قیمت بازار آزاد و هزینه پرداخت شده به کارخانه محاسبه و در جدول درج نمایید.

قیمت برگ را براساس قیمت فروش محصول در هر کیلو محاسبه و کل تولید برگ را از نظر قیمت و ارزش برآورد و در

بهای محصول را دریافت نماید. هر قدر عیار قند تولیدی و کیفیت محصول بالاتر باشد قیمت بیشتری را دریافت می‌نماید.

برای برآورد درآمد ناخالص از جدول ۳-۶ استفاده کنید. محصول تحويلی به کارخانه را در شرح عوامل و مقدار تولید درج نمایید. قیمت خرید هر کیلو چغندر قند، از سوی کارخانه را در قسمت قیمت واحد منظور کنید و از حاصل ضرب مقدار تولید در

جدول ۴-۶- درآمد ناخالص تولید چغندر قند، الگوی درج در آمدهای ناخالص

ردیف	شرح تولیدات چغندر قند	مقدار تولید	قیمت واحد	جمع درآمد ناخالص	توضیحات
۱	ریشه (غده) چغندر قند تحویلی به کارخانه	۳۰ تن	۲۵۰,۰۰۰	۷,۵۰۰,۰۰۰ ریال	قیمت واحد بر مبنای تفاوت با بازار آزاد
۲	قند دریافتی به ازای هر تن ۲ کیلو	۶	۳۰۰۰	۱۸۰,۰۰۰ ریال	
۳	فالله دریافتی به ازای هر تن ۲۰ کیلو	۶۰۰	۵۰۰	۳۰۰,۰۰۰ ریال	
۴	برگ تولیدی (خشک)	۲۰۰۰ کیلوگرم	۴۰۰	۸۰۰,۰۰۰ ریال	
جمع					۸,۷۸۰,۰۰۰ ریال

هکتار مورد محاسبه قرار گرفته، عبارت است از :
ریال ۰ ۳,۰۷۵,۰۰۰ ۵,۷۰۵,۰۰۰ ۸,۷۸۰,۰۰۰ . درآمد ناخالص
با توجه به برآورد الگوی مشاهده می کنید که در عملکرد
۳۰ تن در هکتار، از درآمد متوسطی برخوردار هستید.
از آن جا که زمین زیرکشت در بنه یا مزرعه تولیدی احتمالاً
کمتر یا بیشتر از یک هکتار است برای برآورد درآمد در واحد
سطح (یک هکتار) از رابطه زیر استفاده نمایید.

درآمد خالص بنه یا مزرعه تولیدی ۱۰,۰۰۰ . درآمد خالص در یک هکتار

جدول منظور کنید. برای آشنایی بیشتر با نحوه تنظیم جدول به نمونه الگویی جدول ۴-۶ مراجعه نمایید.

پس از مشخص شدن و برآورد درآمد ناخالص، از رابطه زیر درآمد خالص کشت را مشخص کنید.

مجموع هزینه ها . مجموع درآمد ناخالص درآمد خالص
برای مثال با توجه به هزینه ها و درآمدهای برآورد شده در
قالب جداول الگویی درآمد خالص مزرعه فرضی که بر مبنای یک

پیمانهٔ مهارتی: ارزیابی اقتصادی کشت چغندر قند شمارهٔ شناسایی: ۱۴-۱-۷۴/ک	مهارت: کشت چغندر قند شمارهٔ شناسایی: ۱۴-۱-۷۴/ک
--	---

و سمعت بنه یا مزرعهٔ تولیدی

پس از برآورده‌رآمد خالص در هر هکتار، این درآمد را با درآمد سایر محصولات قبل کشت در منطقه مقایسه کنید.

کار عملی

- ۱- درآمد خالص مزرعهٔ مورد کشت در بنه‌های آموزشی و تولیدی را در واحد سطح ارزیابی و برآورد نماید.
- ۲- درآمد ناخالص را یک بار برای محصول ۲۰ تن در هکتار و یک بار برای محصول ۵۰ تن در هکتار محاسبه و برآورد کنید و درآمد خالص این دو محدودهٔ تولید را از نظر اقتصادی بودن ارزیابی نمایید.

آزمون پایانی

۱- فرآورده‌ها و تولیدات حاصل از زراعت چغندرقند را نام ببرید.

۲- با متوسط عملکرد 30 تن در هکتار ، عملکرد برگ و طوقه چه میزان خواهد بود؟

الف: 5 تن ب: 10 تن ج: 25 تن

۳- متوسط عملکرد چغندرقند در دنیا نسبت به عملکرد متوسط آن در ایران چه میزان است؟

الف: $\frac{1}{2}$ برابر ب: $\frac{1}{4}$ برابر ج: 1 برابر د: 2 برابر

۴- مجموعه عوامل تعیین‌کننده درآمد زراعت چغندرقند را نام ببرید.

۵- از دلایل هزینه زیاد زراعت چغندرقند حداقل 6 مورد را نام ببرید.

۶- هزینه برداشت محصول چغندرقند با ماشین نسبت به نیروی انسانی چه میزان است؟

الف: $\frac{1}{5}$ برابر ب: $\frac{1}{2}$ برابر ج: برابر است د: 2 برابر

۷- نیروی انسانی مورد نیاز در زراعت غیرماشینی چغندرقند از کاشت تا برداشت چه میزان است؟

الف: $17/95$ نفرروز ب: $25/87$ نفرروز ج: $86/88$ نفرروز د: $170/44$ نفرروز

۸- در برداشت محصول چغندرقند به وسیله کمباین تقریباً چند برابر یک نفر نیروی انسانی در 8 ساعت، کار انجام می‌شود؟

الف: 10 برابر ب: 20 برابر ج: 100 برابر د: 200 برابر

۹- چه میزان عملکرد، زراعت چغندرقند صرفه اقتصادی ندارد؟

۱۰- در برآورد محاسبه درآمدها چه مواردی باید مورد ارزیابی قرار گیرد؟ نام ببرید.

۱۱- برای کسب درآمد مطمئن چه مواردی را باید انجام دهید؟ به طور اختصار ذکر نمایید.

۱۲- ارزش یارانه دریافتی از کارخانجات قند و یا عوامل خرید محصول را چگونه محاسبه و برآورد می‌نمایید؟

۱۳- نحوه محاسبه درآمد خالص در مزرعه و برآورد این درآمد را در واحد سطح توضیح دهید.

فهرست منابع مورد استفاده

- ۱- کولیوند، محمد، زراعت چغندر قند، مؤسسه تحقیقات چغندر قند، ۱۳۶۶.
- ۲- خدابنده، ناصر، زراعت گیاهان صنعتی، مرکز نشر سپهر، ۱۳۶۶.
- ۳- بهداد، ابراهیم، آفات گیاهان زراعی ایران، آزمایشگاه بررسی آفات و بیماریهای گیاهی، اصفهان، ۱۳۶۱.
- ۴- بهداد، ابراهیم، بیماریهای گیاهان زراعی ایران، آزمایشگاه بررسی آفات و بیماریهای گیاهی، اصفهان، ۱۳۵۹.
- ۵- اداره کل آمار و اطلاعات وزارت کشاورزی، شناسنامه تصویری چغندر قند، وزارت کشاورزی، ۱۳۷۶
- ۶- سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، وزارت کشاورزی، مجموعه نشریات تحقیقی و آموزشی و ترویجی چغندر قند، نشر آموزش کشاورزی، ۱۳۷۵-۷۸.

