

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

# تشريح و فیزیولوژی طیور

پایه دهم

دوره دوم متوسطه

شاخه: کارداش

زمینه: کشاورزی

گروه تحصیلی: کشاورزی و غذا

رشته‌های مهارتی: پرورش پرندگان زینتی، پرورش ماکیان و مرغداری صنعتی

نام استاندارد مهارتی مينا: پرورش عمومی طیور

کد استاندارد متولی: ۸۵/ب/۱۷/۴/۸۰/ک

۵۹۸ بديعى اردستانى، سعيد

ت ۵۸۲ ب/ تشریح و فیزیولوژی طیور/ مؤلفان: سعید بديعى اردستانى... [و ديگران]. - تهران: شركت چاپ و نشر  
كتاب‌هاي درسي ايران.

74 ص.: مصور. - (شاخه کارداش)

متون درسي رشته‌های مهارتی پرورش پرندگان زینتی، پرورش ماکیان و مرغداری صنعتی، گروه تحصیلی  
کشاورزی و غذا، زمينه کشاورزی.

برنامه‌ریزی و نظارت، بررسی و تصویب محتوا: کمیسیون برنامه‌ریزی و تالیف کتاب‌هاي درسي رشته‌های مهارتی  
زير گروه طیور، دفتر تالیف کتاب‌هاي درسي فني و حرفه‌اي و کارداش وزارت آموزش و پرورش.

1. پرندگان - كالبد شناسی. 2. مرغ و خروس‌ها - كالبد شناسی. الف. بديعى اردستانى، سعيد. ب. ايران.

وزارت آموزش و پرورش دفتر تالیف کتاب‌هاي درسي فني و حرفه‌اي و کارداش. ج. عنوان. د. فروست.



وزارت آموزش و پرورش  
سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی آموزشی

نام کتاب : تحریج و فیزیولوژی طیور - ۱۳۱۰  
پدیدآورنده : سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی آموزشی  
مدیریت برنامه‌ریزی درسی و تألیف : دفتر تالیف کتاب‌های درسی فنی و حرفه‌ای و کارداش  
شناسه افزوده برنامه‌ریزی و تألیف :

سعید بدیعی اردستانی، سیروس اشیدری، جهانشاه ابرابنور، ابوالفضل قلی‌بیگی، عبدالرضا ولی‌محمدی، شهرزاد جزء قسمی، بنی‌الله مقدمی و حمید احمدی (اعضای شورای برنامه‌ریزی)  
سعید بدیعی اردستانی، مجید افشار، مهرداد نفیسی و شهاب سهرابی (اعضای گروه تألیف)  
اداره کل نظارت بر نشر و توزیع مواد آموزشی  
شهرزاد قنیری (صفحه آرا) - محمدحسن معماری (طراح جلد)  
تهران : خیابان ایرانشهر شمالی - ساختمان شماره ۴ آموزش و پرورش (شهیدموسوی)  
تلفن : ۰۹۶۱۱۱۸۸۳، دورنگار : ۰۹۲۶۶، کد پستی : ۱۵۸۴۷۴۷۳۵۹  
وبگاه : www.irtextbook.ir و www.chap.sch.ir

مدیریت آماده‌سازی هنری :  
شناسه افزوده آماده‌سازی :  
نشانی سازمان :

ناشر : شرکت چاپ و نشر کتاب‌های درسی ایران : تهران - کیلومتر ۱۷ جاده مخصوص کرج - خیابان ۶۱ (داروپخش)  
تلفن : ۰۹۱۶۱۸۵۴۴، دورنگار : ۰۹۸۵۱۶، صندوق پستی : ۱۳۹-۳۷۵۱۵  
چاپخانه : شرکت چاپ و نشر کتاب‌های درسی ایران «سهایی خاص»  
سال انتشار : ۱۳۹۸

کلیه حقوق مادی و معنوی این کتاب متعلق به سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی آموزشی وزارت آموزش و پرورش است و هرگونه استفاده از کتاب و اجزای آن به صورت چاپی و الکترونیکی و ارائه در پایگاه‌های مجازی، نمایش، اقتباس، تلخیص، تبدیل، ترجمه، عکس‌برداری، نقاشی، تهیه فیلم و تکثیر به هر شکل و نوع بدون کسب مجوز از این سازمان منوع است و متخلفان تحت پیگرد قانونی قرار می‌گیرند.



شما عزیزان کوشش کنید که از این وابستگی بیرون آید و احتیاجات کشور خودتان را برآورده سازید، از نیروی انسانی ایمانی خودتان غافل نباشید و از اتکای به اجانب بپرهیزید.

امام خمینی «قدس سرّه»

# فهرست

## مقدمه

۱	پیمانه مهارتی (۱) ساختمان بدن طیور
۲	۱-۱- پوشش بدن طیور
۶	آزمون پیمانه مهارتی ۱
۷	پیمانه مهارتی (۲) دستگاه حرکتی
۸	۱-۲- استخوان‌ها
۹	۲-۱- اسکلت و استخوان‌بندی طیور
۱۱	۲-۲- ماهیچه‌ها
۱۳	آزمون پیمانه مهارتی ۲
۱۴	پیمانه مهارتی (۳) دستگاه گوارش
۱۵	۱-۳- قسمت‌های مختلف دستگاه گوارش
۱۸	۲-۳- فیزیولوژی دستگاه گوارش
۲۰	آزمون پیمانه مهارتی ۳
۲۱	پیمانه مهارتی (۴) دستگاه تولید مثل
۲۲	۱-۴- دستگاه تولید مثل نر
۲۳	۲-۴- دستگاه تولید مثل ماده
۲۴	۳-۴- مراحل تشکیل تخم پرنده
۲۵	۴-۴- تغییرات روزانه رشد جنینی
۲۹	آزمون پیمانه مهارتی ۴

۳۰	<b>پیمانه مهارتی (۵) دستگاه گردش خون</b>
۳۱	۱-۵- آشنایی با دستگاه گردش خون
۳۶	۲-۵- آشنایی با فیزیولوژی دستگاه گردش خون چرخه قلب
۳۸	۳-۵- مقایسه دستگاه گردش خون پرندگان و پستانداران
۴۰	آزمون پیمانه مهارتی ۵
۴۱	<b>پیمانه مهارتی (۶) دستگاه تنفس</b>
۴۲	۱-۶- آشنایی با ساختمان دستگاه تنفس
۴۴	۲-۶- فیزیولوژی دستگاه تنفس
۴۷	آزمون پیمانه مهارتی ۶
۴۸	<b>پیمانه مهارتی (۷) دستگاه ادراری</b>
۴۹	۱-۷- ساختمان دستگاه ادراری
۵۱	۲-۷- فیزیولوژی کلیه
۵۴	آزمون پیمانه مهارتی ۷
۵۵	<b>پیمانه مهارتی (۸) دستگاه عصبی</b>
۵۶	۱-۸- ساختمان دستگاه عصبی طیور
۵۹	۲-۸- فیزیولوژی دستگاه عصبی
۶۱	آزمون پیمانه مهارتی ۸
۶۲	<b>پیمانه مهارتی (۹) غدد داخلی</b>
۶۳	۱-۹- غدد درون ریز
۶۵	۲-۹- غدد برون ریز
۶۷	آزمون پیمانه مهارتی ۹
۷۴	منابع

## مقدمه

تشريح یا آناتومی<sup>۱</sup> علمی است که شکل و ساختمان اندام‌های موجودات را مورد مطالعه قرار می‌دهد و فیزیولوژی<sup>۲</sup> علمی است که اعمال و رابطه بین اندام‌های مختلف بدن موجودات زنده را بررسی می‌کند.

اگر چه هر کدام از موضوعات مورد بررسی در این کتاب (تشريح و فیزیولوژی طیور) تقسیم بندی‌های جداگانه و مفصلی را شامل می‌گردد؛ اما در این کتاب، سعی گردیده به تشريح بدن مرغ با تأکید بر فیزیولوژی اندام‌های گوناگون و به زبانی ساده پرداخته شود.

اطلاعات موجود در این کتاب برگرفته از مطالب علمی موجود در کتاب‌ها و مقاله‌های مرتبط می‌باشد و در تدوین آن همواره تلاش گردیده ضمن حفظ ماهیت علمی مطالب تا حد امکان به صورت روان و مصور برای آموزش بهتر ارائه گردد. کلیه مطالب در ۹ پیمانه همراه با تصاویر مورد نیاز و فعالیت‌های عملی مرتبط، عرضه شده است.

---

۱—Anatomy

۲—Physiology

# ساختمان بدن طیور

هدف کلی

شناخت ساختمان بدن طیور



## هدفهای رفتاری

در پایان این فصل هنرجو باید بتواند:


- ۱- اندام‌های ظاهری طیور را شناسایی کند.
- ۲- وظایف پر را بیان کند.
- ۳- انواع پر را شناسایی کند.
- ۴- انواع تاج را شناسایی کند.

## پیش آزمون


۱- پوشش بدن طیور با پوشش بدن پستانداران چه تفاوت اساسی دارد؟

۲- تفاوت منقار مرغ با منقار اردک در چیست؟

۳- کدام حیوان غدد عرقی ندارد؟



برای آشنایی با تشریح و فیزیولوژی طیور، ابتدا شمای کلی اندام‌های ظاهری طیور را در شکل ۱-۱ مشاهده کنید.



شکل ۱-۱- شمای کلی از اندام‌های ظاهری طیور

- ۳- پرنده را از برف و باران حفظ می‌نمایند.
- ۴- پرنده را در مقابل صیادان استئران می‌کنند.
- ۵- باعث جذابیت پرنده در بین پرندگان همان گروه می‌شوند.

معمولًاً سه نوع پر در بدن پرندگان قابل تشخیص است:

- ۱- پرهای بزرگ یا شاه پرها: این پرها از خارج، بدن پرنده را پوشانیده‌اند و در زیر آنها پرهای دیگری قرار گرفته است. پرهای بال و دم جزء این دسته به شمار می‌روند. تعداد پرهای بزرگ کم و طولسانان بیشتر است و بسته به نژاد و جنس و گونه متفاوت می‌باشد. وظیفه اصلی پرهای بزرگ شرکت در عمل پرواز است.

پرهای بزرگ دارای یک شاخه اصلی<sup>۱</sup> می‌باشد که در قسمت پایین تو خالی و در قسمت بالا توپر است. قسمت تو خالی آن پایه پر<sup>۲</sup> نام دارد و قسمت توپر آن بدن پر<sup>۳</sup> نامیده می‌شود. قسمت توپر از دو طرف دارای شاخه‌های فرعی است که به آنها ریش<sup>۴</sup> می‌گویند. از هر یک از این ریش‌ها شاخه‌های


در این پیمانه با وظایف اندام‌های ظاهری طیور آشنا می‌شویم و در پیمانه‌های آینده توضیح کاملی از وظایف اندام‌های مختلف داده می‌شود.

## ۱- پوشش بدن طیور

پوشش بدن طیور از پر، پوست و یک بافت پوششی فلسی شکل که تکامل یافته‌تر از پوست خزندگان است تشکیل شده است. پرها: پوشش پر در پرندگان را می‌توان عامل تمایز این گروه از سایر مهره‌داران دانست. در سیر تکاملی پرندگان، بیشتر قسمت‌های فلسی خزندگان تبدیل به پرشده است. هم پر و هم فلس از پروتئین مشابهی به نام کراتین ساخته شده‌اند. پر از لایه خارجی پوست بوجود می‌آید و وزن آن سبک و انعطاف‌پذیر است.

**وظایف پر:**

- پرها وظایف متنوعی دارند:
- ۱- به پرواز کمک کرده و از پوست بدن محافظت می‌کند.
- ۲- به حفظ درجه حرارت بدن کمک می‌کند.



شکل ۴- ساختمان پر


پرهای از مجاري مخصوصی در پوست بنام مجرای پر تشکیل می‌شوند. این مجاري و حفره‌ها در تمام نواحی بدن وجود دارد.

اولین آثار بوجود آمدن این مجاري در پنجمین روز زندگی جنینی پدیدار می‌شود. هر پر یک فولیکول که در پوست جنین قرار دارد شروع به تشکیل می‌کند در داخل این فولیکول‌ها پرهای اصلی تشکیل می‌شود. پرهای اصلی از یک لکه در قاعده فولیکول منشأ می‌گیرند و به مرور رشد آن زیاد و از پوست خارج می‌شود، بطوری که پس از مدتی پرهای قابل رویت می‌گردند و بتدريج بر رشد اين پرهای اضافه می‌گردد و قسمت‌های مختلف پر فرم می‌گيرند و تشکیل می‌شوند. تغذیه پرهای در پوست توسط مویرگ‌های خونی انجام می‌شود. این مویرگ‌ها در هنگامی که پر هنوز ميله‌ای است زيادتر و طولاني تر می‌باشد ولی به مرور که قسمت‌های ديگر پر تشکیل می‌شود كوتاه‌تر می‌گردد.

فرعی دیگری به موازات هم از دو طرف جدا شده که به هریک از آنها ريشک<sup>۱</sup> می‌گويند. شاخه‌های فرعی در قسمت انتهایی خود دارای اشعابات کوچک‌تری می‌باشند. (شکل‌های ۱-۲، ۱-۳ و ۱-۴)



شکل ۲-۱- پرهای بزرگ یا شاهپرها



شکل ۳- ساختمان پر

**۲- پرهای کوچک یا پوش پر :** اين پرهای معمولاً تمام بدن را فرا می‌گيرد و اغلب، پرهای بزرگ در بعضی قسمت‌های روی آنها را می‌پوشانند (مانند بال‌ها). وظيفه اين پرهای حفظ و پوشش بدن است و تعداد آنها فوق العاده زيادتر از پرهای بزرگ است.

**۳- پرهای سوزنی شکل :** اين پرهای در زير پرهای کوچک‌تر قرار گرفته و داخل فولیکول کوچکی در لایه اپiderم پوست بدن فرو رفته است.

توانایی تعرق و کاهش حرارت بدن در شرایط گرم‌آباد و گرمای را از طریق شش‌ها دفع می‌کنند.


در شکل ۱-۵ اندام‌های ظاهری سر طیور را که شامل تاج، گوش، چشم، منقار و ریش می‌باشد را مشاهده می‌کنید.  
تاج: تاج از لایه درم پوست تشکیل شده و لایه نازکی از اپiderم روی آن را می‌پوشاند. تاج در طیور به شکل‌های متفاوتی وجود دارد. در شکل ۱-۶ انواع تاج نشان داده شده است.  
شکل تاج نتیجه اثر متقابل وزن‌ها می‌باشد، ولی اندازه آن به میزان هورمون‌های جنسی و شدت نور بستگی دارد. کم بودن شدت نور باعث بلندتر شدن تاج می‌شود.



شکل ۵-۱- اندام ظاهری سر طیور

اولین آثار تشکیل رنگدانه‌های پردر جنین پس از ۸ ساعت ظاهر می‌شود. این رنگدانه‌ها در جرم پرها جای می‌گیرند و طی مرحله تشکیل شدن پرها به قسمت‌های مختلف پر مانند ساق اصلی، ریش، ریشک و ریشک‌های فرعی می‌روند و سبب رنگین شدن پرها می‌گردند. علت تنوع رنگ پرها وجود رنگدانه‌های مختلف و همچنین طرز قرار گرفتن آنها می‌باشد. پرها حدود ۴-۶ درصد وزن بدن طیور را تشکیل می‌دهند.

**پوست:** پوست بدن طیور غدد چربی و عرق ندارد و فقط در ناحیه دم مقداری غده وجود دارد که به آن غدد چربی می‌گویند و پرنده به کمک ترشحات آن پرهای خود را جلا می‌دهد تا طراوت خود را حفظ کنند. از نظر ساختمانی، پوست از دو لایه تشکیل شده است که لایه خارجی اپiderم<sup>۱</sup> و لایه زیرین درم<sup>۲</sup> نامیده می‌شوند. در ناحیه منقار و پا، پوست، ضخیم و شاخی شده است. پوست اغلب پرندگان اهلی زرد مایل به سفید است. به جزء پوست بوقلمون که به دلیل ذخیره بالای ملانین، تیره رنگ است. شدت زردی پوست به میزان رنگدانه گزانوفیل در جیره غذایی و همچنین میزان تخم‌گذاری پرنده بستگی دارد، به طوری که در مرغ‌های تخم‌گذار رنگ پوست به سفیدی می‌گراید و این موضوع به علت انتقال رنگدانه‌های زرد از پوست به زرد تخم مرغ و ایجاد رنگ زرد در آن است. از آنجا که پوست بدن طیور قادر غدد عرق می‌باشد،



شکل ۶-۱- انواع تاج طیور



شکل ۷-۱- منقار و بینی مرغ خانگی

ملتحمه، دستگاه اشکی و ماهیچه‌های پلک‌ها می‌باشد. بینایی در طیور بسیار خوب است و مناسب با آن، چشمان بزرگی دارند که یک تصویر را با تجزیه و تحلیل بسیار عالی به دست می‌آورند.

طیور می‌توانند رنگ‌ها را تشخیص دهند و نسبت به رنگ بنفس و نارنجی تمايل بيشتری نشان می‌دهند.

منقار: منقار از اپیدرم پوست بوجود آمده و جنس آن شاخی است. منقار عمل لب را در طیور انجام می‌دهد و از آن برای گرفتن غذا استفاده می‌شود. منقار اردک پهن و صاف و منقار مرغ چون دانه‌خوار است تیز می‌باشد.

منقار شامل ۲ بخش متفاوت می‌باشد. این ۲ بخش عبارتند از: منقار بالایی و منقار پایینی. سوراخ‌های بینی نزدیک قاعده منقار بالایی قرار دارند.

(شکل ۱-۷)

ریش: ریش در طیور لایه دو گانه‌ای از پوست می‌باشد که کشیده یا متورم شده است. لایه عمقی زیر پوست در این ناحیه در برگیرنده رگ‌های خونی بسیاری می‌باشد که به همین دلیل ریش‌ها پُر خون و قرمز رنگ می‌باشند. ریش‌ها در خروس بزرگ‌تر از مرغ است. از ریش برای تشخیص نژادها نیز استفاده می‌شود.

اندام شناوایی: گوش از یک سوراخ صوتی خارجی، که در واقع به منزله سوراخ خارجی گوش می‌باشد، شروع شده و به داخل مجرایی به نام ناوдан صوتی خارجی راه می‌یابد. شناوایی طیور معادل شناوایی پستانداران است.

اندام بینایی: اندام بینایی در برگیرنده کره چشم و اندام‌های فرعی است. اندام‌های فرعی شامل پلک‌ها، بافت



## فعالیت عملی




### پوشش بدن طیور

- ۱- یک قطعه جوجه و یک قطعه مرغ یا خروس تهیه نمایید.
- ۲- پرهای جوجه و مرغ را به طور دقیق مشاهده کنید.
- ۳- پر جوجه و مرغ را کنارزده و پوست آنها را مشاهده کنید.
- ۴- شکل تاج را با انواع تاج مقایسه کنید.
- ۵- از مشاهده خود گزارشی برای کلاس تهیه کنید.

## آزمون پیمانه مهارتی ۱

- ۱ - وظایف پر را نام ببرید؟
- ۲ - انواع پر را در پرندگان نام ببرید؟
- ۳ - از نظر ساختمانی، پوست از چند لایه تشکیل شده است، نام ببرید؟
- ۴ - چرا پوست بوقلمون تیره رنگ است؟
- ۵ - شدت زردی پوست طیور به چه عواملی بستگی دارد؟
- ۶ - چرا طیور توانایی تعرق و کاهش حرارت بدن در شرایط گرم‌گرما را ندارند؟
- ۷ - انواع تاج را در طیور نام ببرید؟
- ۸ - منقار در طیور مانند چه عضوی در پستانداران است؟



# دستگاه حرکتی

هدف کلی

شناخت دستگاه حرکتی طیور



## هدفهای رفتاری

در پایان این فصل هنرجو باید بتواند:

- ۱- وظایف استخوان‌بندی طیور را تعریف کنید.
- ۲- استخوان‌ها را طبقه‌بندی کرده و آنها را نشان دهد.
- ۳- ماهیچه‌ها را تقسیم‌بندی کرده و آنها را نشان دهد.




## پیش آزمون

- ۱- چرا استخوان‌های طیور سبک‌تر از سایر گونه‌ها می‌باشد؟
- ۲- در مرغ ماهیچه سینه تیره است یا ماهیچه پاهای؟
- ۳- آیا حفاظت از اندام‌های حساس و داخلی بدن مثل قلب و مغز از وظایف استخوان‌ها است؟

باعث وجود تفاوت‌هایی در شکل ظاهری و فعالیت آنها شده است. وظیفه اصلی دستگاه حرکتی، تأمین تعادل و حرکت برای انجام فعالیت‌های مختلف حیاتی می‌باشد.

دستگاه حرکتی از استخوان‌ها، مفاصل، ماهیچه‌ها، رباط‌ها، تاندون‌ها، رگ‌ها و اعصاب تشکیل شده است.

دستگاه حرکتی بدن‌گان، با وجود تفاوت‌های ناشی از شرایط زیست آنها نسبت به سایر موجودات، دارای خصوصیت مشترک و یکسانی با حیوانات دیگر می‌باشد. شکل ۲-۱ اندام حرکتی جلویی تعدادی از مهره‌داران را نشان می‌دهد که نشانگر شباهت ساختاری آنها است. اما، چگونگی استفاده از این اندام،



شکل ۱-۲- اندام‌های حرکتی جلویی مهره‌داران

## ۱-۲- استخوان‌ها

استخوان‌ها از نظر شکل ظاهری به چهار دسته تقسیم می‌شوند:

**۱- استخوان‌های دراز :** استخوان‌هایی که طول شان بیشتر از عرض و ضخامت آنها می‌باشد، استخوان‌های دراز هستند و از یک تن به نام دیافیز و دو انتهای برآمده به نام ای بی‌فیز تشکیل شده‌اند. استخوان‌های بازو و ران از این استخوان‌ها تشکیل شده‌اند.

**۲- استخوان‌های کوتاه :** طول، عرض و ضخامت این استخوان‌ها تقریباً یکسان است. مانند استخوان‌های انگشتان پا و بال پرنده.

**۳- استخوان‌های پهن :** استخوان‌هایی هستند که ضخامت آنها کمتر از طول و عرضشان می‌باشد. استخوان‌های کتف و جمجمه از این نوع استخوان‌ها هستند.

استخوان‌ها، اندام مقاوم و سخت بدن می‌باشند و مانند سایر اعضای بدن، ساختمان و فیزیولوژی مخصوص دارند. استخوان‌بندی یا اسکلت، از به هم پیوستن استخوان‌ها و غضروف‌ها بوجود می‌آید.

**نقش و وظایف استخوان‌ها، عبارت است از :**

- ۱- به بدن حیوان شکل می‌دهد.
- ۲- در تولید سلول‌های خونی، دخالت داردند.
- ۳- مواد معدنی مورد نیاز بدن را ذخیره می‌کنند.
- ۴- اندام‌های حساس و داخلی بدن مثل قلب و مغز را حفظ می‌کنند.
- ۵- در تعادل بدن و حرکات حیوان نقش اصلی را دارند و نقطه اتکای ماهیچه‌ها هستند.

استخوان‌بندی ستون مهره‌ای - از تعدادی استخوان به نام مهره تشکیل شده است، که تعداد آنها در نواحی مختلف بدن طیور متفاوت می‌باشد.

**مهره‌های گردن:** تعداد مهره‌های گردنی در طیور بین ۱۴ تا ۱۷ عدد می‌باشد و در قو حداکثر ۲۵ عدد است. در پرندگان، تعداد مهره‌ها نسبت به پستانداران بسیار متغیر است. مهره اطلس، اولین مهره گردن است که در قسمت جلویی با استخوان پس‌سری و در قسمت عقبی به آسه، مهره دوم گردن متصل می‌شود. در طیور، آخرین مهره گردنی با سه مهره اول سینه‌ای متصل می‌شود. تعداد زیاد استخوان‌های گردن طیور سبب چرخش آسان گردن آنها می‌شود.

**مهره‌های سینه‌ای (پشتی):** در طیور ۴ تا ۷ مهره سینه‌ای وجود دارد که ۲ تا ۵ مهره سینه‌ای ابتدایی با یکدیگر متصل هستند و یک استخوان واحد به نام نوتاریوم<sup>۱</sup> را به وجود می‌آورند.

استخوان مهره‌های سینه‌ای به صورت زمینه‌ای ثابت برای اتصال بال‌ها و عضلات به آنها در آمده‌اند.

**مهره‌های کمر و لگن:** در طیور، فاصله‌ای بین مهره‌های کمر و لگن وجود ندارد و این مهره‌ها با لگن خاصره یکی شده و استخوان سینساکروم<sup>۲</sup> را تشکیل می‌دهند. تعداد این مهره‌ها در طیور ۱۵ تا ۱۶ عدد می‌باشد.

استخوان‌های ناحیه لگن بر خلاف پستانداران از وسط به هم پیوسته نشده‌اند و انعطاف‌پذیر می‌باشد و به این ترتیب طبیعت اجازه می‌دهد تا تخم به آسانی از میان آنها بگذرد. فاصله بین دو استخوان لگن و همچنین فاصله بین این استخوان‌ها و قسمت انتهای جناغ سینه، در تشخیص مرغ‌های نژاد تخمی از گوشتی مؤثر است.

**مهره‌های دمی:** در ناحیه پشتی سینساکروم در طیور تعداد ۶ مهره دمی آزاد وجود دارد که در پرواز پرنده دخالت

**۴- استخوان‌های نامنظم:** این استخوان‌ها شکل منظمی ندارند و در هیچ یک از گروه‌های بالا قرار نمی‌گیرند. مانند استخوان‌های مهره گردن و کشک.

ساختمان استخوان از دو نوع بافت تشکیل شده است:


- ۱- بافت استخوانی متراکم
- ۲- بافت استخوانی اسفنجی

## ۲-۲- اسکلت واستخوان‌بندی طیور


اسکلت پرندگان بسیار سبک‌تر و در عین حال قوی‌تر از حیوانات دیگر است. به این دلیل استخوان‌های پرندگان توخالی بوده ولی برای استحکام آن پیوندهای شبکه‌ای در داخل آن وجود دارد که در عین سبکی، قدرت و استحکام فوق العاده‌ای به آن می‌دهد.

استخوان‌بندی مرغ در شکل ۲-۴ نشان داده شده است و در ادامه به معرفی قسمت‌های مختلف آن اشاره می‌گردد.


**استخوان‌های سر:** این استخوان‌ها، جمجمه را می‌سازند که ۸ قطعه دارد و شامل: دو استخوان گیجگاهی، دو استخوان شب‌پره، استخوان پرویزنی، آهیانه، پس‌سری و استخوان پیشانی می‌باشد. (شکل ۲-۲)



شکل ۲-۲- جمجمه مرغ



شکل ۳-۲- دندوهای مرغ



شکل ۴-۲- استخوان بندی طیور

دارند. چند مهره آخر دمی به هم چسبیده‌اند و استخوان واحدی به نام بی‌گوستیل<sup>۱</sup> را بوجود آورده‌اند که محل اتصال داخلی‌ترین پرهای دمی است. این استخوان در قرقاوی و شترمرغسانان دیده نمی‌شود. در اردک وغاز، ۲ غده چربی هم در این قسمت وجود دارد که در چرب کردن پرها و جلوگیری از خیس شدن آنها مؤثرند.

**قفسه سینه:** محفظه‌ای است که به وسیله استخوان‌های مهره‌های پشت (سینه‌ای)، دندوهای، جناغ سینه و ترقوه احاطه شده است.

**جناغ:** در پرندگان نسبت به دیگر مهره‌داران بیشتر رشد کرده است و به عنوان عامل اصلی در طبقه‌بندی پرندگان به کار می‌رود. جناغ، استخوانی پهن و بزرگ است که در قسمت وسطی و خارجی آن، یک تیغه دیده می‌شود و ماهیچه‌های بال به آن متصل می‌شوند.

**دندوهای:** پرندگان ۳ تا ۹ جفت دنده حقیقی دارند. کبوترها کمترین تعداد دنده و قوها، بیشترین تعداد دنده را دارند.

طیور ۷ جفت دنده دارند که ۲ دنده اولی آزاد هستند و ۵ دنده بعدی به استخوان جناغ سینه متصل شده‌اند. (شکل‌های ۲-۳ و ۲-۴)

**اندام حرکتی جلویی:** در پرندگان برای پرواز، تغییر شکل پیدا کرده و شامل کمربند سینه‌ای (کتفی) و بال می‌باشد. کمربند سینه‌ای در بردارنده استخوان‌های کتف، ترقوه، کوراکوئید یا غرابی است.


**۱- استخوان کتف:** استخوان تیغه‌ای شکل بلندی است که به طور محکم به وسیله رباط‌ها به دندوهای متصل شده است. در پرندگان قوی پرواز، کتف بلندترین استخوان و در پرندگان ضعیف پرواز، مانند شترمرغ بسیار کوچک است.

**۲- استخوان ترقوه:** استخوانی به شکل V است که در ناحیه شکمی قرار دارد.

انگشت کوچک به سمت عقب و سه انگشت دیگر به سمت جلو امتداد دارند و به ترتیب دارای ۴، ۳، ۲ و ۵ بند هستند. (شکل ۲-۵-الف و ب)

### ۲-۳- ماهیچه‌ها


پرنده‌گان دارای سیستم ماهیچه‌ای پیچیده‌ای هستند و به طور معمول رنگ عضله‌های آنان سفید می‌باشد. بافت ماهیچه‌ای از اعضای قبل انتقباض اصلی بدن می‌باشد که وظیفه تمام حرکات را در حیوان به عهده دارد. ۳ نوع عمدۀ ماهیچه وجود دارد (شکل‌های ۲-۶، ۲-۷، ۲-۸). ماهیچه صاف در رگ‌های خونی، روده و دیگر اندام‌های غیر ارادی بدن وجود دارد. ماهیچه قلب و ماهیچه مخطط دو نوع دیگر ماهیچه می‌باشند. مسئولیت ماهیچه مخطط برای اغلب حرکات ارادی می‌باشد و پروتئین قابل مصرف لاشه را تشکیل می‌دهد.



شکل ۲-۵



شکل ۲-۶ - ماهیچه مخطط



شکل ۲-۷ - سلول‌های ماهیچه قلب



۳- استخوان کوراکوئید یا غرابی: در بیشتر پرنده‌گان، استخوانی حجمی است. استخوان‌های غرابی با اتصال محکم به جناغ، به صورت یک میله عمل می‌کنند و در طول پرواز بال‌ها را از جناغ دور نگه می‌دارند.

اسکلت بال به طور مشخص از استخوان‌های بازو، زند زیرین و زند زبرین، استخوان‌های مچ، استخوان‌های قلم دست و سه انگشت تشکیل شده است.

استخوان بازو دارای منافذ هوایی می‌باشد که موجب ارتباط این استخوان با کیسه‌های هوایی می‌شود.

استخوان‌های زند زبرین و زند زیرین از دو سر به هم چسبیده و از وسط از هم جدا می‌باشند.  
اندام حرکتی عقبی (پاها): در پرنده‌گان شامل استخوان ران، ساق پا (نازک نی و درشت نی)، استخوان قلم پا و انگشتان می‌باشد.

استخوان ران در پرنده‌گان کوتاه و حجمی است. این استخوان در بالا به وسیله برجستگی کوچکی با استخوان لگن خاکره و در انتهای پایینی به استخوان‌های ساق، متصل می‌شود.  
استخوان ساق پا شامل درشت نی و نازک نی می‌باشد که در قسمت انتهایی به هم چسبیده‌اند. درشت‌نی، درازترین استخوان طیور است.

استخوان قلم پا، مجموعه‌ای استخوانی است که از اتصال استخوان‌های مچ پا با سه استخوان قلم پا به وجود آمده است.  
در بیشتر پرنده‌گان به ویژه ماکیان ۴ انگشت وجود دارد که یک



شکل ۹-۲- عضله سینه مرغ

ماهیچه‌های سینه، ران و پا مهم‌ترین سیستم ماهیچه‌ای پرنده‌گان می‌باشند. ماهیچه سینه برای تطابق پرنده‌گان برای پرواز، بخش بزرگی از سیستم ماهیچه‌ای را تشکیل می‌دهد. بزرگ‌ترین ماهیچه بدن مرغ، ماهیچه سینه و قوی‌ترین آن ماهیچه زیر پوستی می‌باشد.

مرغ و بوقلمون دارای دو نوع ماهیچه سفید و قرمز می‌باشند که به گوشت سفید و قرمز معروفند. ماهیچه قرمز دارای مقدار بیشتری میوگلوبین نسبت به ماهیچه سفید است. میوگلوبین، ترکیب آهن‌دار حامل اکسیژن است و از بعضی جهات مانند هموگلوبین می‌باشد و نقش انتقال اکسیژن و دی‌اکسید کربن را به عهده دارد.

در طیور ماهیچه پاها تیره‌تر از ماهیچه سینه است، زیرا به هنگام ایستادن و برای قائم نگه داشتن بدن فشار بیشتری به آنها وارد می‌شود. (شکل ۹-۲)

## فعالیت عملی

۱- در آزمایشگاه عکس و اسناید مربوط به اسکلت پرنده را مشاهده نمایید.

۲- با تشریح مرغ، استخوانهای مختلف و ماهیچه‌های بدن مرغ را مشاهده کنید.



## آزمون پیمانه مهارتی ۲

- ۱- وظیفه اصلی دستگاه حرکتی چه می‌باشد؟
- ۲- نقش و وظایف استخوان‌ها را بنویسید.
- ۳- استخوان‌بندی یا اسکلت چیست؟
- ۴- استخوان‌ها از نظر شکل ظاهری به چند دسته تقسیم می‌شوند؟ نام ببرید.
- ۵- ساختمان استخوان از چند نوع بافت تشکیل شده است؟
- ۶- استخوان‌های سر شامل چه استخوان‌هایی می‌باشد؟
- ۷- مهره اول و دوم گردن چه نام دارد؟
- ۸- چرا استخوان‌های ناحیه لگن در طیور برخلاف پستانداران از وسط بینم پیوسته نشده‌اند و انعطاف‌پذیر می‌باشد؟
- ۹- اندام حرکتی جلویی در پرنده‌گان شامل چه قسمت‌هایی می‌باشد؟
- ۱۰- گمرنده‌سینه‌ای شامل چه استخوان‌هایی می‌باشد؟
- ۱۱- اسکلت بال از چه استخوان‌هایی تشکیل شده است؟
- ۱۲- اندام حرکتی عقبی (پاها) در پرنده‌گان شامل چه استخوان‌هایی می‌باشد؟
- ۱۳- چند نوع ماهیچه در پرنده‌گان وجود دارد؟
- ۱۴- وظیفه اصلی ماهیچه در پرنده‌گان چه می‌باشد؟



# دستگاه گوارش

هدف کلی

شناخت دستگاه گوارش طیور



## هدفهای رفتاری

در پایان این فصل هنرجو باید بتواند:


- ۱- قسمت‌های مختلف دستگاه گوارش را شناسایی کند.
- ۲- وظایف قسمت‌های مختلف دستگاه گوارش را بیان کند.

## پیش آزمون

۱- معده مرغ چند قسمتی است؟

۲- روده بزرگ طیور شامل چه قسمت‌هایی است؟

۳- آیا ادرار و مدفوع پرنده‌گان با هم مخلوط می‌شود؟



حلق تا پیش معده ادامه دارد. (شکل‌های ۲-۳ و ۸-۳)

این لوله در اواسط مهره‌های گردن (مجاور مهره پنجم گردن) گشاده شده، کیسه‌ای به نام (چینه‌دان)<sup>۳</sup> را به وجود می‌آورد. سپس لوله مری به حالت اولیه خود برگشته تا پیش معده ادامه می‌یابد. دیواره مری و چینه‌دان از چهار لایه تشکیل شده است که به ترتیب از خارج به داخل عبارتند از: لایه سروزی، لایه عضلانی (طولی و حلقوی)، لایه مخاطی و لایه زیر مخاطی.



شکل ۱-۳—نوك و بینی شتر مرغ



شکل ۲-۳—کام و مری مرغ

دستگاه گوارش طیور در مقایسه با دستگاه گوارش سایر حیوانات تفاوت‌های ویژه‌ای دارد.

اندازه دستگاه گوارش طیور، بستگی به اندازه جثه، نوع و میزان غذای مصرفی و گونه پرنده دارد. دستگاه گوارش در مرغ‌های مادر بزرگ‌تر از جوجه‌های گوشتی است. همچنین در بعضی پرنده‌گان نظیر شترمرغ دستگاه گوارش، بسیار بزرگ‌تر از پرنده‌گان کوچک می‌باشد.

### ۱-۳—قسمت‌های مختلف دستگاه گوارش

**۱—دهان<sup>۱</sup> (حفره دهانی—حلقی):** دهان در طیور فاقد لب و دندان است و کام نرم در طیور وجود ندارد. حفره دهانی در این حیوانات به وسیله منقارها از محیط بیرون جدا می‌شود. منقارها به صورت ۲ منقار سخت و شاخی هستند که بر روی هم قرار گرفته واز عقب به هم متصلند. منقار پایین به استخوان دندانی پایین (آرواره پایین) و منقار بالا که انتهای نوک آن مقداری به طرف پایین خمیده است به استخوان فک بالا متصل می‌باشد. سوراخ بینی در طیور در سطح پشتی منقار بالا قرار دارد. بنابراین حفره دهانی در طیور از بالا به وسیله کام سخت و از طرفین به وسیله گونه‌ها و در جلو به وسیله منقارها محدود می‌شود. کام سخت در سقف حفره دهان دارای سوراخی در وسط است که به حفره‌های بینی ارتباط دارد. همچنین در پرنده‌گان هر دو فک بالا و پایین حرکت دارد اگر چه حرکت فک بالا بسیار کمتر است. (شکل‌های ۱-۳ و ۲-۳)

**۲—زبان:** در طیور متشی شکل است و دارای تیغه‌هایی در آن طرفین می‌باشد. این تیغه در حرکت غذا به طرف حلق و مری نقش مهمی دارند. با توجه به اینکه طیور فاقد قدرت مکش در دهان خود هستند این حالت زبان در تغذیه آنها بسیار مؤثر می‌باشد.

**۳—مری<sup>۲</sup>:** لوله‌ای است قابل انعطاف و عضلانی که از



شکل ۳-۳ - پیش معده و سنگدان مرغ



شکل ۳-۴ - دوازدهه (دئونوم)



شکل ۳-۵ - ژزنوم

سطح داخلی چینه‌دان از سلول‌های مخاطی پوشیده شده است. این سلول‌ها دارای ترشحات مخاطی می‌باشند.

#### ۴ - معده<sup>۱</sup> : معده در طیور شامل دو قسمت است :

- پیش معده<sup>۲</sup> (معده غده‌ای)

- معده ماهیچه‌ای یا سنگدان<sup>۳</sup>

**الف :** پیش معده (معده غده‌ای) : عضوی دوکی شکل است که در قسمت چپ حفره بدن قرار دارد. کار اصلی معده حیوانات را در طیور، پیش معده انجام می‌دهد. محل اتصال پیش معده و معده ماهیچه‌ای را تنگه<sup>۴</sup> گویند.

در سطح داخلی پیش معده طیور برجستگی‌های وجود دارند. این برجستگی‌ها حاوی غدد ترشحی هستند و ترشحات خود را به داخل پیش معده می‌رینند. این ترشحات شامل اسید معده و آنزیم‌های هضم کننده پروتئین می‌باشند. در حالی که سطح داخلی تنگه هیچ‌گونه برجستگی و یا چین خورده‌گی ندارد.

**ب :** سنگدان (معده ماهیچه‌ای) : دیواره معده ماهیچه‌ای بسیار سفت و ضخیم است ولی ضخامت آن در سطح پشتی بستر از سطح شکمی آن می‌باشد. محل قرار گرفتن آن در حفره شکمی در زیر استخوان حاجی می‌باشد. دیواره داخلی آن از لایه ضخیمی از بافت مخاطی تشکیل شده و محکم به لایه زیرین خود (لایه عضلانی) چسبیده است. (شکل ۳-۳) عمل اصلی سنگدان آسیاب کردن مواد غذایی خردشده می‌باشد.

**۵ - روده باریک<sup>۵</sup> :** بعد از سنگدان قرار گرفته و مانند روده باریک حیوانات پستاندار از سه قسمت دئونوم<sup>۶</sup> (دوازدهه)، ژزنوم<sup>۷</sup> و ایلکوم<sup>۸</sup> تشکیل شده است. ولی مرز بین این قسمت‌ها دقیقاً مشخص نیست و کل آنها را روده باریک در نظر می‌گیرند. (شکل‌های ۳-۴ ، ۳-۵ و ۳-۶) ساختمان روده باریک از سه لایه تشکیل شده است. لایه داخلی آن مخاطی است و دارای پرزهایی است که در جذب و حرکت مواد غذایی مؤثر است. طول

۱ - Stomach

۵ - Small Intestine

۲ - proventriculus


۶ - Deodenum

۳ - Gizzard

۷ - Jejunum

۴ - Isthmus


۸ - Ileum



شکل ۳-۶ - ایلنوم و روده های کور



شکل ۳-۷ - کلوآک



شکل ۳-۸ - دستگاه گوارش طیور

روده باریک مرغ  $16^{\circ}$  تا  $17^{\circ}$  سانتی متر است.

**۶- روده بزرگ<sup>۱</sup>**: روده بزرگ در طیور شامل یک جفت زایده به نام روده کور<sup>۲</sup> (سکوم) و یک بخش کوتاه و مستقیم به نام راست روده<sup>۳</sup> (رکتوم) است که به کلوآک<sup>۴</sup> ختم می شود (شکل های ۳-۶ و ۳-۸).

وظیفه اصلی روده بزرگ جذب آب از مدفوع و جذب انک بعضی از مواد غذایی هضم شده می باشد.

**۷- روده کور**: به صورت دو زایده به طول  $14^{\circ}$  تا  $23^{\circ}$  سانتی متر در دو طرف راست روده قرار دارد. این دو زایده در محل اتصال روده باریک به روده فراخ به آنها متصل می شوند (شکل ۳-۶). روده کور دارای میکروب هایی است که سلولز موجود در مواد غذایی را هضم کرده و در نتیجه گلوکز و ویتامین های گروه B و K را تولید می کنند.

**۸- کلوآک**: آخرین قسمت دستگاه گوارش طیور می باشد. کلوآک به عنوان حفره مشترک بین دستگاه تولید مثل، دفع ادرار و مدفوع می باشد. کلوآک شبیه ری شکل و دارای دو ناحیه گوارشی و ادراری - تناسلی است. ناحیه گوارشی آن به راست روده متصل بوده و محل تجمع مدفوع می باشد. در انتهای این ناحیه اسفنگتری وجود دارد که باعث نگهداری و تجمع مدفوع شده و در موقع دفع باز می شود. (شکل های ۳-۷ و ۳-۸)

**ناحیه ادراری - تناسلی**: بعد از اسفنگر ناحیه گوارشی قرار دارد. در طیور نر مجرای ادراری و مجرای خروجی منی در این ناحیه باز می شود. در انتهای ناحیه ادراری تناسلی جنس نر، اجسام فالیک وجود دارد که اندام جفت گیری جنس نر می باشد. در طیور ماده مجرای خروج منی و الات جفت گیری طیور نر به ناحیه ادراری تناسلی ماده وارد می شود. در انتهای کلوآک اسفنگتر مقعد قرار دارد که در تمام حالات به جز در موقع دفع مدفوع، جفت گیری و تخم گذاری بسته است.

(شکل های ۳-۷ و ۳-۸)

## ۲-۳- فیزیولوژی دستگاه گوارش

دستگاه گوارش در طیور عمل گرفتن غذا، عبور غذا از مجرای گوارش، هضم و جذب و بالاخره دفع مواد زاید را انجام می‌دهد.

طیور بوسیله منقار غذا را می‌گیرند. منقار عضوی شاخی است و عمل لب را در طیور انجام می‌دهد و با مجاری بینی ارتباط دارد.

زبان و نقش آن در طیور: زبان در کف دهان بصورت یک جسم مثلثی شکل قرار دارد. اگر چه زبان در پرندگان کارآئی زبان پستانداران را ندارد ولی در انتهای آن پرزهای ردبی شکلی وجود دارد که به بلع غذا کمک می‌نماید. در داخل مری غدد موکوسی وجود داشته که ترشح آنها سبب سهولت حرکت و رانده شدن غذا به طرف معده می‌گردد. (شکل ۳-۹)



شکل ۳-۹- زبان مرغ

زبان

قاد چینه‌دان است، بنابراین لازم است که غذای مرغابی به صورت خمیر آبکی و یا حداقل خیسانده به حیوان داده شود. (شکل‌های ۳-۸ و ۳-۹)


**پیش معده:** در طی توقف غذا در این قسمت، غذا با ترشحات اسیدی معده و شیره آن آغشته شده و سپس به معده اصلی رانده می‌شود.

**سنگدان:** عمل این عضو در گوارش پرندگان بسیار مهم است، زیرا همان‌طور که گفته شد طیور فاقد دندان یا عضو خردکننده غذا می‌باشند، بنابراین پس از آن که غذا داخل چینه‌دان نرم شد و در داخل پیش معده با شیره معده آغشته گردید، در داخل سنگدان به وسیله حرکت شدید و انقباضات عضلات خرد می‌شود. معمولاً داخل سنگدان تعدادی سنگریزه وجود دارد که پرنده به طور طبیعی آنها را همراه غذا یا به طور جداگانه قبل از غذا می‌بلعد، از این رو این سنگریزه‌ها همراه با انقباضات شدید سنگدان باعث خرد شدن غذا شده و به گوارش غذای پرنده کمک می‌کنند. هنگامی که غذا بخوبی در سنگدان خرد و به صورت یکنواخت و نیمه مایع درآمد به طرف دوازدهه و روده رانده می‌شود.

**روده کوچک:** روده باریک طیور بر خلاف پستانداران دارای قسمت‌های مشخصی نمی‌باشد. قسمت اول روده باریک را دوازدهه می‌نامند که ترشحات پانکراس و کبد در این قسمت به داخل روده می‌ریزد. جذب غذا به طور عمدۀ در روده کوچک انجام می‌گیرد. غذا در روده به شکل محلول آبکی و قابل جذب در می‌آید. در داخل روده کوچک پرزهای<sup>۱</sup> زیادی وجود دارد که باعث گسترش سطح جذب در روده کوچک می‌شود.

**کبد<sup>۲</sup>:** در پرندگان بسیار بزرگ و دارای دو قطعه می‌باشد که قطعه راست بزرگ‌تر و کیسه صفراء به آن متصل است. کبد ترشحات خود را که صفراء می‌باشد در کیسه صفراء جمع کرده و برای خرد کردن چربی‌ها در انتهای دوازدهه به روده و کیسه صفراء

چینه‌دان: وظیفه اصلی چینه‌دان ذخیره غذاست. هرچند ممکن است که عمل هضم روی غذا به مقدار جزیی در چینه‌دان انجام شود. به علت عدم جویدن و توقف غذا در دهان طیور، تأثیر بُراق حیوان در هضم غذا در چینه‌دان صورت می‌گیرد. مرغابی



شکل ۳-۱۰ - دستگاه گوارش طیور و سایر اندام‌های بدن

می‌ریزد (شکل ۳-۱). پانکراس نیز در تاخوردگی دوازدهه قرار دارد و رنگ آن قهوه‌ای می‌باشد. (شکل‌های ۳-۴ و ۳-۵)

**کیسه صفراء<sup>۱</sup>:** ترشحات خود را به روده کوچک می‌ریزد. (شکل ۳-۶) ترشحات لوزالمعده و کبد موجب هضم چربی‌ها، پروتئین‌ها و کربوهیدرات‌ها در روده می‌شود. رنگ سبز صفراء به دلیل رنگدانه‌های آن است.

**روده کور:** روده کور دارای میکروب‌های زیادی می‌باشد. به طوری که این میکروب‌ها سلولز موجود در مواد غذایی را در این قسمت هضم می‌کنند که نتیجه آن تولید گلوکز و همچنین ویتامین‌های گروه B و ویتامین K می‌باشد. مواد حاصل از تخمیر به وسیله میکرو ارگانیسم‌ها، به ندرت مورد استفاده بدن طیور قرار می‌گیرند.

زیرا از محل اصلی جذب (روده باریک) دور مانده‌اند. اندازه و فعالیت روده‌های کور در پرندگانی که علفخوار هستند بیشتر از پرندگان دانهخوار و یا حشره‌خوار می‌باشند.

**روده بزرگ** یا راست روده: این قسمت در حقیقت محل ریختن بقایای هضم نشده غذا است. غذای هضم نشده بوسیله حرکات روده بزرگ به طرف کلواک رانده می‌شود.

**کلواک:** محلی است که از یک طرف بقایای هضم نشده غذا (مدفوع) و از طرف دیگر ادرار و از طرفی نیز محل اتصال مجرای تناسلی و محل ریخته شدن اسپرم در آن می‌باشد.

**مخرج:** مواد دفعی پس از این که وارد کلواک شد به طرف مخرج رانده شده و از آنجا دفع می‌شود.

نکته مهمی که باید مورد توجه قرار گیرد این است که چون طول دستگاه گوارش پرندگان کم می‌باشد لذا زودتر گرسنه می‌شوند و نیاز به غذا خوردن در آنها دارای دوره کوتاه‌تری است. یکی از علت‌هایی هم که پرندگان صبح زود بیدار می‌شوند این است که چون در طول شب غذایی دریافت نمی‌کنند در نتیجه صبح زودتر از دیگر حیوانات گرسنه شده و بیدار می‌شوند.

## فعالیت عملی

شناسایی قسمت‌های مختلف دستگاه گوارش طیور:

مواد و تجهیزات لازم:

لاشه مرغ یا خروس، لوازم تشریح.

در آزمایشگاه و زیر نظر مربی لاشه را با دقیقیت باز کنید و قسمت‌های مختلف دستگاه گوارش را شناسایی نمایید.

## آزمون پیمانه مهارتی ۳

- ۱- قسمت‌های مختلف دستگاه گوارش طیور را نام ببرید.
- ۲- دیواره مری و چینه‌دان از چند لایه تشکیل شده است؟ نام ببرید.
- ۳- معده در طیور شامل چه قسمت‌هایی است؟
- ۴- معده حقيقی طیور چه نام دارد؟
- ۵- روده باریک از چه قسمت‌هایی تشکیل شده است؟
- ۶- کلوآک دارای چه نواحی می‌باشد؟
- ۷- وظیفه دستگاه گوارش طیور چه می‌باشد؟
- ۸- نقش منقار وزبان را در طیور شرح دهید؟
- ۹- وظیفه اصلی چینه‌دان در دستگاه گوارش طیور چه می‌باشد؟
- ۱۰- چرا غذای مرغابی به صورت خمیر آبکی و یا خیسانده باید باشد؟
- ۱۱- نقش پیش معده در دستگاه گوارش طیور را بیان کنید؟
- ۱۲- نقش سنگدان را در دستگاه گوارش طیور شرح دهید؟
- ۱۳- جذب غذا در کدام قسمت از دستگاه گوارش طیور انجام می‌گیرد؟
- ۱۴- وظیفه روده کور را در دستگاه گوارش طیور شرح دهید؟
- ۱۵- وظیفه روده بزرگ و کلوآک را بیان نمایید؟
- ۱۶- چرا پرنده‌گان زودتر گرسنه می‌شوند؟



# دستگاه تولید مثل

هدف کلی

شناخت دستگاه تولید مثل طیور



## هدفهای رفتاری

در پایان این فصل هنرجو باید بتواند:

- ۱- تولید مثل را تعریف کند.
- ۲- لاشه مرغ را کالبد گشایی کند.
- ۳- ساختمن قسمت‌های مختلف دستگاه تولید مثل نر و ماده را تعریف کند.
- ۴- قسمت‌های مختلف دستگاه تولید مثل نر و ماده را شناسایی کند.
- ۵- نقش هر یک از حیوانات نر و ماده را در تولید مثل بیان کند.
- ۶- وظایف هر یک از قسمت‌های دستگاه تولید مثل نر و ماده را بیان کند.
- ۷- نحوه تشکیل تخم مرغ را بیان کند.
- ۸- قسمت‌های مختلف تخم مرغ را نشان دهد.
- ۹- جنین مرغ را در روزهای مختلف جنینی مشاهده کند.

## پیش آزمون

۱- چرا بیضه‌ها در خروس داخل بدن قرار دارند؟

۲- مهمترین وظیفه تخمدان چیست؟

۳- قسمت‌های مختلف تخم مرغ را نام ببرید.

بیضه راست است. هر بیضه از تعداد زیادی لوله‌های سیلندری شکل تشکیل شده که به آنها لوله‌های سمینی فر (منی‌ساز) گویند. وظیفه اصلی بیضه‌ها تولید اسپرم<sup>۲</sup> است.

سلول‌های اسپرماتوزوئید (اسپرم) از یک سر کشیده

و گردن و دم تشکیل شده و در مایع منی شناورند.

**۲— مجرای منی بر :** مایع منی به همراه اسپرم‌ها بوسیله

کانال دفران (مجري مني بر) به کلوآک بردہ می‌شوند. کلوآک از سه قسمت تشکیل می‌شود که به وسیله پرده افقی از هم جدا می‌شوند. در قسمت وسطی برجستگی کوچکی وجود دارد که به منزله آلت تناسلی جنس نر می‌باشد و کانال دفران در کنار آن باز می‌شود و در هنگام جفتگیری کلوآک جنس نر روی کلوآک ماده قرار می‌گیرد و مایع ازال بوسیله این برجستگی به داخل اویدوکت که مدخل آن در دیواره کلوآک ماده قرار گرفته

می‌ریزد.


دستگاه تولید مثل پرندگان دارای اختلافاتی با دیگر جانداران به ویژه پستانداران می‌باشد.

## ۱—۴— دستگاه تولید مثل نر


دستگاه تولید مثل جنس نر، شامل بیضه‌ها<sup>۱</sup> و مجرای منی بر است.

**۱— بیضه :** بیضه‌ها از دو عضو کوچک بیضوی شکل تشکیل شده‌اند که در انتهای جلویی کلیه و در دیواره پشتی بدن آویزان هستند. (شکل ۱-۴) بر خلاف پستانداران که بیضه‌ها در داخل کیسه بیضه قرار داشته و خارج از بدن است، بیضه‌های خروس در داخل بدن و بدون پوسته می‌باشند، زیرا عمل اسپرم‌سازی در خروس در دمای بدن انجام می‌گیرد.



رنگ معمولی بیضه‌ها زرد است ولی در برخی اوقات ممکن است دارای رنگدانه باشد. بیضه چپ کمی بزرگ‌تر از



شکل ۱—۴— دستگاه تولید مثل نر



شکل ۴-۲ - تخمدان مرغ



شکل ۴-۳ - دستگاه تولید مثل ماده

## ۴-۲ - دستگاه تولید مثل ماده

دستگاه تولید مثل پرنده ماده از دو قسمت تشکیل گردیده

است:

**۱ - تخمدان<sup>۱</sup>**: تخمدان چپ بزرگ و فعل و تخمدان

راست کوچک و غیرفعال می‌باشد. تخمدان چپ در داخل محوطه بطني و نزدیک کلیه‌ها قرار گرفته است و در پرنده بالغ شبیه خوشة انگور می‌باشد که از زردّه‌های متعدد و به اندازه‌های مختلف تشکیل شده است که به آنها اووسیت گویند. از رسیدن این اووسیت‌ها زرده کامل و رسیده حاصل می‌گردد.

مهم‌ترین وظیفه تخمدان، تولید تخمک (زرده تخم مرغ)

می‌باشد. زرده در واقع اندوخته غذایی تخمک می‌باشد. (شکل ۴-۲)

**۲ - مجرای تخم بر<sup>۲</sup>**: مجرای تخم بر لوله بزرگ، بهن

وتا خورده‌ای است که قسمت اعظم محوطه بطني به خصوص قسمت چپ را فرا گرفته و تا نزدیکی کيسه هوایی پشتی ادامه دارد. سطح اويدوکت دارای عروق خونی زیادی می‌باشد و از ۵ قسمت تشکیل شده است (شکل ۴-۳):

قسمت اول به شکل قيف بوده و در زير تخمدان چپ قرار

گرفته و به آن شیپور یا فانل<sup>۳</sup> می‌گویند.

قسمت دوم درازتر است ماگنوم<sup>۴</sup> نامیده می‌شود.

قسمت سوم تنگه<sup>۵</sup> نامیده می‌شود.

قسمت چهارم رحم یا زهدان<sup>۶</sup> است.

قسمت پنجم مهبل<sup>۷</sup> نامیده می‌شود که در داخل کلوآک باز

می‌شود.

و حجم زرده شروع به افزایش می‌کند. هنگامی که قطر فولیکول به اندازه کافی افزایش یافت، در قسمتی که فاقد رگ‌های خونی می‌باشد و استیگما نام دارد ترک بر می‌دارد و تخمک بالغ آزاد شده و از این زمان به بعد زرده نامیده می‌شود.

زرده تخم مرغ آزاد شده به داخل شیپور مجرای تخم بر می‌افتد که به این عمل تخمک‌گذاری<sup>۱</sup> می‌گویند. این مرحله ۱۸ تا ۲۰ دقیقه طول می‌کشد.

**شیپور دارای دو وظیفه می‌باشد:**

(۱) گرفتن زرده از تخدمان

(۲) محل بر خورد اسپرماتوزوئید با زرده می‌باشد. اگر جفت‌گیری بین خروس و مرغ انجام شده و اسپرم به ناحیه شیپور رسیده باشد، با زرده تلاقی انجام می‌گیرد و با روری صورت می‌پذیرد و سلول تخم تشکیل می‌شود. سلول تخم شروع به رشد کرده و تولید لکه رویان (درکنار و بالای) زرده می‌کند که آن را نطفه می‌نامند. تخم با رور شده به قسمت ماگنوم می‌رسد و در این قسمت سفیده تخم مرغ در اطراف زرده تشکیل می‌شود.

سفیده دارای ۴ لایه تمایز است که عبارتند از:

(۱) شالاز که به زرده چسبیده است.

(۲) سفیده داخلی رقیق.

(۳) سفیده غلیظ.

(۴) سفیده خارجی رقیق.

تخم سپس به ناحیه تنگه می‌رسد. در این ناحیه پوسته داخلی و خارجی تشکیل می‌شود (همان پوسته‌های نازکی که زیر پوسته صدفی قرار دارند). در رحم پوسته صدفی تخم تشکیل می‌شود که برای انجام آن حدود ۱۹ تا ۲۰ ساعت وقت لازم است.

کيسه هوايی که در قسمت پهن تخم قرار دارد در ناحیه مهبل به وجود می‌آيد. در آخرین مرحله از تشکیل تخم، ماده‌ای

دستگاه تولید مثل در پرندگان اختلاف زیادی با پستانداران دارد زیرا جنین در پستانداران داخل رحم و در پرندگان خارج از رحم رشد و نمو می‌کند. دستگاه تولید مثل جنس ماده فقط برای تهیه و تولید تخم و نطفه دار کردن آن به کار می‌رود و از نظر رشد جنین وظیفه چندانی به جز چند ساعت اول بر عهده ندارد. طیور معمولاً در طی ۵ تا ۶ ماه بالغ می‌شوند و چند روزی پشت سر هم تخم می‌گذارند و سپس مدتی استراحت می‌نمایند. سیکل تناسلی بسته به ژنتیک و محیط متغیر است.

## فعالیت عملی



شناسایی قسمت‌های مختلف دستگاه تولید مثل

طیور:

مواد و تجهیزات لازم:

لاشه مرغ و خروس، لوازم کالبد گشایی لاشه.

در آزمایشگاه و زیر نظر مربي آزمایشگاه، لاشه‌ها را به دقت باز کنید. قسمت‌های مختلف دستگاه

تولیدمثل خروس و مرغ را شناسایی کنید.

### ۴-۳-مراحل تشکیل تخم پرنده

تخدمان مرغ بالغ دارای تعداد زیادی تخمک می‌باشد که در حدود ۶ تا ۱۰ روز قبل از تخم‌گذاری یکی از تخمک‌ها شروع به رشد می‌کند و بزرگ می‌شود. تخم‌ها دارای غشای زرده هستند و زرده درین آن قرار دارد.

زرده و غشای زرده از بافت رابط پوشیده شده که در این حالت به آن فولیکول می‌گویند و مویرگ‌های خونی زیادی آن را می‌پوشاند. به وسیله این مویرگ‌ها مواد غذایی به فولیکول می‌رسد

## ۴-۴- تغییرات روزانه رشد جنینی

نطفه پس از تشکیل، شروع به تقسیم و رشد می‌کند. در بدن مرغ و در حرارت مناسب بدن، مراحل اولیه رشد جنین صورت می‌گیرد. پس از تخم‌گذاری، به دلیل حرارت کمتر محیط نسبت به بدن مادر، رشد جنین متوقف می‌گردد.

توقف رشد در این مرحله، لطمہ‌ای به زندگی جنین وارد نمی‌کند و جنین برای مدتی خاصیت حیاتی خود را حفظ می‌کند. پس از مساعد شدن محیط، از جمله خواهدن مادر بر روی تخم و یا قرار دادن در ماشین جوجه‌کشی، رشد و نمو نطفه ادامه می‌یابد و پس از ۲۱ روز جوجه از تخم بیرون می‌آید.

## فعالیت عملی



یک عدد تخم مرغ پخته و یک عدد تخم مرغ تازه را شکسته و سعی کنید قسمت‌های مختلف تخم مرغ را مشاهده نمایید.

مراحل رشد و تکامل اعضای جنین از روز اول تا بیست و یک روزگی به شرح زیر می‌باشد که در شکل‌های (۴-۵) تا (۴-۲۴) مشاهده نمایید.

در روز اول، لوله‌های اولیه، ستون فقرات، اعصاب، سر و چشم تشکیل می‌شود.

در روز دوم، قلب و گوش شکل می‌گیرد و ضربان قلب شروع می‌گردد.

در روز سوم، بینی، بال‌ها و پاهای شکل می‌گیرد.

در روز چهارم، زبان و در روز پنجم، دستگاه تناسلی و تمایز جنسی تشکیل می‌شود.

در روز ششم، منقار و پنجه‌ها شکل می‌گیرد و در روزهای هفتم تا دهم پرها و منقار تشکیل می‌گردد.

مرطوب روی منافذ پوسته را می‌پوشاند.

تخم با حرکات دودی به کلوآک می‌رسد و از راه مقعد خارج می‌شود.

به طور معمول ابتدا سر باریک تخم مرغ با عبور از مجرای تخدمان تشکیل می‌گردد. جالب است بدانید که در عمل تخم‌گذاری ابتدا سر پهن تخم مرغ از بدن دفع می‌شود. به طور متوسط فاصله دو تخم‌گذاری متوالی ۲۶/۵ ساعت است و فاصله تخم‌گذاری تا تخمک اندازی بعدی ۱۴ تا ۷۵ دقیقه است.

تمام مراحل تشکیل تخم و تخم‌گذاری تحت تأثیر هورمون‌های جنسی و عوامل خارجی می‌باشد. تخمک اندازی و تخم‌گذاری تحت تأثیر روش‌نایی و تاریکی می‌باشد.

ساختمان تخم از قسمت‌های زیر تشکیل شده است

(شکل ۴-۴):

۱- صفحه رویان


۲- زرده

۳- سفیده

۴- بوزته نازک (داخلی و خارجی)

۵- پوسته صدفی

۶- کيسه هوایی



شکل ۴-۴- قسمت‌های مختلف تخم مرغ

می شود. و برای اولین بار جنین توسط ریه هایش شروع به تنفس می کند.

در روز بیستم، جنین همه فضای تخم مرغ به جز کیسه هوایی را پر می کند و سر زیر بال راست قرار می گیرد.

در اثر انقباض ماهیچه گردن وزائد منقار بالا پوسته سوراخ

می شود و در روز بیستم و یکم، جنین از تخم خارج می شود.

در روز چهاردهم جنین در موقعیت اصلی خود یعنی سر به طرف قسمت بزرگ تخم مرغ (کیسه هوایی) قرار می گیرد.

در روزهای شانزدهم و هفدهم، سفیده به طور کامل جذب و مایع جنینی کاهش می یابد. منقار و پنجه ها کاملاً سخت و شاخی شده و منقار به طرف اتاقک هوایی حرکت می کند.

در روز نوزدهم، کیسه زرده به داخل حفره بدنی وارد



شکل ۷-۴- روز سوم



شکل ۶-۴- روز دوم




شکل ۵-۴- روز اول




شکل ۱۰-۴- روز ششم




شکل ۹-۴- روز پنجم



شکل ۸-۴- روز چهارم




شکل ۱۳-۴- روز نهم




شکل ۱۲-۴- روز هشتم




شکل ۱۱-۴- روز هفتم



شكل ۱۵-۴ - روز یازدهم



شكل ۱۶-۴ - روز دهم




شكل ۱۷-۴ - روز چهاردهم




شكل ۱۸-۴ - روز سیزدهم



شكل ۱۹-۴ - روزدوازدهم



شكل ۲۰-۴ - روز شانزدهم




شكل ۲۱-۴ - روز پانزدهم



شكل ۴-۲۳—روز نوزدهم



شكل ۴-۲۴—روز هجدهم



شكل ۴-۲۵—روز هفدهم



شكل ۴-۲۶—روز بیست و یکم

## فعالیت عملی



تعداد مناسبی تخم مرغ نطفهدار را تهیه کنید و در ماشین جوجه‌کشی قرار دهید.  
سپس در روزهایی مطابق شکل‌های (۴-۲۶) آنها را شکسته و جنین‌ها را مشاهده کنید.  
مشاهدات خود را با تصاویر و متن درس مقایسه کنید.

## آزمون پیمانه مهارتی ۴

۱- دستگاه تولید مثل جنس نر شامل ... و ... می باشد.

۲- اندازه کدام بینه در خروس بزرگتر است؟

۳- وظیفه بینه در تولید مثل چیست؟

۴- دستگاه تولید مثل پرنده ماده از چند قسمت تشکیل گردیده است؟ توضیح دهید.

۵- در دستگاه تولید مثل طیور تخدمان چپ ... و ... و تخدمان راست ... و ... می باشد.

۶- مهمترین وظیفه تخدمان چه می باشد؟

۷- قسمت های مختلف مجرای تخدمان (اویدوکت) را نام ببرید؟

۸- چرا دستگاه تولید مثل در پرندگان با پستانداران اختلاف دارد؟

۹- تخمک گذاری (اوولاسیون) چیست؟

۱۰- وظیفه شیپور یا فانل چه می باشد؟

۱۱- در قسمت ماگنوم چه قسمت هایی از تخم تشکیل می شود؟

۱۲- پوسته های نازک داخلی و خارجی در کدام قسمت مجرای تخم تشکیل می شود؟

۱۳- در رحم چه قسمتی از تخم تشکیل می شود و چند ساعت زمان نیاز دارد؟


۱۴- کيسه هوایی در کدام قسمت از مجرای تخم تشکیل می گردد؟

۱۵- به طور متوسط فاصله دو تخم گذاری متوالی ... ساعت و فاصله تخم گذاری تا تخمک اندازی بعدی ... تا ... دقیقه است.

۱۶- مراحل تشکیل تخم و تخم گذاری تحت تأثیر چه عواملی هستند؟

۱۷- ساختمان تخم از چه قسمت هایی تشکیل شده است؟ نام ببرید.

۱۸- چرا پس از تخم گذاری، رشد جنین متوقف می گردد؟



# دستگاه گردش خون

هدف کلی




شناخت دستگاه گردش خون طیور



هدفهای رفتاری

در پایان این فصل هنرجو باید بتواند:

- ۱- دستگاه گردش خون مرغ را تشریح کند.
- ۲- قسمت‌های مختلف دستگاه گردش خون مرغ را نشان دهد.
- ۳- ساختمن و نحوه فعالیت قلب را توضیح دهد.
- ۴- فیزیولوژی دستگاه گردش خون را بیان نماید.
- ۵- قسمت‌های مختلف دستگاه گردش خون طیور را نشان دهد.
- ۶- اعمال خون را در بدن نام ببرد.
- ۷- گردش خون عمومی بدن طیور و گردش خون ششی را تعریف کند.
- ۸- گلbulهای قرمز خون مرغ را مشاهده کند.




پیش‌آزمون


- ۱- چند نوع رگ در بدن طیور وجود دارد؟
- ۲- قلب طیور مشابه قلب کدام دسته از حیوانات است؟ (خزندگان، پستانداران، آبزیان).
- ۳- چند نوع گردش خون در طیور وجود دارد؟



شکل ۱-۵ - قلب مرغ و موقعیت آن



شکل ۲-۵ - ساختمنان قلب پرنده



شکل ۳-۵ - دریچه های قلب پرنده

دستگاه گردش خون، انتقال مواد غذایی، گازهای تنفسی و مواد زائد در بدن طیور را بر عهده دارد. این دستگاه ارتباط بین بافت‌های مختلف بدن با دستگاه گوارش، دستگاه تنفسی و دستگاه دفع ادرار را برقرار می‌نماید.

## ۱-۵- آشنایی با دستگاه گردش خون

دستگاه گردش خون از قلب، خون و رگ‌های خونی تشکیل شده است.

**الف - قلب :** قلب در پرندگان مخروطی شکل و به رنگ قرمز تیره و نسبتاً بزرگ است. (شکل‌های ۱-۵ و ۲-۵) قلب در حفره قفسه سینه و تقریباً در خط میانی بدن به موازات محور طولی قرار دارد. نوک قلب اندکی به سمت راست خمیده است. قاعده قلب که از دھلیزها و تنہ رگ‌های بزرگ تشکیل شده است، به سمت پشت متمایل گشته و در سطح دومین دنده قرار دارد.

قلب عضو اصلی دستگاه گردش خون محسوب می‌شود. همانند یک پمپ در دستگاه گردش خون عمل می‌کند و سبب حرکت خون در رگ‌ها می‌شود. قلب به دو قسمت راست و چپ تقسیم می‌شود. هر قسمت نیز دارای یک دھلیز (حفره بالایی) و یک بطن (حفره پایینی) می‌باشد. بدین ترتیب قلب پرندگان نیز شبیه قلب پستانداران چهار حفره‌ای است. بین دھلیز و بطن چپ دریچه دولتی قرار دارد و ارتباط دھلیز و بطن راست بواسیله دریچه سه لثی برقرار می‌شود. هیچ‌گونه ارتباطی بین دھلیزها و نیز بین بطن‌ها وجود ندارد. (شکل ۳-۵)

وزن قلب در پرندگان نسبت به وزن بدن شان سبتاً زیاد

بطن چپ نوک قلب را تشکیل داده، از بطن راست بزرگتر


بوده دیواره کلفت‌تری دارد. دهلیز چپ کم حجم‌تر از دهلیز

است. (جدول ۱-۵)

راست است و دارای دیواره ضخیم‌تری است.

جدول ۱-۵— وزن قلب (درصد از وزن بدن)

کبوتر	بلدرچین	غاز	اردک	بوقلمون	مرغ	
۱-۱/۱	۰/۹	۰/۸	۰/۷۴ - ۰/۸۱	۰/۵	۰/۴۴	وزن قلب



شکل ۴-۵— ساختمان لایه‌های قلب



شکل ۵-۵— آبسامه قلب

تأمین انرژی لازم برای سوخت و ساز بدن که حرارتی بین ۴۰ تا ۴۲ درجه سانتی‌گراد دارد و نیز ضربان بسیار تند آن، از دلائل بزرگی قلب می‌باشد.

ضربان قلب در ماکیان ۳۰۰ و در گنجشک ۵۰۰ تا ۸۰۰ ضربه در دقیقه است.

مجاورت با نور شدید، استرس و هیجان‌زدگی سبب افزایش ضربان قلب می‌شود. پرندگان کوچک‌تر ضربان قلب سریع‌تری دارند.

#### قلب از سه لایه تشکیل می‌شود :


۱— لایه خارجی<sup>۱</sup> : این پرده دور قلب چسبیده و لایه ماهیچه‌ای را در بر گرفته است.

۲— لایه ماهیچه‌ای<sup>۲</sup> : ماهیچه‌ای قلب می‌باشد.

۳— لایه داخلی<sup>۳</sup> : لایه نازکی است که سطح داخلی لایه ماهیچه‌ای را مفروش می‌سازد. دریچه‌های قلبی از این لایه سرچشمه می‌گیرند. (شکل ۴-۵)

آبسامه قلب : پرده‌ای است که دور قلب قرار گرفته و دو لایه دارد. لایه داخلی آن روی لایه خارجی قلب چسبیده است.

بین دو لایه آبسامه مایع آبسامه وجود دارد که حرکات قلب را تسهیل می‌کند. (شکل ۵-۵)



## شکل ۶-۵ - رگ و گلبول‌های قرمز

گرهها به واسطه وجود دریچه‌هایی در داخل آنها می‌باشد. دیواره سیاه‌گ‌ها معمولاً نازک و تا اندازه‌ای شفاف و انبساط‌پذیر است.

مجرای سیاه رگ ها بطور کلی پهن تر از سرخرگ ها است و لی دیواره آنها نازک تر و رنگ آنها کدرتر می باشد. دیواره سیاه رگ ها نیز از سه لایه درونی، میانی و بیرونی تشکیل شده است. لایه میانی سیاه رگ ها که از بافت پیوندی بیشتری ساخته شده و نازک تر از لایه میانی سرخرگ ها است. از آنجایی که خون سیاه رگی فشار کمتری دارد و برای جلوگیری از پس رفت خون، دریچه هایی در این رگ ها وجود دارد. (شکل ۵-۷) سیاه رگ ها نیز مانند سرخرگ ها دو دسته هستند.

**سیاهہ گھا** نین مانند سرخ گھا دو دسته هستند.

سیاهه گ‌ها نیز مانند سرخ گ‌ها دو دسته هستند.


ب-رگهای خونی:

خون برای انجام کلیه وظایف خود از طریق سیستم بسته‌ای به نام رگ‌های خونی در گردش می‌باشد. سرخرگ‌ها، سیاه‌رگ‌ها و مویرگ‌ها سه نوع از رگ‌های خونی دستگاه گردش خون طیور محسوب می‌شوند. بطور کلی رگ‌هایی که خون را از قلب خارج می‌کنند، سرخرگ و رگ‌هایی که خون را به قلب باز می‌گردانند، سیاه‌رگ نامیده می‌شوند. (شکل ۵-۶)

سرخرگ‌ها دارای مقطع گرد و به شکل استوانه‌ای می‌باشند و همواره شکل خود را حفظ می‌کنند. دیواره سرخرگ از سه لایه درونی، میانی و بیرونی تشکیل شده است.

سرخرگ‌ها به دو دسته تقسیم می‌شوند. سرخرگ‌های گردش خون عمومی، حاوی خون روشن و سرخرگ‌های گردش خون ششی که حاوی خون تیره می‌باشند. سرخرگ‌ها معمولاً به صورت انشعابات دو شاخه‌ای در می‌آیند و شاخه‌های منشعب شده باریک می‌شوند. آخرین انشعابات بسیار نازک و کوچک بوده و قلیل از مویرگ‌ها قرار دارند.

سیاهگ‌ها موقعی که پر از خون باشند استوانه‌ای شکل هستند و هرگاه کشیده شوند به شکل گرداندار در می‌آیند. این



## شکل ۷-۵ - مقطع سرخگ و سیاھگ

می‌دهد. اجزای مختلف پلاسمای گازهای  $O_2$  و  $CO_2$ ، پروتئین، نمک‌های غیر آلی و ویتامین‌ها می‌باشند. پلاسمای وسیله‌ای برای انتقال سلول‌های خون و مواد شیمیایی می‌باشد. وظیفه مهم پلاسمای ایجاد فشار اسمزی در خون است. پرندگان به کمک فشار اسمزی، انتقال آب از مویرگ‌ها به سلول‌های بدن را تنظیم می‌کنند.

### گلبول قرمز<sup>۲</sup>:

گلبول قرمز برای حمل اکسیژن تخصص یافته است و در پرندگان بیضی شکل و دارای هسته می‌باشد.


هموگلوبین جزء اصلی ساختمان گلبول قرمز است و از پروتئینی به نام گلوبین و ماده معدنی آهن تشکیل می‌شود. هموگلوبین، گلبول‌های قرمز را برای حمل اکسیژن توانایی سازد. مهمترین وظیفه گلبول قرمز انتقال اکسیژن است. این عمل نتیجه میل ترکیبی ضعیف آهن موجود در هموگلوبین با اکسیژن می‌باشد. هموگلوبین در گلبول قرمز قرار دارد و میوگلوبین در عضلات جهت ذخیره اکسیژن قرار گرفته است.

نخستین سلول‌های خونی بوسیله دیواره کیسه زرده وجود می‌آیند. در دوران جنبی کبد و طحال گلبول‌های قرمز را تولید می‌کنند. در پرندگان بالغ این سلول‌ها در مغز استخوان تولید می‌شوند. طحال مخزن گلبول قرمز می‌باشد و محتویات خود را در دستگاه گردش خون تخلیه می‌کند. طول عمر گلبول قرمز از هنگام ورود به خون تا زمان مرگ آن در حدود  $21^{\circ}$  روز می‌باشد. ولی در طیور به دلیل متابولیسم و فعالیت بیشتر حدود  $25$  تا  $45$  روز است.

تعداد گلبول قرمز بر حسب گونه، جنس، سن و ارتفاع محل زندگی متفاوت است. حدود سه میلیون گلبول قرمز در هر میلی‌لیتر مکعب از خون طیور وجود دارد. (تصویر ۵-۹)

سیاهرگ‌های گردش عمومی بدن حاوی خون تیره (دارای  $50\%$  بیشتر) و سیاهرگ‌های ششی که حاوی خون تمیز (دارای  $5\%$  بیشتر) می‌باشند. سیاهرگ‌ها به وسیله شاخه‌های کوچک و بسیار باریکی در دنباله مویرگ‌ها قرار می‌گیرند. سیاهرگ‌های کوچک به یکدیگر ملحق شده و رگ‌های بزرگ‌تری را تشکیل می‌دهند تا این که بوسیله رگ‌های اصلی به دهلیزها منتهی شوند.

سرخرگ‌ها و سیاهرگ‌ها به وسیله شبکه‌ای از رگ‌های مویرگ نامیده می‌شوند به یکدیگر متصل می‌گردند. (تصویر ۸-۵)



شکل ۸-۵- شبکه مویرگ (مویرگی)

این رگ‌ها ظریفترین دیواره را دارند. مواد غذایی و گازها با عبور از این دیواره بین سلول‌ها و خون جابجا می‌شوند.


### ج - خون :

خون در برگیرنده مایع پلاسمای سلول‌های خونی (گلبول قرمز، گلبول سفید و ترومبوسیت‌ها<sup>۱</sup>، قند، پروتئین، چربی، املاح و هورمون‌ها می‌باشد. رنگ خون سرخرگی که اکسیژن بیشتری دارد سرخ درخشان و بر عکس خون سیاهرگی که اکسیژن کمتری دارد قرمز تیره است. pH خون کمی قلیابی است ( $7.4$ ).

### پلاسمای:

قسمت بدون سلول خون لخته نشده یا مایع خون را پلاسمای نامند. پلاسمای  $55$  تا  $70$  درصد حجم خون را تشکیل

گلbul های سفید در مغز استخوان و غدد لنفاوی ساخته می شوند. اهمیت گلbul های سفید در مقابله با عوامل خارجی و عفونت ها است. (شکل ۱۰-۵)



شکل ۱۰-۵ - سلول های سفید خون


ترومبوسیت ها (پلاکت ها):  
شکل آنها از بیضی تا گرد متغیر است. در مغز استخوان و طحال تولید می شوند و نقش اساسی آنها در جلوگیری از خونریزی است.

#### فشار خون:

همانند انسان در پرندگان نیز دو فشار خون سرخرگی و فشار خون برگشتی به قلب اندازه گیری می شود. فشار خون پرندگان با واحد میلی متر جیوه بیان می شود. (جدول ۵-۲)

#### اعصاب قلب:

اعصاب قلب شامل عصب سینپاتیک و عصب واگ می باشد. عصب سینپاتیک افزایش دهنده ضربان قلب و عصب واگ سبب کاهش ضربان آن می شود.



شکل ۹-۵ - گلbul های قرمز هسته دار پرندگان

## فعالیت عملی

یک قطره از خون مرغ را روی لام ریخته و لایه نازکی از آن را تهیه نمایید اکنون گلbul های قرمز را زیر میکروسکوپ مشاهده نمایید.

#### گلbul سفید:

تعداد گلbul های سفید بسیار کمتر از گلbul های قرمز است. این سلول ها هسته دار بوده و به اشکال مختلف دیده می شوند. وظیفه اصلی این سلول ها در ارتباط با سیستم های دفاعی بدن می باشد.

بسیاری از آنها ریزه خوار هستند بدین معنی که می توانند مواد ریز، مانند باکتری ها و قطعات سلول های تخریب شده را در خود فرو بزنند. برخی دیگر قادرند در اطراف محل عفونت تجمع کرده و مستقیماً به میکروب ها حمله کنند.


## جدول ۲-۵ - فشار خون برخی از پرندگان اهلی (میلی متر جیوه)

فشار خون برگشت	فشار خون سرخرگی	
۱۳۰ - ۱۴۴	۱۴۰ - ۱۶۰	مرغ
۱۴۵ - ۱۵۰	۱۸۰ - ۱۹۵	خرس
۲۰۰	۲۵۰ - ۲۶۰	بوقلمون ماده
۲۲۰ - ۲۳۰	۲۹۰ - ۳۰۰	بوقلمون نر
۱۸۰	۱۷۰	اردک ماده
۱۴۵	۱۸۰	اردک نر

می‌دهد چرخه قلب نامیده می‌شود. عمل قلب دو مرحله دارد.

## ۱- انقباض قلب:

در این مرحله انقباض دهلیزها و بطن‌ها اتفاق می‌افتد و خون از قلب خارج شده و به درون سرخرگ‌ها رانده می‌شوند.  
(مرحله ۱ و ۲ شکل ۱۱-۵)




شکل ۱۱-۵ - انقباض و انبساط قلب

لُف: لُف یک سیستم فرعی برای جذب مواد و مایعات بین سلولی به داخل جریان خون می‌باشد. همچنین لُف یکی از راه‌های اصلی جذب مواد (بویژه چربی‌ها) در دستگاه گوارش محسوب می‌شود. مهم‌ترین عمل رگ‌های لنفاوی خارج کردن ذرات بزرگ مواد تخریب شده بافت‌ها از فضای بین سلولی می‌باشد. ترکیب لُف شبیه پلاسمای است با این تفاوت که مقدار پروتئین در آن کمتر است. سیستم لُف در اکثریت طیور از مجاری لنفاوی و غدد لنفاوی تشکیل شده است و تمامی لُف موجود در نهایت به سیستم سیاهرگی می‌ریزد. مجاری لنفاوی ابتدا به غدد لنفاوی می‌رسند که مانند صافی عمل کرده و مانع ورود مواد خارجی به جریان خون می‌شوند. در این غدد سلول‌های بیگانه‌خوار وجود دارد که قادر به هضم ذرات خارجی می‌باشند. علاوه بر این غدد لنفاوی قادر به ساختن مواد ایمنی نیز می‌باشند.

۲-۵ - آشنایی با فیزیولوژی دستگاه گردش خون  
چرخه قلب

مجموعه اعمالی که بدنبال هم در یک جریان کامل قلب رخ



شکل ۱۲-۵- گردش خون قلب

## ۲- انبساط قلب:

این مرحله، مرحله استراحت عضلات قلب می‌باشد. همان‌طور که در مرحله سوم (شکل ۱۱-۵) مشاهده می‌کنید، ابتدا دهلیزها از خون پرشده و منبسط می‌شوند و سپس در مرحله چهارم بطن‌ها از خون پر می‌شوند که در مجموع انبساط را تشکیل می‌دهند.

### جهت حرکت خون در دستگاه گردش خون:

در هر چرخه قلبی خون اکسیژن‌دار از دهلیز چپ به بطن چپ وارد می‌شود. با انقباض بطن چپ، خون از قلب به سرخرگ آورت می‌رود. سپس با فشار به سرخرگ‌های کوچک و مویرگ‌ها رانده شده و به تمام اعضای بدن منتقل می‌شود. پس از استفاده سلول‌ها از اکسیژن و مواد شیمیایی و  $CO_2$ ، خون بدون اکسیژن و  $CO_2$  دار از طریق سیاهرگ‌ها به قلب باز می‌گردد. در این هنگام خون به دهلیز راست می‌ریزد. این بخش از گردش خون را **گردش خون عمومی** یا **گردش خون بزرگ** می‌نامند.

۱- مواد غذایی را از دستگاه گوارش گرفته و به سلول‌های را از آنها می‌گیرد.

۲- مواد زائد حاصل از فعالیت سلول‌ها را دریافت می‌کند و به اندام‌های دفعی مانند کلیه‌ها انتقال می‌دهد.

۴- تولیدات هورمونی را به بخش‌های مختلف بدن طیور منتقل می‌کند.

۵- به تنظیم آب بافت‌های بدن کمک می‌کند.

۶- در تنظیم درجه حرارت بدن نقش مهمی دارد.

۷- در مقابل عوامل بیماریزا توسط سلول‌های سفید از بدن دفاع می‌کند.

### تبادلات گازهای تنفسی:

مویرگ‌ها آخرین انشعابات رگ‌های خونی می‌باشند. تقسیمات انتهایی مویرگ‌ها به صورت انشعابات موازی می‌باشند که با این عمل کمترین مقاومت عروقی را ایجاد می‌کنند. دیواره مویرگ‌ها تنها از یک ردیف سلول پهن و نازک تشکیل گردیده است. اغلب مویرگ‌ها قادر پوشش خارجی می‌باشند و یا این پوشش به صورت

سپس خون از دهلیز راست به بطن راست وارد می‌شود و از آنجا به وسیله سرخرگ ششی به طرف ریه‌ها رانده می‌شود. در ریه‌ها پس از تبادلات گازی ( $CO_2$  و  $O_2$  و گرفتن  $O_2$ )، خون به وسیله سیاهرگ ششی به دهلیز چپ وارد می‌شود. این بخش از گردش خون را **گردش خون ششی یا گردش خون کوچک** می‌نامند.

در (شکل ۱۱-۵) گردش خون بزرگ و کوچک را مشاهده کنید.

در گردش عمومی، خون اکسیژن را به سلول‌ها رسانده و دی اکسید کربن را دریافت می‌کند و در گردش ششی، خون، دی اکسید کربن را به ریه پس داده و اکسیژن دریافت می‌کند.

### فیزیولوژی خون (اعمال خون):

خون اعمال متعددی را در بدن طیور بر عهده دارد:

۱- اکسیژن را به سلول‌های بدن رسانده و دی اکسید کربن

### ۵-۳ مقایسه دستگاه گردش خون پرنده‌گان و پستانداران

قلب پستانداران و پرنده‌گان ساختمانی مشابه دارد. ولی مرغها به خاطر ظرفیت کم انتقال اکسیژن در خون، نیازهای بافت‌های خود را با بالا بردن عملکرد سیستم قلبی عروقی مثل جریان خون زیاد، افزایش فشار خون سرخرگی و افزایش سرعت قلب حفظ می‌کند. بنابراین توده بطن چپ قلب در مقایسه با پستانداران بزرگ بوده و دهیز راست که به عنوان یک منبع ذخیره‌ای اصلی بکار می‌رود، نیز بزرگ‌تر از دهیز چپ است. (شکل ۵-۱۴)



شکل ۵-۱۴— مقایسه گردش خون پرنده‌گان و پستانداران با دوزیستان و ماهیان

مویرگ‌های خونی در طیور به مراتب کوچک‌تر از مویرگ‌های پستانداران است ولی دارای حجم بیشتری از خون و نیز دارای افزایش سطح و کارایی بالاتری در تبادل گاز می‌باشند. گلbul قرمز طیور بیضی شکل بوده و دارای هسته است. در خون طیور تعداد گلbul‌های قرمز نسبتاً کم (در حدود نصف تراکم آن در پستانداران) است ولی اندازه آنها بزرگ‌تر است. گلbul قرمز پستانداران فاقد هسته و به شکل دیسکی است که در وسط از دو طرف فرو رفتگی دارد.

در پرنده‌گان همانند پستانداران گردش خون عمومی بدن با آئورت آغاز می‌شود و گردش خون ششی (کوچک) نیز با سرخرگ ششی شروع می‌گردد.

بسیار ظرف و نازکی در آمده است. سلول‌های دیواره مویرگی در بین خود دارای فواصل نسبتاً ریز و درشتی به منظور تبادلات مایعات و مواد غذایی می‌باشند. هدف و وظیفه اصلی مویرگ‌ها، انتشار مواد غذایی واکسین از دیواره آنها به داخل بافت‌ها و خروج مواد زاید و دی اکسید کربن از بافت‌ها به مویرگ‌ها می‌باشد.

#### گردش خون ششی :

گردش خون در شش‌ها به دلیل نقش آنها در تبادلات گازهای تنفسی از اهمیت خاصی برخوردار است. گازهای تنفسی بین مویرگ‌ها و سلول‌های شش‌ها (با توجه به مقدار فشار آنها در دو طرف دیواره رگ‌ها) جابجا می‌شوند.

در این حالت عملیات انجام شده کاملاً برعکس تبادل گازها در سلول‌های بدن است و بدین ترتیب دی اکسید کربن به شش‌ها واکسین به جریان خون منتقل می‌شود خون اکسین از دهیز بوسیله سیاهرگ ششی به قلب می‌رود.

#### لخته شدن خون :

جلوگیری از خونریزی با لخته شدن خون و انقباض رگ صورت می‌پذیرد. برای لخته شدن ترومبوسیت‌ها به هم می‌چسبند و از طرفی یکی از پروتئین‌های خون به نام فیبرینوژن به رشته‌های فیبرین تبدیل می‌شود و موجب ایجاد یک شبکه توری وایجاد لخته می‌گردد. (شکل ۵-۱۳)



شکل ۵-۱۳— لخته شدن خون

اما بافت‌های لنفاوی اختصاصی در ارتباط با لوله

گوارشی وجود دارند. تنها اردک و غاز از پرندگان اهلی غدد

مرغ‌ها قادر غدد لنفاوی مشخص مانند غدد لنفاوی

سیستم لنفاوی طیور از نظر تکاملی بین سیستم‌های لنفاوی

دو زیستان و پستانداران قرار می‌گیرد.

مرغ‌ها قادر غدد لنفاوی مخصوص مانند غدد لنفاوی

پستانداران هستند.

## فعالیت عملی

### وسایل و تجهیزات لازم:

میز تشریح - قیچی جراحی دو لبه (تیز، کند) - پنس شصتی - دستکش - روپوش.

۱- با نظر مریبیان، در کلاس گروه‌بندی نمایید.

۲- دستکش‌ها را دست کنید و روپوش پوشید.

۳- مرغ را به پشت بر روی میز بخوابانید به نحوی که پاها به سمت خودتان باشد.

۴- انگشت شست را روی ران و سایر انگشتان را در پشت ران قرار دهید. با فشار انگشت شست ران‌ها را از بدن جدا کرده و پرنده

را کاملاً به میز بچسبانید. در این حالت لشه مرغ کاملاً بر روی میز خوابیده باشد.

۵- با استفاده از قیچی دو لبه پوست ناحیه سینه را جدا کنید. در این هنگام عضلات سینه باید دیده شود.

۶- با استفاده از قیچی، دو برش کاملاً موازی دندنهای، به سمت عقب و در کنار قفسه سینه ایجاد کنید. با دست قفسه سینه را به

سمت بالا بکشید. اکنون محوطه بطنی در اختیار شماست. (شکل ۱۵-۵)

۷- محتویات محوطه بطنی را تخلیه کنید. برای جدا کردن قسمت صدری (قلب و ریه) باید آنها را از دندنهای کاملاً جدا کنید.


۸- برای جدا کردن قلب با قیچی دولبه، از ۳ سانتی‌متر بالاتر از قلب رگ‌های اصلی را برش دهید.

۹- قلب را همراه با سرخرگ‌ها و سیاهرگ‌های متصل به آن از لشه خارج نمایید.

۱۰- برای تهیه نمونه از سرخرگ‌ها و سیاهرگ‌ها آنها را از ناحیه متصل به قلب، از قلب جدا کنید.

۱۱- سرخرگ و سیاهرگ را با یکدیگر مقایسه نمایید.


۱۲- قلب را برش داده و دهليزها، بطن‌ها و دریچه‌های دولتی و سه لته را مشاهده نمایید.



شکل ۱۵-۵ - محوطه بطنی مرغ

## آزمون پیمانه مهارتی ۵

- ۱- اهمیت دستگاه گردش خون را بیان نمایید.
- ۲- اعمال خون را شرح دهید.
- ۳- کار اصلی آبسامه قلب چیست؟
- ۴- رگ‌های خونی از چند لایه تشکیل شده است؟
- ۵- وظیفه مهم پلاسمما چیست؟
- ۶- نقش اصلی ترومبوسیت‌ها چیست؟
- ۷- دستگاه گردش خون از ... و ... و ... تشکیل شده است.
- ۸- چرا قلب در پرندگان نسبتاً بزرگ است؟
- ۹- وظیفه اصلی گلبول سفید ... می‌باشد.



# دستگاه تنفس

هدف کلی


شناخت دستگاه تنفس طیور



## هدفهای رفتاری


در بیان این فصل هنرجو باید بتواند:

- ۱- ساختمن دستگاه تنفس طیور را بشناسد.
- ۲- فیزیولوژی دستگاه تنفسی طیور را توضیح دهد.
- ۳- قسمت‌های مختلف دستگاه تنفس طیور را نشان دهد.



## پیش آزمون

- ۱- کیسه‌های هوایی در مرغ چند عدد است؟
- ۲- پرندگان گرمای بدن خود را اغلب به چه صورت خارج می‌سازند؟
- ۳- بینی طیور در کدام قسمت نوک قرار دارد؟



شکل ۱-۶ - دستگاه تنفس طیور

تنفس واقعی شامل انتقال اکسیژن مورد نیاز به سلول‌های بدن و بازگرداندن دی اکسید کربن حاصل از فعالیت سلول‌ها به خارج از بدن می‌باشد. انرژی مورد نیاز در طیور از ترکیب اکسیژن و مواد غذایی بدست می‌آید. در سلول‌های بدن، مواد غذایی مانند قندهای ساده، اکسید شده و انرژی و دی اکسید کربن آزاد می‌کنند. دی اکسید کربن تولید شده توسط دستگاه تنفس دفع می‌شود.

در تکسلولی‌ها تنفس به سادگی انجام می‌شود زیرا سلول در مجاورت هوا قرار دارد. اما از آنجایی که در طیور سلول‌ها دسترسی مستقیم به هوا ندارند، آنها نمی‌توانند به مکانیسم ساده انتشار برای تبادل گازهای تنفسی بین بافت‌های بدن و محیط، متکی باشند. بدین لحاظ در بدن طیور از مکانیسم پیچیده‌تری استفاده می‌شود که در بخش فیزیولوژی دستگاه تنفس با آن آشنا خواهید شد.

## ۱-۶ - آشنایی با ساختمان دستگاه تنفس

قسمت‌ها مختلف دستگاه تنفس طیور عبارت‌انداز: بینی، حفره‌های بینی، حنجره، نای، جعبه صوتی، نایزه‌ها، شش‌ها، کيسه‌های هوایی و استخوان‌های خاصی که محتوى هوا هستند.  
(شکل ۶-۱)

**الف - بینی<sup>۱</sup>**: بروی نوک بالایی و بصورت دو سوراخ که دارای لبه می‌باشد وجود دارد.

**ب - حفره‌های بینی<sup>۲</sup>**: از لایه‌های ماربیچی تشکیل شده که هوا را تا حدودی تصفیه و مهم‌تر از آن گرم می‌کند. (شکل ۶-۲)



شکل ۶-۲ - حفره‌های بینی

در انتهای نای جعبه صوتی قرار دارد. (تصویر ۴-۶) جعبه صوتی محفظه‌ای غضروفی است که نقش عمدای در تولید صدا در طیور را برعهده دارد.

پس از جعبه صوتی نای به دو نایزه انشعاب می‌یابد. نایزه‌ها پس از ورود به شش‌ها به انشعابات کوچک‌تری به نام نایزک تقسیم می‌شوند (شکل ۶-۴) پرندگان پرده دیافراگم ندارند.

#### ۵—شش‌ها :

طیور دو شش نسبتاً کوچک به رنگ قرمز روشن دارند که در شکل واندازه همانند بوده و شش چپ و راست نامیده می‌شوند.

شش‌ها بافت اسفنجی و نرمی دارند. گستره هر شش در جهت جلو — عقب بین نخستین یا دومین دنده تا آخرین دنده است. شش‌ها در حفره ششی که فضایی کاملاً فرینه دارد و حجم آن با دم یا بازدم اندکی تغییر می‌کند، قرار دارند. نایزه‌های اصلی همراه با رگ‌های خونی به هر یک از شش‌ها وارد می‌شوند. از هر یک از نایزه‌های اصلی چهار نایزه ثانوی منشعب می‌گردد. این نایزه‌ها به قسمت‌های مختلف شش‌ها و بخش‌هایی از کیسه‌های هوایی می‌روند. (شکل ۶-۵)

**ج — حنجره<sup>۱</sup>** : حنجره مجموعه‌ای غضروفی است که بویژه در هنگام بلع از ورود مواد خارجی به نای جلوگیری می‌کند. حنجره، قلبی شکل بوده و در انتهای حلق قرار دارد، هوا پس از ورود از بینی به حنجره و سپس به نای می‌رود. (شکل ۶-۳)



شکل ۶-۳—نای، حنجره و موقعیت آن

**د — نای** : نای در ادامه حنجره است و در سطح پشتی مری ادامه می‌یابد. نای در ماکیان از سطح پشتی چینه‌دان نیز می‌گذرد و وارد حفره سینه‌ای شده و به دو نایزه اصلی تقسیم می‌شود. (شکل ۶-۴)



شکل ۶-۵—شش مرغ



شکل ۶-۶—جعبه صوتی<sup>۲</sup> و نایزه‌ها

## ۶-۲- فیزیولوژی دستگاه تنفس

دستگاه تنفس طیور به عنوان یک سیستم تبادل گازهای تنفسی (اکسیژن و دی اکسید کربن) در بدن عمل می‌نماید. تبادل گاز در مویرگ‌های ششی انجام می‌شود.

بدین ترتیب اکسیژن وارد خون شده وبا حرکت از میان دیواره مویرگ‌ها به سلول‌های بدن می‌رسد. گاز دی اکسید کربن مسیر معکوس اکسیژن را طی می‌نماید.

مهم‌ترین وظایف دستگاه تنفس طیور عبارتند از:

- ۱- اکسیژن مورد نیاز بدن را تأمین می‌کند.
- ۲- دی اکسید کربن اضافه بدن را دفع می‌کند.
- ۳- حرارت اضافه بدن را خارج می‌کند.
- ۴- به ایجاد صوت کمک می‌کند.

دم و بازدم :

دم به وسیله انساط ماهیچه‌های شکمی و سینه‌ای انجام می‌شود.

این ماهیچه‌ها حفره کلی بدن را منسیط کرده و بدین وسیله هوا را به داخل می‌کشند. در بازدم عادی ماهیچه‌ها داخلی ندارند و حفره بدنی در اثر خاصیت ارتجاعی و رها شدن به وضعیت اولیه باز می‌گردد.

تبادل گازها :

در انتهای مجاری هوایی درون شش‌ها، فاصله بین خون مویرگی و هوا به حداقل می‌رسد (چند میکرون). این ناحیه غنی‌ترین بستر مویرگی را در بین بافت‌های بدن دارا می‌باشد. انتقال گازهای اکسیژن و دی اکسید کربن از مویرگ‌های ششی و همین‌طور از مویرگ به سلول‌های بدن عمدتاً بر اثر قانون انتشار صورت می‌گیرد.

بدین نحو که این گازها از محیط پرفشار یا پر تراکم به محیط کم تراکم انتقال می‌یابند. به طور کلی انتشار دی اکسید کربن به خارج از خون اندکی راحت‌تر از ورود اکسیژن به آن صورت می‌گیرد.


ساختمان شش در طیور بدليل وجود کیسه‌های هوایی به آنها امکان می‌دهد با وجود فضای انک شش‌ها، تبادلات گازی زیادی داشته باشند. شش‌ها مسئول تبادل گازهای تنفسی و کیسه‌های هوایی مسئول تهویه ششی دم و بازدم می‌باشند.

و- کیسه هوایی :

کیسه‌های هوایی یکی از ویژگی‌های دستگاه تنفس طیور می‌باشد. کیسه‌های هوایی به شش‌ها متصل‌اند و در خلال تکامل از آنها بوجود می‌آیند. کیسه‌های هوایی شبکه خون‌رسانی ضعیفی دارند که شاهدی بر عدم دخالت آنها در تبادلات گازی است. بطور کلی کیسه‌های هوایی در کاهش وزن مخصوص طیور دخالت دارد. نخستین وظیفه این کیسه‌ها جبران ظرفیت اندک شش‌ها با کمک از طریق دمیدن هوا برای شش‌ها است. علاوه بر این در تنظیم درجه حرارت بدن و در تولید صدا نیز نقش دارند.

مرغ دارای ۹ کیسه هوایی است، یک جفت در ناحیه شکمی، دو جفت در ناحیه سینه و یک جفت در پایین‌تر از گردن قرار گرفته‌اند. یک کیسه هوایی منفرد در قسمت میانی بدن در نزدیکی ترقوه قرار دارد.

بزرگ‌ترین کیسه هوایی در مرغ کیسه هوایی شکمی و در اردک کیسه هوایی سینه‌ای عقبی می‌باشد. (شکل‌های ۶-۱ و ۶-۶)



شکل ۶-۶- دستگاه تنفسی مرغ (نای، نایزه، شش و کیسه‌های هوایی)

**تنظیم عصبی تنفس:**

این پدیده کنترلی سبب ایجاد تعادل در بدن می‌شود. مرکز تنفس به تغییرات فشار دی اکسیدکربن نسبت به فشار اکسیژن بسیار حساس‌تر است. کاهش اکسیژن در صورتی بر تنفس اثر می‌گذارد که بسیار شدید باشد.

**عملکرد تنفسی:**

از شاخص‌های زیادی برای عملکرد شش‌ها استفاده می‌شود. مرسوم‌ترین این شاخص‌ها سرعت تنفس یا تعداد تنفس در دقیقه است. در جدول ۱-۶ سرعت تنفس در گونه‌های مختلف را مشاهده می‌کنید.

**تنفس و حرارت اضافی:**

تنفس به دو روش در تنظیم حرارت بدن شرکت دارد.

- ۱- روش هدایتی یا جریان مستقیم حرارتی: که طی آن هوای ورودی از اتمسفر تا حد درجه حرارت بدن گرم می‌شود.
- ۲- روش تبخری: که با تبخیر کردن رطوبت موجود در مجاري هوایی برای کاهش دمای بدن خود استفاده می‌کنند.

در مرغ غدد عرق وجود ندارد، لذا دفع تبخری حرارت اهمیت بیشتری پیدا کرده است. طیور باله زدن، دفع حرارت از طریق تنفس را افزایش می‌دهند.

در حالت عادی فعالیت تنفسی به طور تقریباً غیر ارادی کنترل می‌شود.

مرکز تنفس در بصل النخاع قرار دارد. این مرکز تناوب فعالیت تنفسی شامل مرحله فعال دم و مرحله غیر فعال بازدم را هدایت می‌کند و سرعت و عمق تنفس را نیز تنظیم می‌نماید. پیام‌هایی که از شش‌ها به مرکز تنفسی ارسال می‌شود موجب افزایش و یا کاهش فعالیت مرکز تنفسی می‌گردد. مرکز تنفسی در بصل النخاع به شدت به پیام‌های رسیده از ترکیب گازهای خونی حساس هستند و به آن عکس العمل نشان می‌دهند و در صورت افزایش گاز مصر، تنفس را افزایش می‌دهند.

**تنظیم شیمیابی تنفس:**

هرگاه مقدار دی اکسید کربن خون افزایش یابد، pH خون کاهش می‌یابد که محرك واقعی برای گیرنده‌های شیمیابی دستگاه تنفس می‌باشد و تنفس را افزایش می‌دهد.

در این حالت دفع دی اکسید کربن افزایش و فشار آن در خون کاهش می‌یابد. در نتیجه تحریک گیرنده‌های شیمیابی دی اکسید کربن نیز کاهش می‌یابد.

**جدول ۱-۶**— سرعت تنفس در گونه‌های مختلف (تعداد تنفس در دقیقه)

مرغ	اسپ	گاو	انسان	سرعت تنفس
۱۲-۲۵	۸-۱۶	۱۲-۲۸	۱۲-۳۰	

## فعالیت عملی

### وسایل و تجهیزات لازم:

میز تشریح، قیچی جراحی دولبه (تیز، کند)، قیچی استخوانبر، پنس صحتی، دستکش و روپوش.

۱- با نظر مریبان در کلاس گروه‌بندی شوید.

۲- دستکش‌ها را به دست کنید و روپوش پوشید.

۳- هر گروه یک مرغ را به پشت روی میز تشریح بخواباند (به نحوی که پاها به سمت خودتان باشد).

۴- انگشت شصت را روی قسمت ران وسایر انگشتان را پشت ران قرار دهید. با فشار انگشت شصت ران را از بدن جدا کرده و پرنده را کاملاً به میز بچسبانید. در این حالت باید لاشه مرغ کاملاً بر روی میز خوابیده باشد.

۵- با استفاده از قیچی دو لبه پوست ناحیه سینه را جدا کنید. در این هنگام عضلات سینه باید دیده شود.

۶- با استفاده از قیچی دو برش کاملاً موازی دندنه‌ها به سمت عمق در کنار قفسه سینه ایجاد کنید. با دست قفسه سینه را به سمت بالا بکشید. اکنون محوطه بطنی در اختیار شماست.

۷- برای جدا کردن قسمت صدری (قلب و ریه) باید آنها را کاملاً از اندام‌ها جدا کنید.

۸- ریه‌ها را با استفاده از پنس وبا احتیاط از داخل حفرات دندنه‌ها خارج کنید.

۹- سر مرغ را به یک طرف بخوابانید و با استفاده از قیچی پوست گردن را از کنار گوش برش بدھید.

۱۰- برش را تا محل قفسه سینه ادامه دهید و پوست را از ناحیه گردن جدا کنید. در این حالت باید نای و موی را مشاهده کنید.

۱۱- با استفاده از قیچی استخوانبر، استخوان قفسه سینه را بیرید.


۱۲- نای را از قسمت بالایی با استفاده از قیچی لبه کند جدا کنید و در قسمت پایین از قفسه سینه خارج کنید.

۱۳- جعبه صوتی را در ناحیه تبدیل نای به نایزه مشاهده کنید.

۱۴- ریه و نای و نایزه‌ها را از لاشه مرغ خارج نموده و دقیق‌تر مشاهده کنید.

## آزمون پیمانه مهارتی ۶

- ۱- اهمیت دستگاه تنفس در طیور را شرح دهید؟
  - ۲- قسمت‌های مختلف دستگاه تنفس طیور را نام ببرید؟
  - ۳- وظایف دستگاه تنفس طیور را بیان نمایید؟
  - ۴- تنفس چگونه در تنظیم حرارت بدن شرکت می‌نماید؟
  - ۵- تعداد کیسه‌های هوایی در مرغ چه تعدادی است؟
- ۱۰) (د) ۹) (ج) ۸) (ب) ۷) (الف)



# دستگاه ادراری

هدف کلی


شناخت دستگاه ادراری طیور



## هدف‌های رفتاری

در پایان این فصل هنرجو باید بتواند:

- ۱- ساختمن دستگاه ادراری را توضیح دهد.
- ۲- وظایف دستگاه ادراری را بیان نماید.
- ۳- قسمت‌های مختلف دستگاه ادراری را نشان دهد.



## پیش آزمون

- ۱- واحد عمل در کلیه‌ها چیست؟
- ۲- سه وظیفه اصلی کلیه چیست؟
- ۳- غدد نمکی در اردک وجود دارد یا مرغ؟

در این پیمانه نقش کلیه در دفع مواد زائد و ایجاد تعادل بین یون‌های سدیم و پاتاسیم خون و مایعات خارج سلولی مورد بررسی قرار می‌گیرد.

## ۱-۷- ساختمان دستگاه ادراری

دستگاه ادراری طیور از یک جفت کلیه و یک جفت میزانی (حالب) که به حالت متقاضی قرار گرفته‌اند، تشکیل شده است.

کلیه :

کلیه اندام کشیده‌ای است که در حفره‌های موجود در محل اتصال استخوان‌های لگن قرار دارد.

در تصاویر ۱-۷ و ۲-۷ کلیه مرغ را مشاهده کنید.

وزن کلیه در مکان ۵ تا ۶ گرم یا در حدود  $0.28\%$  درصد از وزن بدن است. طول آن  $7\text{ cm}$  سانتی‌متر و عرض آن  $1/5\text{ cm}$  سانتی‌متر می‌باشد.


سطح شکمی کلیه صاف و سطح پشتی آن بر جستگی‌هایی دارد که ناشی از نزدیکی به ستون مهره‌ها است. علاوه بر قرار گرفتن در حفره استخوان‌ها، این اندام بوسیله رگ‌های خونی که از آن می‌گذرند و شاخه‌های شبکه عصبی کمری و نشیمنگاهی که به درون آن می‌روند، در جایگاه خود ثابت شده است. بدین لحاظ خارج کردن کلیه به صورت سالم دشوار است. رنگ کلیه بسته به مقدار خون آن از صورتی کم رنگ تا قرمز مایل به قهوه‌ای متغیر است.

واحد عمل در کلیه‌ها نفرون می‌باشد. تعداد نفرون‌های پرنده‌گان در مقایسه با پستانداران بسیار زیاد است.



هر کدام از نفرون‌ها از یک جسمک کلیوی و یک لوله تشکیل شده است. جسمک کلیوی در برگیرنده شبکه مویرگی و کپسول گلومرولی است. شبکه مویرگی در میان یک رگ آورنده خون (آوران) و یک رگ برنده خون (وابران) قرار گرفته است و توسط کپسول گلومرولی دو جداره‌ای احاطه می‌شود. بین لایه درونی و بیرونی در کپسول فضایی وجود دارد که ادرار اولیه در آن



شکل ۱-۷- موقعیت کلیه مرغ در بدن



شکل ۲-۷- کلیه مرغ




شکل ۷-۳ - نفرون و مجرای جمع کننده ادرار در مخروط میانی کلیه طیور

جریان می‌باید. ادرار از این فضای درون لوله‌های نفرون می‌ریزد کلیه‌های پرنده‌گان دارای دو نوع نفرون می‌باشند. نفرون‌های ساده (قشری)، لوله‌سیار صافی دارند که تنها سه یا چهار بار روی خود تا می‌خورند و در قسمت قشری کلیه قرار دارند.


در نفرون‌های پیچیده‌تر (مرکزی)، طول لوله بیشتر است و این نفرون‌ها دارای قوس هنله می‌باشند. نفرون‌های دارای قوس هنله در قسمت مرکزی کلیه قرار دارند. مجاري جمع‌آوری کننده، ادرار هر دو نوع نفرون‌ها را تخلیه می‌کنند. لوله‌های جمع‌کننده ادرار و قوس هنله به صورت موازی با یکدیگر در غلافی قرار می‌گیرند و قسمتی از مخروط میانی را تشکیل می‌دهند. (تصاویر ۷-۳ و ۷-۵)

هر یک از مخروط‌ها در انتهای به یکی از شاخه‌های میزنای تبدیل می‌شوند. تعداد مخروط‌ها برای هر گونه از طیور ثابت است و با گونه‌های دیگر بسیار متفاوت می‌باشد. محتویات مجاري





شکل ۷-۴ - کلیه  
سمت راست عروق کلیه و سمت چپ لوله‌های  
جمع کننده ادرار

پالایش می‌کند. بیشتر از ۹۰٪ آب پالایش شده به همراه قندهای ساده والکتروولیت‌ها مجدداً از نفرون‌ها جذب شده و به خون باز می‌گرددند. این فرایند موجب می‌شود که کلیه‌ها از اعضاء بسیار مهم حفظ تعادل داخلی بدن محسوب گردند و میزان آب بدن و مواد محلول در آن را در حد نسبتاً ثابتی حفظ کند. در تصویر (۷-۶)



شکل ۷-۵ - انواع نفرون



شکل ۷-۶ - ساختمان و نحوه عمل نفرون

جمع کننده ادرار به میزنای می‌ریزد و میزنای ادرار را به قسمت میانی کلواک برای دفع انتقال می‌دهد. در مقایسه با پستانداران، طیور فاقد مثانه ولگنچه کلیوی هستند. کلیه از سه قسمت (لوب) تشکیل شده است. این سه قسمت شامل لوب‌های جلویی، میانی و عقبی می‌باشد. در تصاویر (۷-۱)، (۷-۲) و (۷-۴) سه قسمت کلیه را مشاهده نمایید. سه سرخرگ اصلی کلیه سرخرگ‌های جلویی، میانی و عقبی می‌باشند. سرخرگ جلویی مستقیماً از آئورت منشأ می‌گیرند و بخش جلویی کلیه را خونرسانی می‌کند سرخرگ‌های میانی و عقبی به بخش‌های میانی و عقبی کلیه خون می‌رسانند. پرندگان دارای سیستم باب کلیوی می‌باشند. در این سیستم خون توسط سیاهرگ‌های باب کلیوی به کلیه حمل می‌شوند.

## ۷-۲ - فیزیولوژی کلیه

کلیه سه وظیفهٔ پالایش، باز جذب و ترشح را بر عهده دارد که بر عهدهٔ نفرون‌ها می‌باشد. یون‌های سدیم و پتاسیم مهم‌ترین الکتروولیت‌های بدن محسوب می‌شوند.


محصول نهایی سوخت و ساز پروتئین‌ها در طیور نیز اسید اوریک می‌باشد. در نفرون‌ها اسیداواریک، الکتروولیت‌ها و قند ساده به همراه مقدار زیادی آب از خون پالایش یا تصفیه می‌شوند.

لازم است بدانید برخی از مواد بطور کامل پالایش یا تصفیه می‌شوند اگرچه مقدار آنها در خون بسیار کم باشد. اسید اوریک از جمله این مواد است.


برای انجام عمل پالایش، فشار سرخرگی مورد نیاز باید بیشتر از فشار غشاء گلومرولی باشد.

بدین ترتیب راندن مایعات از عروق خونی به داخل نفرون امکان‌پذیر می‌شود.

در مدت ۲۴ ساعت، کلیه‌های ماکیان تقریباً ۶ لیتر مایع را



شکل ۷-۷ - کریستال‌های اسید اوریک



شکل ۷-۸ - غدد نمکی در اردی

نحوه عمل نفرون را ملاحظه کنید.

سلول‌های موجود در لوله‌های نفرون برای انجام فعالیت‌های باز جذب نیاز به مصرف انرژی دارند. فعالیت باز جذب حتی در روی موادی که غاظت آنها در خون چندین برابر بیشتر از ادرار است نیز صورت می‌گیرد. بنابراین پدیده باز جذب تنها یک فرایند ساده نیست.


ادرار به شکل غلیظ شده با مدفعه آمیخته و دفع می‌شود. در این حالت اسید اوریک به رنگ سفید بر روی مدفعه قرار دارد. غلظت اسید اوریک در ادرار بسیار زیاد است و ۵۲ ۸۸ درصد کل نیتروژن ادرار را در مرغ و اردک تشکیل می‌دهد. (شکل ۷-۷)

#### دفع خارج کلیه‌ای نمک:

**غدد نمکی:** غدد خاصی در برخی طیور وجود دارد که آنها را قادر می‌سازد مقدار زیادی نمک دفع کنند. این غدد معمولاً در بینی قرار دارد ولی در برخی گونه‌ها بر روی قسمت فوقانی سر قرار گرفته است. (شکل ۷-۸)


اردک، غاز، شترمرغ و کبک دارای این نوع غدد می‌باشند، در طیوری که فاقد این غدد می‌باشند نمک صرفاً توسط کلیه‌ها ترشح، باز جذب و دفع می‌گردد. مرغ و کبوتر فاقد غده نمکی می‌باشند و مقدار نمک بدن آنها توسط کلیه‌ها تنظیم می‌گردد.

غده نمک یک کانال مرکزی دارد. تعدادی مجرای ترشحی به صورت شعاعی از آن جدا می‌شوند که بوسیله سرخرگ و سیاهرگ‌های کوچک احاطه شده و انتهای آنها مسدود است. نمک اضافی از جریان خون خارج و به مجرای ترشحی و در نهایت به کانال مرکزی انتقال می‌یابد. (تصویر ۷-۹) ترشحات غدد نمکی تحت تأثیر درجه حرارت قرار دارد و در پاسخ به افزایش حرارت محیط اتفاق می‌افتد.



شکل ۷-۹ - ساختمان غده نمکی

## فعالیت عملی



- ۱ - لشه مرغ را تشریح کنید.
- ۲ - با خالی کردن امعاء و احساء کلیه‌های مرغ و اتصالات آن پیدا کنید.
- ۳ - اکنون با جدا کردن کلیه‌ها، حالب‌ها (میزانی‌ها) اعصاب و رگ‌های خونی کلیه‌ها به مشاهده آن پردازید.
- ۴ - به دلیل ظرافت اعضاء فوق کار تشریح را با دقت انجام دهید.

## آزمون پیمانه مهاارتی ۷

۱ - دستگاه ادراری طیور از یک جفت ... و یک جفت ... تشکیل شده است.

۲ - کدام پرنده قادر غدد نمکی می باشد؟

الف) شترمرغ      ب) مرغ      ج) اردک      د) غاز

۳ - ساختمان غدد نمکی را توضیح دهید؟


۴ - ساختمان نفرون را شرح دهید؟

۵ - محصول نهایی سوخت و ساز پروتئین‌ها در طیور چیست؟

۶ - کدام ماده بطور کامل در کلیه‌ها پالایش می‌شود؟

الف) اسید اوریک      ب) قند ساده      ج) سدیم      د) پتاسیم

۷ - چرا کلیه یکی از اعضای بسیار مهم حفظ تعادل داخلی بدن محسوب می‌شود؟




# دستگاه عصبی

هدف کلی



شناخت دستگاه عصبی طیور

## هدفهای رفتاری



در پایان این فصل هنرجو باید بتواند:

۱- ساختمند دستگاه عصبی را توضیح دهد.

۲- وظایف دستگاه عصبی را بیان نماید.

۳- قسمت‌های مختلف دستگاه عصبی را نشان دهد.




## پیش آزمون

۱- سلول عصبی را چه می‌نامند؟

۲- تفاوت اساسی مغز پرندگان با مغز پستانداران در چیست؟

۳- وظیفه اصلی مخچه چیست؟

دستگاه عصبی در تمام فعالیت‌های حیاتی بدن موجودات زنده دخالت دارد. در طیور نیز این دستگاه به عنوان رهبر بدن، در فعالیت‌های پرندۀ شرکت کرده و نقش کنترل کننده، تشدید کننده و یا بازدارنده را در اعمال مختلف بازی می‌کند. در واقع دستگاه عصبی مسئول برقراری و حفظ ارتباطات داخلی و خارجی و نیز سازش پرندۀ با محیط است.



شکل ۱-۸- سلول عصبی (нерон)

## ۱-۸- ساختمان دستگاه عصبی طیور

### سلول عصبی :

سلول عصبی را نرون<sup>۱</sup> گویند؛ نرون‌ها بسیار تخصص یافته هستند و واحد ساختمانی و کاری سیستم عصبی می‌باشند. هر نرون از جسم سلوی (پریکاریون)<sup>۲</sup> تشکیل شده است که یک شاخه منفرد به نام آکسون<sup>۳</sup> و یک یا چند شاخه منشعب به نام دندریت<sup>۴</sup> از آن جدا می‌شوند. جسم سلوی حاوی هسته سلول عصبی می‌باشد. آکسون باعث انتقال تحريك از جسم سلوی می‌شود. (شکل ۱-۸)

بافت‌های عصبی سیستم عصبی مرکزی علاوه بر نرون‌ها حاوی سلول‌های پشتیبان<sup>۵</sup> نیز هستند. این سلول‌ها به تغذیه نرون‌ها کمک می‌کنند.

دستگاه عصبی طیور از نظر ساختمانی و عمل از دو بخش سیستم عصبی مرکزی و سیستم عصبی محیطی تشکیل شده است.

### الف) سیستم عصبی مرکزی (CNS)<sup>۶</sup> :

این قسمت از دستگاه عصبی شامل مغز و نخاع می‌باشد که ساختمان‌های بسیار تخصص یافته‌ای هستند و بطور کامل در داخل محفظه استخوانی (جمجمه و ستون مهره) محافظت شده و جای گرفته‌اند.

## مغز:

مغز تقریباً بطور کامل از بافت عصبی تشکیل شده است.

حفره مرکزی مغز با مایع مغزی - نخاعی پر شده و به کanal مرکزی نخاع متصل می‌باشد. اطراف حفره مرکزی بخش‌هایی از ماده سفید وجود دارند و بخش خارجی مغز عمدتاً از ماده خاکستری تشکیل شده است. ماده خاکستری مغز و نخاع از نرون‌های بدون میلین<sup>۱</sup> تشکیل می‌شوند و ماده سفید از نرون‌های میلین دار بوجود می‌آیند. مغز مرکز اصلی کنترل فعالیت ارادی و بسیاری از فعالیت‌های غیر ارادی می‌باشد.

سه بخش اصلی مغز، عبارتند از مغز پیشین<sup>۲</sup> (مخ)، مغز میانی<sup>۳</sup> و مغز پسین<sup>۴</sup>.

مخ از دو نیمکره راست و چپ تشکیل شده است. لایه خارجی مخ قشر مخ<sup>۵</sup> می‌باشد.

مغز پیشین، برای کنترل جامع سیستم عصبی خودکار و چندین غدد درون‌ریز می‌باشد.

مغز میانی ناحیه پیچیده‌ای است که تحریکات بینایی و شنوایی را می‌گیرد. آنها را هماهنگ کرده و واکنش‌های محیطی و حرکتی مانند واکنش دفاعی را کنترل می‌کند.


مؤثرترین نقطه برای تولید صوت در مغز میانی واقع شده است.

مغز پسین مخچه<sup>۶</sup> را در بر گرفته است.


مخچه، بصل النخاع<sup>۷</sup>، تالاموس<sup>۸</sup> و هیپوپالاموس<sup>۹</sup> سایر مراکز عصبی می‌باشند.

مخچه اندام مرکزی برای همزمانی حرکات عضلانی و برقراری تعادل بدن پرندگان می‌باشد. توجه داشته باشید که مخچه در پرندگان رشد زیادی دارد. (شکل‌های ۸-۲ و ۸-۳)

- میلین ماده‌ای از جنس چربی است که آکسون بعضی از سلول‌های عصبی را احاطه کرده است.



شکل ۸-۲ - نمای زیرین و فوقانی مغز مرغ



شکل ۸-۳ - مقایسه مغز طیور و پستانداران

- ۲\_Forebrain
- ۶\_Cerebral Cortex
- ۹\_Thalamus

- ۷\_Cerebrum
- ۷\_Cerebellum
- ۱۰\_Hypothalamus

- ۴\_Midbrain
- ۸\_Medulla Oblongata

- ۵\_Hindbrain



شکل ۴-۸ - نخاع مرغ

## فعالیت عملی

لاشه مرغ یا یک پرندۀ دیگر را تشریح کنید. با قیچی استخوان بر استخوان‌های سر و ستون مهره‌هار اجدا کرده و مغز، مخچه و نخاع را مشاهده و بررسی نمایید.

بیرون قرار گرفته است.  
ارتباط بین نخاع و بافت‌های بدن از طریق اعصاب نخاعی انجام می‌شود.

اعصابی که از ناحیه پشتی نخاع خارج می‌شوند عمدتاً حسی هستند. اعصاب خارج شده از ناحیه شکمی اعصاب حرکتی می‌باشند. اعصاب حسی، احساسات مختلف مثل فشار، گرمای سرما و... را به مراکز عصبی نخاع و مغز انتقال می‌دهند و اعصاب حرکتی پیام‌های مغز و نخاع را به عضوی برند.

ب) سیستم عصبی محیطی (PNS) :

سیستم عصبی محیطی قسمت‌هایی از سیستم عصبی به

بصل النخاع آخرین قسمت تنۀ مغز می‌باشد و مغز میانی را به نخاع متصل می‌کند.  
بصل النخاع تعدادی از دستگاه‌های بدن را کنترل می‌کند که اهمیت اساسی دارند از جمله :

- ۱- دستگاه تعادلی بدن.
- ۲- دستگاه تنفس
- ۳- دستگاه گردش خون
- ۴- حرکاتی که به گرفتن، آماده کردن و انتقال غذا مربوط می‌شود.

تalamوس بین مغز پیشین و مغز میانی قرار دارد.  
هیپوتalamوس در ناحیه شکمی تalamوس قرار دارد.  
هیپوتalamوس، مرکز اصلی مغز پیشین برای کنترل سیستم عصبی خودکار و چندین غده درون‌ریز می‌باشد. ارتباطی مهم بین هیپوتalamوس و هیپوفیز در پرندگان وجود دارد که در بخش غدد به طور کامل مورد بررسی قرار می‌گیرد.

در تصویر ۴-۸ تفاوت‌های مغز پرندۀ و پستانداران را مشاهده می‌کنید. اختلاف مغز پستانداران و پرندگان در رشد زیاد قسمت بینایی و مخچه به نسبت وزن بدن در مغز طیور می‌باشد. همچنین در طیور غده پینه آل اهمیت دارد که در پیمانه نهم بررسی خواهد شد. در پستانداران برخلاف پرندگان مرکز حرکتی قشر مخ رشد بیشتری دارد.

نخاع :


نخاع از جلو به بصل النخاع متصل است و تا آخرین قسمت استخوان ستون مهره‌ها ادامه دارد. (تصویر ۴-۸)

نخاع نیز مانند مغز مرکز پردازش و تقویت پیام‌ها است. از طرف دیگر نخاع وسیله ارتباط بین مغز و بدن محسوب می‌شود. ترتیب قرار گرفتن ماده خاکستری و سفید در نخاع بر عکس مغز است. بدین ترتیب که ماده سفید نسبت به ماده خاکستری در

عصب سینپاتیک در طیور از رشته‌های عصبی تشکیل شده است که از طریق شاخه‌های شکمی نخاع را ترک و به تن‌های سینپاتیکی<sup>۲</sup> که به موازات ستون مهره‌ها قرار دارد وارد می‌شوند و سپس در اندام‌های بدن توزيع می‌شوند. تمام اعصابی که از تنۀ سینپاتیک منشأ نمی‌گیرند متعلق به سیستم عصبی پاراسینپاتیک می‌باشند. آنها نیز به همان اندام و بافت‌هایی عصب می‌دهند که عصب‌های سینپاتیک عصب‌دهی می‌کنند.

غالباً هر دوی این اعصاب روی اعضای بدن تأثیر گذاشته و باعث تنظیم عمل و عکس العمل آنها نسبت به عوامل مختلف محیطی می‌شوند.

در بیان کلی می‌توان گفت که این دو سیستم کارهای متضادی روی اندام‌ها انجام می‌دهند. مانند افزایش یا کاهش جریان خون به یک اندام که باعث تنظیم واکنش پرندگان به محیط اطراف می‌شود. (تصاویر ۸-۵ و ۸-۶)



شکل ۵-۸ - نخاع و تنۀ سینپاتیک

جز مغز و نخاع می‌باشد که از اعصاب مغزی و نخاعی که از مغز و نخاع خارج شده‌اند تشکیل شده است و تعداد زیادی گره (عقده) و شبکه‌های عصبی که در ارتباط با سیستم عصبی خودکار می‌باشند، را شامل می‌شود.

اعصاب کاسه‌سر (۱۲ جفت)، اعصاب نخاعی (شامل اعصاب نخاعی بازویی، کمری، خاجی و انتهایی) و سیستم عصبی خودکار قسمت‌های مختلف سیستم عصبی محیطی می‌باشند.

۱۲ جفت عصب سری به ترتیب از ۱ تا ۱۲ شماره گذاری شده‌اند. این اعصاب شامل سه گروه عصب‌های اندام‌های حسی، عصب‌های احساسی و اعصاب حرکتی می‌شوند. مهم‌ترین عصب این گروه عصب شماره ۱۰ یا عصب واگ می‌باشد.

## ۲-۸- فیزیولوژی دستگاه عصبی

نرون یا سلول عصبی، عامل منتقل کننده اطلاعات است. هر نرون در تماس با نرون‌های دیگر می‌باشد به نحوی که قسمتی از شبکه عظیم و به هم پیوسته سیستم عصبی را تشکیل می‌دهد. محل اتصال نرون با نرون دیگر را سینپاس می‌گویند. برای انتقال اطلاعات، جریان عصبی باید از یک نرون به نرون دیگر عبور کند که این اتفاق با اتصال آکسون یا دندریت‌های یک سلول عصبی به آکسون یا دندریت‌های سلول عصبی بعدی امکان‌پذیر می‌شود.


### سیستم عصبی خودکار<sup>۱</sup> :

این سیستم، اعصاب ماهیچه‌های صاف و قلبی، غده‌های بدن و رگ‌های خونی را تأمین می‌نماید. سیستم عصبی خودکار به دو زیر مجموعه اصلی، سینپاتیک و پاراسینپاتیک تقسیم‌بندی می‌شوند.

### پردازش پیام‌های عصبی:

پاسخ به محرك‌ها دقیقاً مطابق مثال فوق صورت می‌گیرد.  
هر گاه غذا (محرك) وارد دهان شود اعصاب حسی پیام را به مرکز مغزی - نخاعی برد و در آن محل موضوع بررسی می‌شود و از طریق اعصاب حرکتی پیامی برای عضو هدف (در این مثال غدد بزاقی) می‌فرستد و آن را وارد به عکس العمل (ترشح بزاق) می‌نماید. بنابراین در هر عمل انعکاسی، پنج قسمت شرکت دارند :



- ۱- عضو گیرنده
- ۲- اعصاب حسی
- ۳- محل‌های پردازش (بصل النخاع)
- ۴- اعصاب حرکتی
- ۵- اندام یا عضو حرکتی



شکل ۶-۸- نخاع و تنفس سیستمیکی

## آزمون پیمانه مهارتی ۸

- ۱- اهمیت دستگاه عصبی را در بدن طیور توضیح دهید؟
- ۲- در سیستم عصبی، واحد سلولی ... نامیده می‌شود.
- ۳- سلول عصبی از چه اجزایی تشکیل شده است؟
- ۴- بصل النخاع کدامیک از دستگاه‌های بدن را کنترل می‌کند؟
- ۵- سیستم عصبی مرکزی شامل ... و ... می‌باشد.
- ۶- پاسخ به حرکت‌ها در بدن طیور چگونه کنترل می‌شود؟
- ۷- در هر عمل انعکاسی چند قسمت شرکت می‌نمایند؟ نام ببرید؟



# غدد داخلی

هدف کلی



شناخت غدد طیور

## هدف‌های رفتاری


در پایان این فصل هنرجو باید بتواند:

- ۱- عملکرد غدد داخلی را توضیح دهد.
- ۲- غدد درون ریز و بروون ریز را تعریف کند.
- ۳- وظایف هر یک از غدد بدن را بیان کند.
- ۴- با تشریح پرنده نر و ماده غدد بدن را نشان دهد.



## پیش آزمون

- ۱- لوزالمعده طیور در کدام قسمت از محوطه شکمی قرار دارد؟
- ۲- تیموس در کدام ناحیه از بدن طیور قرار دارد؟ (گردن، شکم، سر)
- ۳- هورمون پاراتورمون از کدام غده ترشح می‌شود؟



شکل ۹-۱ - غده هیپوفیز

غدد در پرندگان همچون پستانداران از ساختمان پیچیده‌ای برخوردار است. در طیور نیز غدد داخلی به دو دسته کلی غدد درون‌ریز و غدد برونو ریز تقسیم می‌شوند:

## ۱-۹ غدد درون‌ریز

غدد درون‌ریز به غددی گفته می‌شوند که قادر مجرما بوده و ترشحات خود را مستقیماً وارد جریان خون می‌کنند ترشحات غدد درون‌ریز را هورمون گویند. هورمون‌ها مستقیماً روی بافت‌ها و سلول‌های اندام مورد نظر تأثیر می‌گذارند.

مهم‌ترین غدد درون‌ریز عبارتند از:

۱- مجتمع هیپوفیزی - هیپوتالاموسی

۲- گنادها

۳- لوزالمعده

۴- غدد فوق کلیوی (آدرنال)

۵- تیروئید

۶- پاراتیروئید

۷- اولتیموبرانشیال<sup>۱</sup>

## ۱- مجتمع هیپوفیزی - هیپوتالاموسی

غده هیپوفیز ارتباط تردیکی با هیپوتالاموس دارد به همین دلیل عملکرد آن تحت عنوان مجتمع هیپوتالاموسی - هیپوفیزی بررسی می‌شود. غده هیپوفیز دارای ساختمان پیچیده‌ای است. هیپوفیز در پرندگان به دو بخش جلویی<sup>۲</sup> (قدمی) و پشتی<sup>۳</sup> (خلفی) تقسیم می‌شود.

غده هیپوفیز را در تصویر (۹-۱) مشاهده کنید.

## ۱-۱ هیپوفیز جلویی

در طیور عمدۀ فعالیت هورمونی هیپوفیز جلویی مربوط به بخش انتهایی این غده بوده که هورمون‌های مهم و پیچیده‌ای را

۱\_Ultimobranchial

۴\_Follicle Stimulating Hormone

۷\_Thyroxine

۲\_Adenohypophysis

۵\_Luteinizing Hormone

۸\_Feedback

۳\_Neurohypophysis

۶\_Thyroid stimulating hormon

**پرولاکتین:**

در طیور نقش پرولاکتین در ارتباط با رفتار خواهیدن بر روی تخم (کرچی) به انبات رسیده است. پرولاکتین در طیور به هنگام کرچی موجب ممانعت از عمل گنادها شده و تخم‌گذاری را متوقف می‌کند.

این هورمون تولید ترشحات چینه‌دان و همچنین افزایش سلول‌های موکوسی غدد این کیسه را در کبوتر تحریک می‌نماید.

**۱- هورمون رشد GH**

هورمون رشد دارای اثرات کوتاه مدت برسخت و ساز پرندگان بوده و این نقش را بویژه در سوخت و ساز چربی‌ها نشان می‌دهد. همچنین این هورمون بر روی استخوان‌ها و عضلات اثر داشته و موجب رشد بدن می‌گردد.

**۲- هیپوفیز خلفی**

دو هورمون مهم از این ناحیه هیپوفیز ترشح می‌شوند این هورمون‌ها در قسمت هیپوتالاموس ساخته شده و در هیپوفیز خلفی انباست و نگهداری می‌شوند و عملکرد آنها به شرح زیر است آرژنین وازوتوسین (AVT)<sup>۱</sup>:

این هورمون شبیه هورمون آنتی دیبورتیک (وازوپریسین) در پستانداران عمل نموده و تنظیم آب بدن یعنی نیاز برای مصرف این ماده و دفع کلیوی آن را تنظیم می‌نماید.


**۳- مزوتوسین (MT)<sup>۲</sup>:**

عملکرد این هورمون باعث انقباضات رحمی و تسهیل در تخم‌گذاری پرندگان شده و از این جهت شبیه هورمون اکسی توسین در پستانداران می‌باشد.

**۴- جزایر خوش‌های لوزالمعده:**

لوزالمعده طیور در سمت راست حفره شکمی و در بین خمیدگی دوازده واقع شده است. (شکل ۲-۹)

بخش عمده لوزالمعده (۹۸-۹۹ درصد) مسئول ساخت



شکل ۲-۹- لوزالمعده

آنژیم‌ها و ترشح آنها از طریق مجرای ویژه به دوازدهه هستند و فقط ۱ تا ۲ درصد این بافت تحت عنوان جزایر خوش‌های خصوصیات غدد درون‌ریز را دارند و هیچ‌گونه ترشحی در مجرای لوزالمعده نداشته و ترشحات خود را مستقیماً وارد خون می‌کنند. این سلول‌ها انسولین و گلوکاگون را بصورت مستقیم تولید و ترشح نموده که قند خون (گلوکز) را در بدن ثابت نگه می‌دارند. بوسیله این هورمون‌ها میزان ساخت و ساز و مصرف قند در سلول‌های بدن تنظیم می‌شود.

**۵- غدد فوق کلیوی:**

یک جفت غده فوق کلیوی پرندگان در قسمت بالا و میانی کلیه‌ها، تزدیک هم قرار گرفته‌اند این غدد به دو بخش قشری (خارجی) و مرکزی (داخلی) تقسیم شده که برخلاف پستانداران کاملاً از هم متمایز نیست.

این غدد ابی‌نفرین (E)<sup>۴</sup> و نور ابی‌نفرین (NE)<sup>۵</sup> را ترشح می‌کنند. ابی‌نفرین موجب تحریک در تجزیه قند پیچیده گلیکوژن و در نتیجه تولید گلوکز و افزایش قند خون می‌شود و نور ابی‌نفرین عکس این عمل را انجام داده و موجب ساخت و ذخیره‌سازی گلیکوژن می‌گردد.


۱- Growth hormon

۲- Argininvasotocin

۳- Mesotocin

۴- Epinephrine

۵- Norepinephrine



شکل ۹-۳ - غده تیروئید - پاراتیروئید و اولتیموبراشیال

## ۶- غدد اولتیمو برانشیال

این غدد در پرندگان در ناحیه پشتی و در دو طرف غده پاراتیروئید قرار گرفته‌اند. مهم‌ترین هورمون تولیدی این غده کلسی توینی بوده که برخلاف پستانداران هیچ‌گونه تأثیری در استخوان‌سازی ندارد. (شکل ۹-۳) این غدد در کاهش کلسیم خون مؤثرند.

## ۷- گنادها

در پیمانه دستگاه تولید مثل، با گنادها (غدد جنسی) در جنس نر و ماده آشنا شدید.

## ۹-۲- غدد برون ریز

غددی هستند که دارای مجرای کانال بوده و ترشحات خود را از این طریق، به درون خود و یا بافت مورد هدف می‌ریزند. مهم‌ترین این غدد عبارتند از:

- ۱- کبد
- ۲- کلیه‌ها
- ۳- تیموس
- ۴- غده پینه آل یا صنوبری.

از بخش قشری این غده در طیور هورمون‌های دیگری ترشح می‌شود که مهم‌ترین آنها عبارتست از کورتیکوسترون<sup>۱</sup> و آلدسترون<sup>۲</sup>.

کورتیکوسترون موجب تسهیل در تخم‌گذاری می‌شود.


## ۴- تیروئید

در پرندگان غدد تیروئید بصورت یک جفت غده بیضی شکل به رنگ قرمز تیره در دو طرف نای قرار دارند. اندازه تیروئید طیور اهلی با افزایش سن به نسبت وزن بدن تغییر چندانی نمی‌کند، هرچند وزن خالص آن با افزایش سن زیاد می‌شود. اندازه فعالیت غده تیروئید در فصول و درجه حرارت مختلف تغییر می‌کند. در جوجه‌های جوان و مرغ تخم‌گذار لگه‌ورن در تابستان میزان ترشح تیروئید نصف زمستان است. در اردک نر حداقل فعالیت تیروئید در ماه خرداد می‌باشد. در این موقع از سال که حداقل نور وجود دارد، کاهش فصلی فعالیت بیضه‌ها و شروع پر ریزی اتفاق می‌افتد. درجه حرارت پایین باعث افزایش ترشح هورمون‌های تیروئید می‌گردد.

مهم‌ترین هورمون‌های تیروئید  $T_4$  و  $T_3$  می‌باشند که نقش مهمی در تنظیم سوخت و ساز (با حضور اکسیزین) در بدن پرندگان بهده دارند و علاوه بر این باعث افزایش فعالیت غدد جنسی می‌شوند.  $T_3$  (تری‌یدوتیرین) فرم فعل هورمون تیروئید است. (شکل ۹-۳)

## ۵- پاراتیروئید

چهار غده پاراتیروئید در پرندگان کمی پایین‌تر از تیروئید قرار گرفته‌اند. این غده‌ها هورمون پاراتورمون را ترشح نموده که از طریق تنظیم دفع کلسیم ادراری و همچنین تأثیر بر آزادسازی کلسیم استخوانی، غلظت کلسیم را در سرم خون ثابت می‌کند. همچنین این هورمون نقش مهمی در دفع کلیوی فسفات و تنظیم فسفر بدن را به عهده دارد. (شکل ۹-۳)



شکل ۹-۴ - موقعیت غده تیموس در طیور

### ۱- کبد:

در پیمانه دستگاه گوارشی با نقش اساسی کبد در هضم و جذب مواد غذایی طیور آشنا شدید.

### ۲- کلیه‌ها:

با وظایف و جایگاه کلیه‌ها در پیمانه هفتم آشنا شدید. کلیه‌ها در نقش غدد بروند ریز مواد هورمونی بنام رنین ترشح می‌کنند. رنین در پاسخ به کاهش سدیم خون و یا کاهش حجم خون ترشح می‌شود.

### ۳- تیموس:

تیموس به صورت هفت قسمت مجزا در اطراف گردن قرار گرفته و در فعالیت‌های ایمنی بدن نقش دارد. (شکل ۹-۴)

### ۴- غده پینه آل یا صنوبری:

این غده بین نیم کره‌های مغز و مخچه به صورت یک بیرون زدگی قرار دارد. غده پینه آل با ترشح هورمون ملاتونین در حفظ درجه حرارت بدن، وزن غدد فوق کلیوی و همچنین کنترل رفتارهای تولید مثلی، از طریق تأثیر بر گنادها مؤثر می‌باشد.

علاوه بر این، غده پینه آل در تأمین سلول‌های ایمنی لازم برای محافظت از سیستم عصبی مرکزی نیز نقش مهمی دارد.



## فعالیت عملی

۱- لشه مرغ را تشریح کنید و غدد تیموس، پینه‌آل، هیپوفیز، فوق کلیه، تیروئید، پاراتیروئید

و اولتیمو برانشیال را مشاهده نمایید.

۲- لشه خروس بالغ را تشریح کنید و بیضه‌ها را مشاهده کنید.

آزمون پیمانه مهارتی ۹



### پاسخ پیشآزمون پیمانه مهارتی (۱)

- ج ۱- بدن طیور از پر پوشیده شده ولی بدن پستانداران از مو پوشیده شده است.  
ج ۲- نوک مرغ به دلیل دانه خوار بودن تیز است ولی نوک اردک به دلیل جستجوی غذا در آب پهن می‌باشد.  
ج ۳- مرغ

### پاسخ پیشآزمون پیمانه مهارتی (۲)

- ج ۱- دو قسمتی (پیش‌مده و سنگدان)  
ج ۲- راست‌روده و یک جفت روده کور  
ج ۳- بله، در کلوآک

### پاسخ پیشآزمون پیمانه مهارتی (۳)

- ج ۱- برای سبک‌تر بودن بدن (چگالی بدن کمتر می‌شود) و پرواز کردن  
ج ۲- ماهیچه پاها  
ج ۳- بله

### پاسخ پیشآزمون پیمانه مهارتی (۴)

- ج ۱- زیرا اسپرم‌سازی در خروس در دمای بدن صورت می‌گیرد.  
ج ۲- تولید تخمک (زرده)  
ج ۳- صفحه رویان، زرده، سفیده (رقیق و غلیظ)، پوسته‌های نازک (داخلی و خارجی)، پوسته صدفی و کيسه هوايی

### پاسخ پیشآزمون پیمانه مهارتی (۵)

- ج ۱- سیاه‌رگ، سرخ‌رگ، مویرگ  
ج ۲- پستانداران  
ج ۳- دو نوع گردش خون بزرگ (عمومی) و گردش خون کوچک (ششی)

### پاسخ پیشآزمون پیمانه مهارتی (۶)

- ج ۱- نه عدد  
ج ۲- از طریق دم و بازدم  
ج ۳- در انتهای نوک بالایی قرار دارد

## پاسخ پیشآزمون پیمانه مهارتی (۷)

- ج ۱- نفرون
- ج ۲- ترشح، بازجذب و تصفیه
- ج ۳- اردک

## پاسخ پیشآزمون پیمانه مهارتی (۸)

- ج ۱- نرون
- ج ۲- رشد زیاد قسمت بینایی
- ج ۳- حفظ تعادل بدن

## پاسخ آزمون پیمانه مهارتی (۹)

- ج ۱- بین خم دوازده
- ج ۲- گردن
- ج ۳- پاراتیروئید

## پاسخ آزمون پیمانه مهارتی (۱۰)

- ج ۱- کمک به پرواز، کمک به حفظ درجه حرارت بدن، حفاظت از برف و باران، استتار، جذابیت پرنده در بین پرنده‌گان همان گروه
- ج ۲- ۱- پرهای بزرگ یا شاهپرها، ۲- پرهای کوچک یا پوش پر، ۳- پرهای سوزنی شکل
- ج ۳- دو لایه : ۱- اپیدرم، ۲- درم
- ج ۴- به دلیل ذخیره بالای ملانین در پوست
- ج ۵- به میزان رنگدانه گرانتوفیل در جیره غذایی و همینطور میزان تخم‌گذاری
- ج ۶- زیرا عدد عرقی ندارند
- ج ۷- تاج بالشتکی، تاج نخودی، تاج گلسرخی، تاج ساده، تاج توت فرنگی، تاج ۷ شکل
- ج ۸- لب

## پاسخ آزمون پیمانه مهارتی (۱۱)

- ج ۱- دهان، مری، معده، روده باریک، روده بزرگ (روده کور و راستروده) و کلوآک
- ج ۲- سه لایه : ۱- لایه سروزی، ۲- لایه عضلانی، ۳- لایه مخاطی
- ج ۳- دو قسمت : ۱- پیش معده، ۲- سنگدان
- ج ۴- پیش معده
- ج ۵- سه قسمت : ۱- دئونوم، ۲- ژرنوم، ۳- ایلئوم

- ج<sub>۶</sub>- دو ناحیه : گوارشی و ادراری، تناصلی
- ج<sub>۷</sub>- گرفتن غذا، عبور غذا از مجرای گوارش، هضم و جذب، دفع مواد زائد
- ج<sub>۸</sub>- گرفتن غذا و بلع آن
- ج<sub>۹</sub>- ذخیره غذا
- ج<sub>۱۰</sub>- چون فاقد چینهدان است
- ج<sub>۱۱</sub>- غذا در این قسمت با ترشحات اسیدی معده و شیره آن آغشته می‌گردد.
- ج<sub>۱۲</sub>- خُرد کردن غذا
- ج<sub>۱۳</sub>- جذب غذا
- ج<sub>۱۴</sub>- هضم سلولز و تبدیل آن به گلوکز و تولید ویتامین‌های گروه B و K
- ج<sub>۱۵</sub>- محل تجمع غذاهای هضم نشده و دفع آن
- ج<sub>۱۶</sub>- چون طول دستگاه گوارش کوتاه است.

### پاسخ آزمون پیمانه مهارتی (۳)

- ج<sub>۱</sub>- تأمین تعادل و حرکت
- ج<sub>۲</sub>- ۱- به بدن حیوان شکل می‌دهد.
- ۲- در تولید سلول‌های خونی دخالت دارد.
- ۳- مواد معدنی مورد نیاز را ذخیره می‌کند.
- ۴- در تعادل بدن و حرکت‌های حیوان نقش اساسی دارد و نقطه اتکاء ماهیچه‌های بدن است.
- ج<sub>۳</sub>- از به هم پیوستن استخوان‌ها و غضروف‌ها اسکلت به وجود می‌آید.
- ج<sub>۴</sub>- چهار گروه : ۱- استخوان‌های دراز - استخوان‌های کوتاه - ۳- استخوان‌های پهن - ۴- استخوان‌های نامنظم
- ج<sub>۵</sub>- دو نوع : ۱- بافت استخوانی متراکم - ۲- بافت استخوانی اسفنجی
- ج<sub>۶</sub>- شامل دو استخوان گیجگاهی، شبپره، پرویزنی، آهیانه پس‌سری و استخوان پیشانی
- ج<sub>۷</sub>- اطلس، آسه
- ج<sub>۸</sub>- تا تخم به آسانی خارج گردد
- ج<sub>۹</sub>- کمریند سینه‌ای و بال
- ج<sub>۱۰</sub>- کتف، ترقوه و کوراکونید یا غرابی
- ج<sub>۱۱</sub>- استخوان‌های بازو، زند زیرین، زند زیرین، استخوان‌های مج، استخوان‌های قلم دست و سه انگشت
- ج<sub>۱۲</sub>- استخوان‌های ران، ساق پا، قلم پا، انگستان
- ج<sub>۱۳</sub>- سه نوع : ماهیچه‌های صاف، قلبی و مخطط
- ج<sub>۱۴</sub>- در تمام حرکات به ویژه در پرواز نقش اساسی دارد

## پاسخ آزمون پیمانه مهارتی (۴)

- ج-۱- بیضه‌ها و مجرای منی بر
- ج-۲- بیضه چپ
- ج-۳- تولید اسپرم
- ج-۴- دو قسمت: تخمدان و مجرای تخمدان، وظیفه مجرای تخمدان که از پنج قسمت تشکیل شده، عبارت است از: تولید تخم و هدایت آن به خارج از بدن
- ج-۵- بزرگ و فعل، کوچک و غیر فعل
- ج-۶- تولید تخمک
- ج-۷- شبپور فانل، ماگنوم، تنگه، رحم یا زهدان، مهبل
- ج-۸- زیرا جنین در پستانداران داخل رحم و در پرندگان خارج از رحم رشد و نمو می‌کند.
- ج-۹- ورود زردۀ تخم مرغ آزاد شده به داخل شبپور مجرای تخمبر را تخمک گذاری می‌نماید.
- ج-۱۰- ۱- گرفتن زردۀ از تخمدان ۲- محل برخورد اسپرماتوزوئید با تخمک
- ج-۱۱- سفیده تخم مرغ
- ج-۱۲- ایستموس
- ج-۱۳- پوسته‌های صدفی، بین ۱۹ تا ۲۰ ساعت
- ج-۱۴- مهبل
- ج-۱۵- ۷۵، ۱۴، ۲۶/۵
- ج-۱۶- هورمون‌های جنسی و عوامل خارجی
- ج-۱۷- ۱- صفحه رویان، ۲- زردۀ ۳- سفیده ۴- پوسته‌های نازک (داخلی و خارجی) ۵- پوسته صدفی ۶- کیسه هوایی
- ج-۱۸- به دلیل حرارت کمتر محیط نسبت به بدن مادر، رشد جنین متوقف می‌گردد.

## پاسخ آزمون پیمانه مهارتی (۵)

- ج-۱- انتقال مواد غذایی، گازهای تنفسی و مواد زائد

ج-۲- ۱- انتقال اکسیژن به سلول‌های بدن و پس گرفتن دی‌اکسید کربن

۲- انتقال مواد غذایی از دستگاه گوارش به سلول‌های بدن

۳- انتقال مواد زائد از سلول‌ها به اندام‌های دفعی

۴- رساندن هورمون‌ها به بخش‌های مختلف بدن

۵- تنظیم آب بافت‌های بدن

۶- تنظیم درجه حرارت بدن

ج-۳- حرکات قلب را تسهیل می‌کند

ج۴- سه لایه: درونی، میانی و بیرونی

ج۵- ایجاد فشار اُسمزی در خون

ج۶- جلوگیری از خونریزی

ج۷- قلب، خون و رگ‌های خونی

ج۸- تأمین انرژی لازم برای سوخت و ساز بدن و ضربان تندر آن

#### پاسخ آزمون پیمانهٔ مهارتی (۶)

ج۱- انتقال اکسیژن به سلول‌ها و باز گرداندن دی‌اکسید کربن

ج۲- بینی، حفره‌های بینی، حنجره، نای، جعبه صوتی، نایزه‌ها، شش‌ها، کیسه‌های هوایی

ج۳- ۱- تأمین اکسیژن مورد نیاز

۲- دفع دی‌اکسید کربن اضافی

۳- خارج کردن حرارت اضافی بدن

۴- کمک به ایجاد صوت

ج۴- به دو روش هدایتی یا جریان مستقیم حرارتی و تبخیری چون در مرغ غدد عرق وجود ندارد، لذا دفع تبخیری در پایین

آوردن حرارت بدن مؤثر است

ج۵- ج) ۹

#### پاسخ آزمون پیمانهٔ مهارتی (۷)

ج۱- کلیه، میزانی

ج۲- مرغ

ج۳- غده نمکی یک کanal مرکزی دارد که تعدادی مجرای ترشحی به صورت شعاعی از آن جدا می‌شوند که به وسیله سرخرگ‌ها و سیاهرگ‌های کوچکی احاطه شد و انتهای آنها مسدود است.

ج۴- هر نفرون از یک جسمک کلیوی و یک لوله تشکیل شده جسمک کلیوی در بر گیرنده شبکه‌های مویرگی و کپسول گلومرولی است.

ج۵- اسید اوریک

ج۶- اسید اوریک

ج۷- به علت تصفیه بیش از ۹۰ درصد آب بدن قندهای ساده و الکترولیت‌ها مجدداً از نفرون‌ها باز جذب شده و به خون برگشت داده می‌شود.

#### پاسخ آزمون پیمانهٔ مهارتی (۸)

ج۱- این دستگاه به عنوان رهبر بدن در فعالیت‌های پرنده و کنترل، تشدید یا بازدارندگی اعمال دخالت دارد.

ج-۲- نرون

ج-۳- جسم سلولی - آکسون - یک یا چند شاخه منشعب به نام دندریت.

ج-۴- ۱- دستگاه گوارش

۲- دستگاه تعادل بدن

۳- دستگاه تنفس

۴- دستگاه گردش خون

ج-۵- مغرو نخاع

ج-۶- به وسیله پردازش بیام‌های عصبی از طریق اعصاب حسی و اعصاب حرکتی در مراکز مغزی - نخاعی

ج-۷- ۱- عضو گیرنده

۲- اعصاب حسی

۳- محل‌های پردازش

۴- اعصاب حرکتی

۵- اندام یا عضو حرکتی

### پاسخ آزمون پیمانه مهارتی (۹) - - - - -

ج-۱- مجتمع هیپوفیزی - هیپوتالاموسی

۲- گنادها

۳- لوزالمعده

۴- فوق کلیوی

۵- تیروئید

۶- پاراتیروئید

۷- اولتیمو برانشیال

ج-۲- انسلین - گلوکاگون

ج-۳- کلسیتونین

ج-۴- پاراتورمون

ج-۵- ملاتونین

ج-۶- گnad و تروپین‌ها، تیرو تروپین‌ها، پرولاکتین

ج-۷- ۱- کبد

۲- کلیه‌ها

۳- تیموس

۴- پینه‌آل

## منابع

- ۱- آر.ای. آستیک. ام.سی. نشیم. ۱۳۸۱. پرورش طیور. مترجمین حسن کرمانشاهی و مسعود زردوست، انتشارات دانشگاه فردوسی مشهد.
- ۲- استورکی. بی.دی. ۱۳۷۴. فیزیولوژی پرندگان. مترجمین: محمود پناهی، ساسان رسول‌تزاد، رسول زنده روح کرمانی، مهرداد مدیر صانعی، محمد معافی، مهدی میرسلیمی، فریدون نیکنفس. انتشارات واحد آموزش و پرورش معاونت کشاورزی سازمان اقتصادی کوثر. ۶۸۹.
- ۳- پوررضا. جواد. ۱۳۷۰. اصول علمی و عملی پرورش طیور. انتشارات دانشگاه صنعتی اصفهان.
- ۴- فرخوی محسن. خلیقی سیگارودی. تقی. ف. نیکنفس. ۱۳۷۱. راهنمای کامل پرورش طیور. انتشارات واحد آموزش و پژوهش معاونت کشاورزی سازمان اقتصادی کوثر. ۹۱۹.
- ۵- کوری بروس. ۱۳۸۰. تشریح و فیزیولوژی دام. مترجمین احمد زارع شحنه، حسن صادقی‌نیا. انتشارات آبه. ۴۳۹.
- ۶- میرزای ناصر، علی غضنفر، مهری کخدایی و مهدیه قفیه‌ی. ۱۳۸۷. فیزیولوژی جانوری. انتشارات دانشگاه بوعلی سینا. ۴۴۵.
- ۷- نیکل ریچارد، اوست شومر و اوگن سیفرله. ۱۳۷۵. آناتومی پرندگان اهلی. مترجمین: سیدرضا قاضی، مینا تجلی و صفری غلامی. انتشارات دانشگاه شیراز. ۳۴۷.

۸- Dyce.K.M.W.O.Sack.C.J.G. Wensing. The Text Book Veterinary Anatomy. Sunderse Company. ۸۴۵.

۹- WWW. Ag.ansc. purde.edu

۱۰- WWW. Aps.uoguelph.ca

۱۱- WWW.Itpnews.com

۱۲- WWW.People.eku.edu

۱۳- WWW.Poultry.uga.edu

۱۴- WWW.Poultry hab.org

۱۵- WWW. Ziyaee. ۲۰m.com

